

内服のための説明書 <デシコビHT、アイセントレス 400mg>

内服の意義

- 針刺しなどでH I V汚染血液に曝露された場合の感染のリスクは、0.5～0.3%とされており、B型肝炎やC型肝炎の同じような曝露の場合の感染リスクに比べそれぞれ1/100～1/10と低いですが感染リスクが0%ではありません。
- 今のところ感染が成立してしまった場合、治癒できるような治療法は確立されていません。
- 感染直後に予防薬を内服することで感染のリスクを低下させることができます。

内服に当たっての注意点

- 妊娠の有無を確認しました。
この薬剤は、妊娠中でも内服可能とされていますが、妊娠初期の胎児に対する安全性が確立されている抗HIV薬は、現時点では存在しません。
- B型肝炎がないことを確認しました。
B型肝炎患者がこの薬剤内服を中止した場合、肝炎が悪化することがあります。従って、この薬剤を服用する前には、必ずB型肝炎の有無を調べてもらう必要があります。

- 予防内服される抗H I V薬

薬 剤 名	デシコビHT (略名：TAF/FTC)	アイセントレス 400mg (略名：RAL)
飲 み 方	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>①</p> <p>デシコビHT 1錠</p> </div> <div style="font-size: 2em;">+</div> <div style="text-align: center;">  <p>②</p> <p>アイセントレス 400mg 1錠</p> </div> </div>	
	<ul style="list-style-type: none"> • 1日2回 (食事の影響なし) • 1回目は①をできるだけ早く内服する。 • 12時間後に②を内服する。 • その後12時間毎①と②を交互に内服する。 	
保 存 方 法	室温保存	
副 作 用	1：吐き気、下痢、頭痛が起こることがあります。服用していく過程で軽減することが多いといわれています。 2：腎機能障害が起こることがあります。長期服用時に起こることがありますが、中止することにより回復します。短期服用の場合は、心配ありません。腎機能障害のある方の内服時は、専門医師にご相談下さい。 3：骨に影響が起こることがあります。長期服用時に起こることがあります。	吐き気、頭痛が起こることがあります。服用していく過程で軽減することが多いといわれています。
注 意 点	併用注意薬もありますので他院にかかっている人は、必ず内服している薬剤を責任医師に見せてください。また、他院に行く時も、この予防薬を内服していることをお伝えください。	