

1) 疾患別死亡数・死亡率(志賀町)

※死亡分類:H7年より「ICD10」

死亡数(総数)

Table with 12 columns (years H13-H22) and 28 rows of disease categories including total deaths, malignant tumors, infectious diseases, diabetes, and suicides.

注)H17年以前の値は旧富来町、旧志賀町の値を合計した人数を計上した

死亡数(男)

Table with 12 columns (years H13-H22) and 28 rows of disease categories for males, including total deaths, malignant tumors, and accidents.

注)H17年以前の値は旧富来町、旧志賀町の値を合計した人数を計上した

死亡数(女)

Table with 12 columns (years H13-H22) and 28 rows of disease categories for females, including total deaths, malignant tumors, and accidents.

注)H17年以前の値は旧富来町、旧志賀町の値を合計した人数を計上した

死亡率(総数)人口10万対

Table with 12 columns (years H13-H22) and 28 rows of death rates per 10,000 population for various diseases, including total rates and categories like infectious diseases and diabetes.

死亡率(男)人口10万対

Table with 12 columns (years H13-H22) and 28 rows of death rates per 10,000 population for males, covering various health conditions.

死亡率(女)人口10万対

Table with 12 columns (years H13-H22) and 28 rows of death rates per 10,000 population for females, covering various health conditions.

死亡率の分母に用いた人口、日本人人口(推計)

資料:衛生統計年報

総数	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
七尾市	62,980	62,577	62,183	61,715	61,476	60,945	59,764	59,540	58,180	57,440
旧七尾市	46,524	46,299	46,092							
旧田鶴浜町	5,856	5,865	5,869							
旧中島町	7,337	7,160	7,002							
旧能登島町	3,263	3,253	3,220							
羽咋市	25,351	25,178	24,942	24,680	24,408	24,277	23,793	23,778	23,354	22,939
志賀町	25,046	24,749	24,436	24,172	23,719	23,293	22,906	22,672	22,186	22,067
旧富来町	9,526	9,301	9,090	8,908						
旧志賀町	15,520	15,448	15,346	15,264						
宝達志水町	15,843	15,699	15,563	15,441	15,158	15,076	14,785	14,741	14,365	14,133
旧志雄町	7,296	7,221	7,133	7,080						
旧押水町	8,547	8,478	8,430	8,361						
中能登町	19,096	19,051	18,989	18,883	18,874	18,872	18,584	18,664	18,422	18,357
旧鳥屋町	5,548	5,586	5,575	5,552						
旧鹿島町	8,562	8,521	8,532	8,508						
旧鹿西町	4,986	4,944	4,882	4,823						
管内	148,316	147,254	146,113	144,891	143,635	142,463	139,832	139,395	136,507	134,936
石川県	1,172,151	1,171,956	1,170,152	1,167,713	1,165,517	1,171,791	1,159,194	1,169,167	1,155,239	1,158,573

注)H16年以前の七尾市は旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数を計上した

男

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
七尾市	29,870	29,663	29,465	29,203	28,972	28,612	28,048	27,922	27,269	27,080
旧七尾市	22,143	22,009	21,901							
旧田鶴浜町	2,735	2,737	2,745							
旧中島町	3,459	3,393	3,318							
旧能登島町	1,533	1,524	1,501							
羽咋市	12,006	11,936	11,829	11,683	11,532	11,440	11,206	11,200	10,983	10,827
志賀町	12,028	11,878	11,739	11,599	11,285	11,044	10,854	10,739	10,488	10,399
旧富来町	4,385	4,284	4,175	4,105						
旧志賀町	7,643	7,594	7,564	7,494						
宝達志水町	7,496	7,425	7,381	7,322	7,169	7,083	6,949	6,916	6,739	6,636
旧志雄町	3,421	3,388	3,362	3,331						
旧押水町	4,075	4,037	4,019	3,991						
中能登町	9,144	9,121	9,081	9,016	9,034	9,001	8,851	8,902	8,809	8,768
旧鳥屋町	2,658	2,674	2,680	2,670						
旧鹿島町	4,098	4,080	4,064	4,039						
旧鹿西町	2,388	2,367	2,337	2,307						
管内	70,544	70,023	69,495	68,823	67,992	67,180	65,908	65,679	64,288	63,710
石川県	567,663	567,459	566,469	564,788	562,826	565,866	559,634	564,353	557,447	559,554

注)H16年以前の七尾市は旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数を計上した

注)H17年以前の志賀町、宝達志水町、中能登町はH17年10月1日現在の市町の境域に基づき組み替えたもの

女

	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
七尾市	33,110	32,914	32,718	32,512	32,504	32,333	31,716	31,618	30,911	30,360
旧七尾市	24,381	24,290	24,191							
旧田鶴浜町	3,121	3,128	3,124							
旧中島町	3,878	3,767	3,684							
旧能登島町	1,730	1,729	1,719							
羽咋市	13,345	13,242	13,113	12,997	12,876	12,837	12,587	12,578	12,371	12,112
志賀町	13,018	12,871	12,697	12,573	12,434	12,249	12,052	11,933	11,698	11,668
旧富来町	5,141	5,017	4,915	4,803						
旧志賀町	7,877	7,854	7,782	7,770						
宝達志水町	8,347	8,274	8,182	8,119	7,989	7,993	7,836	7,825	7,626	7,497
旧志雄町	3,875	3,833	3,771	3,749						
旧押水町	4,472	4,441	4,411	4,370						
中能登町	9,952	9,930	9,908	9,867	9,840	9,871	9,733	9,762	9,613	9,589
旧鳥屋町	2,890	2,912	2,895	2,882						
旧鹿島町	4,464	4,441	4,468	4,469						
旧鹿西町	2,598	2,577	2,545	2,516						
管内	77,772	77,231	76,618	76,068	75,643	75,283	73,924	73,716	72,219	71,226
石川県	604,488	604,497	603,683	602,925	602,691	605,925	599,560	604,814	597,792	599,019

注)H16年以前の七尾市は旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数を計上した

注)H17年以前の志賀町、宝達志水町、中能登町はH17年10月1日現在の市町の境域に基づき組み替えたもの

2)年齢調整死亡率

選択死因の市町村別年齢調整死亡率(人口10万対:直接法) (平成22年)

資料:衛生統計年報

*平成7,12,17年は日本人口(国勢調査年:確定数)をその他の年は、総人口(外国人を含む:推計数)を基に算出した。

(総数)

市町村	死亡総数	結核	悪性 新生物	悪性新生物			糖尿病	高血圧性 疾患	心疾患	脳血管 疾患	大動脈瘤 及び解離	肺炎	慢性閉塞 性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の 事故		自殺
				胃	肝及び 肝内 胆管	気管、 気管支 及び肺												交通事故		
七尾市	387.46	0.78	122.20	21.02	8.13	19.81	4.33	1.22	61.13	37.33	4.34	26.53	5.59	0.00	5.52	5.73	10.32	16.87	4.37	28.23
羽咋市	355.26	0.00	135.17	20.61	7.52	36.48	0.00	0.98	31.37	32.80	7.85	31.76	4.54	0.58	15.15	6.08	13.42	16.65	2.00	12.29
志賀町	407.23	0.00	122.97	11.78	4.91	32.23	1.82	0.91	64.39	26.60	3.57	43.32	1.74	0.00	10.54	5.94	10.11	14.76	9.80	19.57
宝達志水町	422.21	0.00	127.90	28.06	25.31	32.77	0.87	0.00	63.99	43.00	8.32	22.14	5.85	0.00	3.22	0.87	8.73	38.34	16.27	43.56
中能登町	382.40	0.00	134.25	31.08	7.52	20.63	7.15	0.00	79.01	28.93	8.52	10.33	5.81	0.73	17.54	0.73	10.20	14.06	5.22	13.82
管内	387.86	0.33	126.15	21.41	9.16	25.72	3.22	0.84	59.40	34.23	5.79	27.88	4.80	0.19	9.44	4.71	10.61	17.95	5.89	23.79
石川県	380.89	0.44	127.65	19.13	11.18	25.18	4.19	1.04	54.10	35.43	4.80	29.10	4.14	0.43	5.84	5.36	7.84	20.45	5.00	19.66

*人口は、各年次の10月1日現在。平成7,12,17年(国勢調査年)は日本人口をその他の年は、総人口(外国人を含む)を基に算出した。

(男)

市町村	死亡総数	結核	悪性 新生物	悪性新生物			糖尿病	高血圧性 疾患	心疾患	脳血管 疾患	大動脈瘤 及び解離	肺炎	慢性閉塞 性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の 事故		自殺
				胃	肝及び 肝内 胆管	気管、 気管支 及び肺												交通事故		
七尾市	551.49	2.17	177.51	32.70	14.14	40.66	6.57	1.37	87.10	54.90	7.79	46.86	13.34	0.00	9.84	7.51	5.39	17.13	3.35	37.72
羽咋市	531.69	0.00	205.97	38.17	8.58	64.16	0.00	2.70	32.02	50.20	6.19	48.15	7.43	0.00	29.05	11.27	17.99	29.83	0.00	20.17
志賀町	600.22	0.00	170.33	20.99	2.48	46.81	4.96	2.48	98.72	36.13	6.36	75.00	4.76	0.00	18.02	8.68	3.71	29.46	20.35	28.52
宝達志水町	664.15	0.00	210.44	25.38	37.28	72.11	0.00	0.00	66.54	73.41	17.63	45.26	13.30	0.00	5.72	0.00	3.28	52.91	17.37	89.63
中能登町	522.68	0.00	152.71	29.14	14.76	40.50	10.80	0.00	114.02	38.45	5.18	14.86	13.16	0.00	29.73	0.00	7.22	27.38	11.63	26.51
管内	563.53	0.90	180.64	30.25	13.72	48.16	5.17	1.48	81.53	50.42	7.99	47.57	10.90	0.00	16.91	6.63	7.30	25.71	7.64	37.00
石川県	535.31	0.82	182.59	29.51	18.53	45.46	5.37	1.23	70.75	49.64	7.37	46.84	9.45	0.63	9.37	6.14	7.10	27.41	6.09	29.91

*人口は、各年次の10月1日現在。平成7,12,17年(国勢調査年)は日本人口をその他の年は、総人口(外国人を含む)を基に算出した。

(女)

市町村	死亡総数	結核	悪性 新生物	悪性新生物			糖尿病	高血圧性 疾患	心疾患	脳血管 疾患	大動脈瘤 及び解離	肺炎	慢性閉塞 性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の 事故		自殺
				胃	肝及び 肝内 胆管	気管、 気管支 及び肺												交通事故		
七尾市	266.49	0.00	82.99	13.21	3.94	4.31	2.78	0.92	37.16	25.76	2.14	12.60	0.61	0.00	0.92	3.88	12.24	16.42	4.55	20.47
羽咋市	226.18	0.00	83.21	6.55	5.84	17.06	0.00	0.00	28.32	20.62	9.88	22.64	3.07	0.83	1.66	1.66	11.51	8.18	3.19	5.59
志賀町	270.59	0.00	93.41	3.44	7.09	27.09	0.00	0.00	45.20	16.74	1.44	23.97	0.00	0.00	4.38	4.96	13.24	2.87	0.00	12.23
宝達志水町	234.68	0.00	61.94	35.03	15.68	0.00	1.19	0.00	65.91	22.19	0.00	10.97	1.19	0.00	1.19	1.19	10.70	22.79	13.57	0.00
中能登町	266.38	0.00	124.46	34.95	1.04	2.09	3.09	0.00	49.53	20.82	11.64	7.31	0.00	1.04	3.98	1.04	11.49	5.38	0.00	1.04
管内	255.99	0.00	86.66	15.35	5.62	8.56	1.70	0.39	41.42	22.46	4.37	15.53	0.91	0.26	2.09	3.05	12.07	12.01	3.83	11.85
石川県	265.30	0.24	87.53	11.46	5.09	10.22	3.26	0.82	40.08	25.35	2.94	18.51	0.95	0.27	2.51	4.87	8.09	15.02	3.93	9.85

*人口は、各年次の10月1日現在。平成7,12,17年(国勢調査年)は日本人口をその他の年は、総人口(外国人を含む)を基に算出した。

2) 年齢調整死亡率 (単年)

資料：衛生統計年報 (人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

七尾市 (総数) 注) H16年以前の値は旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した値を計上した

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系疾患										呼吸器系疾患			肝疾患		腎不全		老衰		不慮の事故		自殺									
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎		急性気管支炎	消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍						
H13	396.16	0.00	0.00	141.87	1.43	30.99	17.07	1.32	14.64	5.08	7.58	24.79	4.58	2.65	1.91	4.19	2.00	45.69	13.37	6.82	44.35	2.46	9.95	27.20	39.94	27.90	0.00	15.03	0.00	7.47	11.42	5.17	19.94	7.17	25.51
H14	442.17	0.00	0.34	156.92	5.12	38.41	10.73	6.75	10.84	9.43	11.26	20.08	4.89	2.90	3.32	3.60	0.53	74.79	19.55	6.04	57.87	11.04	14.70	31.02	52.06	32.29	0.00	9.53	3.01	2.87	4.76	7.35	22.26	4.28	13.24
H15	458.90	0.00	2.06	128.17	3.79	23.96	6.87	3.38	7.95	10.48	8.50	26.30	7.32	4.15	2.68	5.92	3.97	64.97	20.40	4.60	67.91	15.24	16.77	30.84	46.35	23.95	0.57	15.19	0.51	8.29	6.34	11.81	30.45	11.42	38.10
H16	402.71	0.00	0.00	127.17	3.73	28.32	8.12	7.78	11.44	4.59	4.82	23.39	8.76	0.56	0.61	4.15	3.70	60.37	16.16	7.85	52.70	9.19	17.09	26.43	39.81	19.95	0.00	16.43	1.52	7.84	1.35	7.80	20.00	1.27	18.71
H17	450.97	0.71	0.93	135.85	4.05	27.87	11.37	1.27	8.67	5.71	10.11	31.34	7.75	1.91	2.62	3.56	2.62	77.38	23.82	9.62	49.57	13.56	13.81	21.91	54.86	39.58	0.28	19.00	1.05	10.27	4.85	4.51	31.02	11.31	19.91
H18	409.00	0.70	0.00	138.99	5.95	26.68	12.11	5.97	15.76	6.64	8.27	19.64	6.20	1.69	1.53	14.63	4.05	67.51	17.57	7.00	40.91	8.16	12.10	20.38	35.23	20.12	0.27	15.10	0.97	7.93	8.35	5.00	23.87	5.56	23.36
H19	384.76	0.99	0.67	124.81	2.40	15.10	7.82	8.95	10.50	7.59	10.92	20.67	4.09	3.53	2.44	6.66	4.00	68.27	19.96	7.23	39.00	4.04	12.23	21.76	30.76	15.40	0.00	12.14	2.66	5.94	6.49	5.59	11.81	2.05	27.49
H20	404.13	/	0.24	149.20	/	22.55	/	/	10.82	/	/	/	/	/	/	3.68	0.64	60.35	/	/	32.16	/	/	/	/	17.04	/	/	/	3.27	5.71	8.73	25.80	7.68	26.27
H21	385.81	/	0.55	131.56	/	22.32	/	/	13.71	/	/	/	/	/	/	2.38	1.58	55.63	/	/	36.64	/	/	/	/	29.39	/	/	/	7.45	8.60	10.78	13.07	4.46	12.54
H22	387.50	/	0.80	122.20	/	21.00	/	/	8.10	/	/	/	/	/	/	4.30	1.20	61.10	/	/	37.30	/	/	/	/	26.50	/	/	/	5.50	5.70	10.30	16.90	4.40	28.20

七尾市（男）

資料：衛生統計年報（人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系の疾患									糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）			脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺				
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房			子宮	前立腺	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎					交通事故						
H13	576.63	0.00	0.00	212.99	1.95	48.75	16.81	3.24	29.37	5.17	9.69	43.47	0.00	/	5.78	4.89	4.63	61.56	18.52	10.21	60.80	1.95	14.45	37.54	75.49	52.87	0.00	23.35	0.00	15.06	8.64	4.02	23.55	7.32	40.13
H14	583.55	0.00	0.00	201.16	5.71	55.78	14.15	13.68	12.80	8.74	13.25	34.38	0.00	/	8.14	5.04	0.00	103.85	31.38	7.71	65.73	8.36	17.18	37.18	93.99	56.65	0.00	12.02	4.91	1.52	7.84	2.73	37.66	9.15	20.71
H15	614.39	0.00	1.43	185.12	8.04	44.21	9.66	3.32	11.13	14.12	15.93	50.23	0.00	/	7.10	7.09	6.69	89.31	25.63	8.26	84.84	10.11	30.18	37.64	73.19	49.13	1.43	20.16	0.00	13.05	8.41	12.26	35.95	7.68	43.18
H16	566.69	0.00	0.00	169.38	5.87	42.56	15.18	10.98	16.28	7.31	2.42	38.11	0.00	/	2.20	7.15	6.38	67.26	18.69	13.49	75.31	7.04	28.91	39.36	74.66	37.04	0.00	25.79	3.48	15.76	2.73	10.65	29.92	1.41	31.19
H17	682.90	1.64	1.31	217.58	8.75	49.86	12.67	2.66	15.82	5.40	17.86	59.30	5.02	/	8.13	4.17	5.07	107.75	25.85	18.90	60.81	14.70	17.16	28.95	94.80	70.02	0.00	32.02	0.00	17.27	9.41	3.06	53.07	18.21	29.10
H18	593.60	1.24	0.00	195.91	11.44	41.88	14.41	11.36	23.95	10.99	8.84	34.51	0.00	/	4.59	16.94	2.66	98.00	22.15	10.17	52.00	2.22	15.80	33.98	61.25	35.37	0.98	26.21	2.11	12.58	13.55	3.92	38.49	4.86	36.54
H19	514.71	0.00	0.00	175.12	3.99	14.71	12.38	16.20	19.57	13.93	11.66	41.95	0.00	/	6.56	9.39	5.14	93.02	33.08	8.83	46.38	2.26	15.84	28.28	56.77	25.77	0.00	14.34	5.01	5.55	7.44	3.97	17.82	4.80	50.31
H20	543.07	/	-	191.41	/	38.02	/	/	13.49	/	/	56.88	/	/	5.00	-	81.10	/	/	42.30	/	/	/	/	/	37.33	/	/	/	4.21	11.22	1.97	33.24	6.70	36.64
H21	548.56	/	-	186.41	/	35.91	/	/	24.87	/	/	36.69	/	/	6.26	2.73	79.52	/	/	47.51	/	/	/	/	/	49.65	/	/	10.59	16.04	9.59	16.17	3.66	21.50	
H22	551.50	/	2.20	177.50	/	32.70	/	/	14.10	/	/	40.70	/	/	6.60	1.40	87.10	/	/	54.90	/	/	/	/	/	46.90	/	/	9.80	7.50	5.40	17.10	3.40	37.70	

七尾市（女）

資料：衛生統計年報（人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	悪性新生物									糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺				
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房				子宮	前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍				交通事故						
H13	262.09	0.00	0.00	91.16	0.85	17.32	18.47	0.00	3.94	4.27	6.61	11.33	8.56	4.64	3.60	0.52	34.75	9.55	5.34	31.50	2.81	5.20	20.00	16.48	11.38	0.00	7.96	0.00	1.03	12.85	5.85	17.97	7.10	10.38
H14	343.50	0.00	0.48	124.95	4.67	23.85	9.13	0.81	10.33	10.19	8.02	9.47	9.55	5.62	2.91	0.81	49.14	10.34	5.09	54.86	13.84	13.80	27.22	28.32	18.62	0.00	8.50	1.71	4.14	2.91	9.03	10.22	0.00	6.85
H15	348.11	0.00	2.63	88.44	0.00	10.12	4.89	3.49	4.98	6.58	2.47	8.99	13.92	7.71	5.70	1.70	46.17	15.49	2.29	53.01	18.05	6.40	25.48	31.79	9.87	0.00	10.61	0.81	3.94	3.93	11.49	26.69	15.57	33.44
H16	283.29	0.00	0.00	98.86	1.75	18.89	2.38	6.49	7.72	2.68	7.14	12.97	16.69	0.92	1.69	1.61	50.60	12.29	2.95	35.75	10.84	6.55	18.36	18.77	8.03	0.00	9.24	0.00	1.34	0.42	6.24	14.07	1.25	7.59
H17	278.94	0.00	0.72	79.81	0.00	12.41	11.19	0.39	3.28	5.83	3.42	10.76	10.07	3.68	2.87	1.32	53.43	23.47	3.22	41.63	12.27	11.72	17.25	30.13	20.13	0.39	7.77	2.05	3.36	1.64	5.06	13.66	5.57	10.12
H18	272.26	0.37	0.00	95.60	2.11	13.32	10.31	1.94	7.38	3.52	8.68	9.40	11.58	3.19	11.69	5.12	43.66	13.81	4.98	35.08	13.34	8.99	12.39	19.80	10.69	0.00	7.16	0.00	4.11	4.23	5.47	12.01	6.38	11.52
H19	291.78	1.64	1.01	89.33	0.66	16.30	5.02	1.86	3.21	2.64	10.48	6.10	7.72	6.75	4.04	2.41	51.18	10.46	6.35	32.30	5.53	8.22	16.96	14.48	8.38	0.00	10.16	0.35	6.55	6.63	6.21	7.85	0.00	6.72
H20	306.85	/	0.34	121.86	/	10.86	/	/	8.02	/	/	11.67	/	/	2.21	0.96	46.06	/	/	24.84	/	/	/	/	/	5.38	/	/	2.60	1.87	11.34	18.64	8.98	16.49
H21	265.92	/	-	93.32	/	11.48	/	/	6.62	/	/	10.80	/	/	0.91	0.65	36.56	/	/	27.14	/	/	/	/	/	15.81	/	/	4.90	2.81	10.34	14.49	5.23	4.91
H22	266.50	/	0.00	83.00	/	13.20	/	/	3.90	/	/	4.30	/	/	2.80	0.90	37.20	/	/	25.80	/	/	/	/	/	12.60	/	/	0.90	3.90	12.20	16.40	4.50	20.50

2) 年齢調整死亡率 (単年)

資料：衛生統計年報 (人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

羽咋市 (総数)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	悪性新生物										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患	肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	くも膜下出血	脳内出血									脳梗塞	交通事故			
H13	419.23	0.83	0.83	138.75	2.93	24.40	13.59	8.32	7.70	4.18	9.24	18.42	6.86	0.00	0.00	4.34	6.06	44.94	11.05	11.15	60.62	2.20	19.28	39.15	44.57	29.20	0.00	16.58	0.00	5.43	7.27	6.36	42.06	11.65	5.66	
H14	369.04	1.32	0.00	114.33	1.74	18.80	9.24	4.50	7.73	7.98	4.60	28.72	2.76	0.00	2.11	3.06	7.34	48.04	13.01	8.82	45.90	14.66	2.90	25.77	45.25	25.87	0.00	27.06	2.53	14.94	2.90	6.02	32.79	15.91	11.50	
H15	444.18	0.00	0.00	138.98	4.99	27.32	9.31	10.95	2.90	8.11	11.71	27.46	7.83	1.45	2.09	9.23	4.01	58.94	27.32	4.66	57.03	9.48	15.67	31.88	53.24	38.47	0.00	16.93	0.00	1.32	5.50	8.01	46.15	27.08	13.30	
H16	387.63	0.00	0.00	139.17	3.73	27.35	8.73	4.58	2.23	11.96	11.12	18.61	4.25	17.74	0.00	1.24	0.74	35.98	14.22	2.23	46.38	7.57	12.08	26.72	59.19	38.06	0.00	16.12	0.00	9.89	5.10	5.95	18.65	7.13	27.20	
H17	381.76	3.04	0.00	108.39	1.22	34.38	3.48	6.13	9.50	6.21	7.20	14.36	3.72	0.00	5.63	7.35	0.72	47.27	11.81	2.15	49.78	12.01	12.40	23.94	62.41	42.95	0.00	11.74	2.41	6.68	4.41	4.29	12.19	1.38	39.41	
H18	353.27	1.34	1.34	118.62	1.34	20.23	11.54	2.97	9.77	3.85	10.52	25.91	4.84	0.00	1.81	10.35	1.16	37.12	12.33	5.02	51.63	12.19	11.99	20.11	41.62	32.54	0.00	12.81	0.67	3.15	6.16	4.04	36.03	14.05	7.82	
H19	394.13	0.65	0.00	120.16	1.85	21.46	6.53	2.02	9.18	1.74	4.85	26.81	5.88	1.37	8.28	4.19	10.83	62.45	19.47	6.49	37.78	9.06	6.87	21.85	54.37	31.59	0.00	10.33	0.00	6.43	5.24	9.57	27.03	9.42	22.76	
H20	404.55	/	-	133.82	/	26.11	/	/	9.46	/	/	25.79	/	/	/	9.10	1.36	45.32	/	/	43.62	/	/	/	/	/	34.32	/	/	/	8.31	2.00	8.04	29.05	13.15	17.11
H21	394.04	/	0.98	125.99	/	27.58	/	/	9.23	/	/	13.16	/	/	/	6.42	0.61	52.52	/	/	40.39	/	/	/	/	/	30.32	/	/	/	8.06	4.79	7.96	20.78	4.81	19.11
H22	355.30	/	0.00	135.20	/	20.60	/	/	7.50	/	/	36.50	/	/	/	0.00	1.00	31.40	/	/	32.80	/	/	/	/	/	31.80	/	/	/	15.20	6.10	13.40	16.70	2.00	12.30

羽咋市（男）

資料：衛生統計年報（人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系の疾患										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）			脳血管疾患	呼吸器系の疾患			肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺						
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮			前立腺	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患		くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞				肺炎	急性気管支炎		胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故				
H13	575.61	3.18	0.00	199.90	6.07	29.24	28.03	10.36	16.42	0.00	16.35	34.94	0.00	/	0.00	4.12	6.36	61.31	12.37	16.99	57.03	0.00	14.09	42.94	83.92	53.64	0.00	16.68	0.00	0.00	15.70	3.18	70.49	10.63	9.52
H14	506.95	0.00	0.00	164.31	4.04	28.36	4.04	4.04	12.75	9.14	7.34	43.33	0.00	/	6.32	3.50	10.16	61.58	11.87	17.70	54.97	21.53	0.00	28.19	81.61	42.56	0.00	22.97	6.86	8.77	0.00	9.48	54.65	31.01	24.28
H15	569.62	0.00	0.00	193.17	9.22	49.33	10.07	8.70	3.57	13.19	14.99	50.29	0.00	/	6.25	19.72	0.00	79.49	44.44	8.95	79.62	5.19	24.44	50.00	67.75	48.08	0.00	10.28	0.00	0.00	7.60	6.25	62.43	26.03	16.00
H16	522.66	0.00	0.00	153.47	8.24	41.94	5.96	8.29	2.44	15.79	18.39	20.32	0.00	/	0.00	3.52	0.00	57.17	19.34	4.88	52.80	4.89	15.28	32.63	102.78	63.19	0.00	28.89	0.00	20.66	5.79	0.00	37.39	14.69	38.55
H17	509.63	5.00	0.00	177.78	3.35	65.52	5.66	8.32	3.31	7.99	13.61	29.44	0.00	/	14.23	8.32	0.00	49.75	16.22	4.71	60.04	10.34	22.06	27.64	90.36	56.72	0.00	20.37	5.01	12.00	4.22	7.06	15.68	3.31	30.69
H18	503.72	0.00	3.27	170.95	3.27	40.78	18.57	7.41	20.23	3.26	12.40	39.65	0.00	/	4.15	4.98	3.26	45.63	14.54	5.41	75.11	7.83	21.43	31.43	83.92	63.42	0.00	22.17	0.00	7.42	4.98	2.15	60.94	21.29	4.15
H19	592.03	0.00	0.00	200.11	4.20	42.23	9.91	0.00	15.90	2.99	0.00	60.68	0.00	/	20.28	0.00	25.04	83.22	26.96	15.40	58.56	2.99	15.49	40.09	78.20	34.05	0.00	9.15	0.00	9.15	9.77	4.29	54.68	18.88	36.54
H20	612.36	/	-	225.58	/	57.35	/	/	13.20	/	/	57.72	/	/	18.69	-	59.88	/	/	/	58.13	/	/	/	/	66.71	/	/	/	17.32	-	9.17	53.72	22.87	36.20
H21	596.99	/	2.72	204.37	/	39.90	/	/	16.69	/	/	27.52	/	/	14.77	-	68.53	/	/	/	60.66	/	/	/	/	40.61	/	/	/	14.23	4.73	4.02	39.60	10.23	32.51
H22	531.70	/	0.00	206.00	/	38.20	/	/	8.60	/	/	64.20	/	/	0.00	2.70	32.00	/	/	/	50.20	/	/	/	/	48.20	/	/	/	29.00	11.30	18.00	29.80	0.00	20.20

羽咋市（女）

資料：衛生統計年報（人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系疾患										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺	
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮						前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎						交通事故			
H13	318.31	0.00	1.13	98.17	0.00	23.04	1.13	9.14	2.25	6.86	3.38	5.63	13.22	0.00	4.50	6.76	36.40	9.85	9.11	65.96	3.38	26.16	36.42	25.75	20.10	0.00	15.28	0.00	9.05	0.00	7.90	19.89	13.42	2.25
H14	259.21	2.12	0.00	78.85	0.00	11.47	12.06	5.47	4.09	9.13	3.07	16.53	5.47	0.00	3.07	5.41	38.44	13.81	3.21	34.09	7.25	4.31	22.53	21.14	14.19	0.00	30.76	0.00	19.85	4.31	4.31	11.48	1.10	0.00
H15	357.44	0.00	0.00	102.15	1.11	12.00	9.60	13.36	2.44	4.67	9.76	8.68	15.01	2.44	2.44	6.96	39.21	13.38	1.11	43.18	11.98	9.79	21.41	44.64	32.85	0.00	24.33	0.00	2.03	3.34	8.71	34.60	26.33	11.37
H16	297.55	0.00	0.00	135.88	0.00	19.03	11.88	1.07	2.14	9.56	4.49	18.33	8.03	34.42	0.00	1.07	23.58	10.34	1.07	40.66	9.03	10.31	21.32	34.48	25.72	0.00	5.35	0.00	0.00	4.28	8.56	4.28	0.00	16.76
H17	282.83	1.03	0.00	55.03	0.00	9.94	2.37	4.72	13.76	3.98	2.37	3.08	7.08	0.00	6.64	1.03	44.62	7.23	1.03	38.51	13.05	2.95	20.46	46.02	34.23	0.00	3.98	0.00	1.92	4.29	3.08	9.81	0.00	48.92
H18	244.54	2.28	0.00	79.97	0.00	4.18	4.23	0.00	0.98	4.23	9.57	16.55	9.53	0.00	14.86	0.00	29.11	9.65	4.75	33.52	16.24	2.94	13.36	14.85	13.88	0.00	5.73	0.98	0.00	6.37	4.89	16.80	9.11	11.92
H19	242.29	0.94	0.00	60.53	0.00	6.44	3.22	3.22	3.22	0.94	8.46	2.82	10.88	2.28	6.61	0.00	44.46	13.52	0.94	25.83	15.28	0.00	10.55	40.78	31.36	0.00	10.25	0.00	4.22	2.28	12.03	5.18	0.00	9.77
H20	242.26	/	-	62.31	/	3.43	/	/	5.69	/	/	2.74	/	/	-	2.30	32.89	/	/	32.76	/	/	/	/	13.26	/	/	/	-	3.21	7.30	7.78	2.52	-
H21	256.83	/	-	79.13	/	18.43	/	/	6.66	/	/	2.64	/	/	-	3.18	40.89	/	/	20.58	/	/	/	/	23.35	/	/	/	1.76	7.14	9.68	2.64	-	3.48
H22	226.20	/	0.00	83.20	/	6.50	/	/	5.80	/	/	17.10	/	/	0.00	0.00	28.30	/	/	20.60	/	/	/	/	22.60	/	/	/	1.70	1.70	11.50	8.20	3.20	5.60

2) 年齢調整死亡率 (単年)

資料：衛生統計年報 (人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

志賀町 (総数) 注) 値は旧富来町、旧志賀町の合計した値を計上した

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	がん										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	脳血管疾患			呼吸器系の疾患	消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺						
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮				前立腺	くも膜下出血	脳内出血		脳梗塞	肺炎				急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍		交通事故					
H13	417.04	1.36	3.57	119.10	0.00	26.94	12.53	11.10	10.78	2.63	3.33	16.48	0.00	5.39	5.59	3.70	1.47	56.74	14.15	8.52	45.11	6.14	15.74	21.87	48.26	38.89	0.00	15.67	1.36	3.36	4.23	8.94	49.70	21.51	15.46
H14	450.11	0.00	0.00	116.14	4.05	23.06	9.67	7.88	4.12	2.47	9.25	29.79	0.00	0.00	4.09	10.35	1.33	61.79	7.01	7.69	46.30	9.63	17.29	17.76	62.97	39.06	0.00	15.42	0.68	2.62	5.71	5.93	29.78	5.20	57.05
H15	389.11	0.00	1.32	108.93	7.89	15.01	2.90	0.66	9.86	7.08	7.87	24.92	6.39	2.52	4.10	2.32	0.66	54.76	29.77	5.22	54.84	11.71	12.70	28.51	53.92	35.53	0.00	8.59	0.66	2.05	4.49	13.50	31.76	1.59	27.76
H16	389.69	0.64	0.00	134.35	6.41	22.40	6.36	11.65	4.28	7.52	10.63	25.89	1.62	0.00	3.49	0.00	0.64	29.99	10.78	1.27	44.13	13.40	14.07	16.66	50.68	32.62	0.00	17.33	3.18	8.85	8.07	10.42	30.93	14.19	18.75
H17	389.68	0.00	0.00	116.69	5.43	16.60	4.39	5.27	6.62	14.86	3.61	26.60	7.77	0.00	1.60	8.84	0.59	58.23	10.36	2.78	38.90	1.60	6.36	30.93	54.78	43.83	0.00	20.10	1.28	3.21	4.49	8.62	20.99	15.06	9.84
H18	435.96	0.97	0.00	153.73	5.40	22.16	6.76	9.93	9.04	7.35	10.59	34.40	2.70	0.97	0.00	5.51	2.41	47.22	9.51	3.38	55.66	8.89	15.99	21.55	67.32	46.39	0.00	13.69	0.57	1.84	15.54	8.21	13.37	2.70	29.22
H19	431.06	0.00	0.00	114.72	5.63	14.21	3.88	12.32	18.46	6.03	7.90	14.20	4.76	3.68	7.83	6.02	0.56	43.87	14.13	5.39	56.18	20.87	15.19	20.12	68.73	44.80	0.00	21.32	0.00	4.24	10.94	13.53	30.33	6.27	3.99
H20	447.62	/	-	107.01	/	14.76	/	/	7.08	/	/	20.60	/	/	/	9.57	0.57	83.70	/	/	51.92	/	/	/	/	48.57	/	/	/	4.45	9.30	7.41	46.30	3.43	23.35
H21	420.06	/	-	132.60	/	15.31	/	/	1.73	/	/	24.05	/	/	/	1.40	-	63.47	/	/	32.98	/	/	/	/	30.05	/	/	/	16.59	9.07	9.94	31.19	1.25	20.79
H22	407.20	/	0.00	123.00	/	11.80	/	/	4.90	/	/	32.20	/	/	/	1.80	0.90	64.40	/	/	26.60	/	/	/	/	43.30	/	/	/	10.50	5.90	10.10	14.80	9.80	19.60

志賀町（男）

資料：衛生統計年報（人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系の疾患										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	脳血管疾患			呼吸器系の疾患	消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺						
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮				前立腺	くも膜下出血	脳内出血		脳梗塞	肺炎						急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故			
H13	598.42	3.53	7.99	170.98	0.00	44.76	13.11	9.08	16.45	5.84	4.37	25.81	0.00	15.44	0.00	0.00	109.67	25.39	19.02	52.57	3.62	22.63	22.79	71.75	57.25	0.00	27.82	3.53	5.84	3.39	10.74	64.93	35.04	31.84
H14	653.11	0.00	0.00	177.93	8.09	40.05	7.30	13.17	3.47	3.47	13.17	46.42	0.00	10.37	20.72	0.00	106.52	12.59	14.39	53.93	3.25	18.97	28.06	89.79	43.66	0.00	18.97	2.32	5.40	4.64	6.96	51.46	11.60	80.50
H15	536.86	0.00	0.00	144.70	19.06	20.92	3.54	2.26	17.14	6.61	3.38	43.14	0.00	10.01	6.76	2.26	72.65	48.51	6.92	75.09	13.56	25.55	30.48	83.09	54.88	0.00	3.54	0.00	0.00	2.26	21.42	63.51	0.00	37.19
H16	537.11	2.20	0.00	235.79	14.85	43.09	12.89	21.46	7.55	7.55	18.32	45.62	0.00	8.96	0.00	0.00	25.97	6.30	2.20	65.07	10.03	28.15	26.90	63.58	34.29	0.00	28.77	7.62	13.60	2.20	11.01	51.40	22.19	19.69
H17	537.14	0.00	0.00	151.58	4.55	19.21	5.00	7.45	5.25	28.35	5.37	54.57	0.00	3.55	13.69	2.10	78.35	19.41	2.90	47.14	0.00	11.31	35.83	91.47	70.44	0.00	26.36	3.15	5.65	8.15	9.46	33.74	28.49	10.00
H18	657.56	2.69	0.00	227.13	10.90	23.67	8.95	15.40	12.48	14.59	13.84	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	79.50	19.31	5.15	90.39	13.38	25.95	34.23	107.15	75.03	0.00	18.36	0.00	3.06	25.63	13.73	18.05	0.00	42.41
H19	541.27	0.00	0.00	159.74	11.26	19.73	2.02	14.89	41.22	3.59	9.58	25.21	0.00	18.94	8.27	0.00	47.31	23.23	2.02	82.23	31.85	21.81	28.57	77.58	64.56	0.00	30.60	0.00	7.55	14.87	8.07	15.19	8.93	8.34
H20	648.57	/	-	169.14	/	31.30	/	/	7.53	/	/	32.95	/	/	7.10	-	132.70	/	/	84.77	/	/	/	/	70.07	/	/	/	10.04	6.67	10.58	39.26	7.53	41.66
H21	619.80	/	-	176.73	/	18.01	/	/	3.82	/	/	42.96	/	/	4.48	-	93.47	/	/	35.44	/	/	/	/	63.19	/	/	/	31.31	18.33	12.45	52.92	-	19.78
H22	600.20	/	0.00	170.30	/	21.00	/	/	2.50	/	/	46.80	/	/	5.00	2.50	98.70	/	/	36.10	/	/	/	/	75.00	/	/	/	18.00	8.70	3.70	29.50	20.40	28.50

志賀町（女）

資料：衛生統計年報（人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	がん										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	脳血管疾患			呼吸器系の疾患	消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺						
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮				前立腺	くも膜下出血	脳内出血		脳梗塞	肺炎						急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故			
H13	292.72	0.00	0.00	85.47	0.00	13.45	11.81	14.25	5.34	1.05	2.22	9.56	0.00	9.72	6.15	2.11	20.90	4.33	2.87	39.35	7.87	9.99	21.49	31.88	25.34	0.00	10.35	0.00	2.11	4.98	8.07	38.60	2.80	0.00
H14	273.59	0.00	0.00	66.11	0.00	10.71	10.49	3.62	5.65	1.76	5.27	18.06	0.00	0.00	2.15	2.15	26.46	2.91	2.73	42.45	15.64	14.55	12.26	43.93	35.42	0.00	11.31	0.00	0.00	6.43	5.65	3.89	0.00	26.41
H15	272.98	0.00	1.86	84.66	0.00	10.13	1.86	0.00	2.70	7.63	11.67	12.79	12.43	4.12	0.00	0.00	34.78	10.41	3.63	37.70	6.79	3.63	27.28	36.59	23.23	0.00	11.06	0.93	3.81	5.97	10.12	4.93	2.87	16.34
H16	278.81	0.00	0.00	57.05	0.00	7.23	1.79	4.57	1.63	10.23	3.67	9.63	2.92	0.00	0.00	0.90	33.00	14.51	0.90	27.23	15.36	1.79	10.08	40.94	31.26	0.00	9.52	0.00	4.95	12.89	10.41	8.37	4.95	21.32
H17	279.58	0.00	0.00	92.05	6.56	17.31	4.02	3.99	8.47	4.81	1.56	1.56	14.57	0.00	2.92	0.00	45.45	3.80	2.46	30.70	2.38	3.74	24.58	32.87	28.78	0.00	20.37	0.00	1.56	2.38	8.04	7.14	0.00	9.48
H18	272.36	0.00	0.00	105.58	0.00	21.37	7.13	6.13	5.98	1.52	8.06	7.33	5.35	1.52	9.81	3.73	24.00	1.52	2.30	24.28	3.73	6.77	13.78	45.26	29.88	0.00	9.11	0.78	0.78	5.39	5.49	11.24	5.35	13.48
H19	349.73	0.00	0.00	82.92	0.77	11.42	5.18	9.95	0.00	8.37	6.59	6.54	9.56	7.19	3.63	0.77	41.18	7.87	8.49	35.39	10.89	10.11	14.39	67.67	31.36	0.00	11.55	0.00	0.77	8.03	17.19	48.17	4.96	0.00
H20	284.32	/	-	61.02	/	2.91	/	/	6.54	/	/	10.87	/	/	11.51	0.78	44.38	/	/	21.60	/	/	/	/	33.80	/	/	/	-	13.65	6.24	49.46	-	1.56
H21	274.70	/	-	91.02	/	13.00	/	/	-	/	/	9.42	/	/	4.26	-	40.45	/	/	29.32	/	/	/	/	14.68	/	/	/	-	2.15	9.26	10.87	-	22.06
H22	270.60	/	0.00	93.40	/	3.40	/	/	7.10	/	/	27.10	/	/	0.00	0.00	45.20	/	/	16.70	/	/	/	/	24.00	/	/	/	4.40	5.00	13.20	2.90	0.00	12.20

2) 年齢調整死亡率（単年）

資料：衛生統計年報（人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口）

宝達志水町（総数）

注）値は旧志雄町、旧押水町の合計した値を計上した

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患		急性気管支炎	消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮						前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎		胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故								
H13	451.52	0.00	0.00	146.84	1.44	25.22	0.00	0.00	35.48	13.16	11.99	30.08	5.43	0.00	0.00	3.80	0.00	60.42	18.55	6.99	64.14	24.01	11.72	28.41	47.83	32.50	0.00	9.87	0.00	6.99	6.16	4.33	33.55	15.31	33.54
H14	435.68	1.28	5.86	149.10	0.00	29.38	8.53	11.25	13.19	2.09	11.57	20.13	4.50	4.88	0.00	7.06	4.65	48.31	18.99	2.09	40.25	7.95	4.66	27.63	45.36	33.92	0.00	16.76	0.00	5.94	7.21	3.37	28.48	25.93	38.71
H15	399.47	0.00	0.00	129.88	9.81	21.45	6.92	1.21	27.90	9.69	9.29	30.24	4.23	0.00	0.00	19.15	0.00	29.50	11.58	1.21	49.01	5.82	27.36	15.83	36.36	29.47	0.00	30.08	1.21	23.46	12.42	4.43	30.36	9.53	33.37
H16	510.67	1.18	3.92	137.84	2.47	22.62	8.59	7.81	10.88	10.78	17.48	35.58	0.00	3.79	1.89	2.36	1.89	45.63	8.17	3.66	59.27	2.36	16.06	40.85	48.02	26.25	0.00	18.38	3.92	11.98	8.02	7.80	76.66	16.81	36.60
H17	367.43	3.01	0.00	152.26	2.53	32.41	15.83	0.00	17.04	6.45	3.64	38.14	0.00	3.93	4.06	12.62	1.05	52.67	8.60	9.12	37.24	4.38	19.02	13.84	22.95	18.32	0.00	12.95	0.00	3.01	4.64	2.11	14.01	0.00	20.96
H18	471.53	0.00	0.00	158.47	6.67	19.54	21.04	8.52	30.00	0.00	10.20	18.04	3.59	0.00	2.80	0.00	0.00	72.35	17.79	14.01	73.43	35.51	5.90	25.74	63.26	34.47	0.00	29.13	0.00	19.12	6.22	3.04	25.47	3.16	11.04
H19	390.78	0.00	0.00	119.67	3.08	8.99	4.19	5.45	23.69	2.37	5.27	25.99	3.87	13.10	0.00	5.71	1.82	43.34	9.32	9.02	54.10	14.50	12.55	26.08	42.74	34.26	0.00	23.11	0.97	6.55	9.85	6.77	19.54	11.60	18.36
H20	416.59	/	-	114.74	/	16.03	/	/	15.95	/	/	17.20	/	/	/	-	0.94	75.13	/	/	60.21	/	/	/	/	27.37	/	/	/	12.90	2.81	5.61	11.00	-	36.83
H21	475.88	/	-	142.36	/	34.18	/	/	11.15	/	/	20.48	/	/	/	6.59	1.83	60.07	/	/	64.52	/	/	/	/	14.58	/	/	/	7.11	2.75	13.75	45.85	11.13	29.10
H22	422.20	/	0.00	127.90	/	28.10	/	/	25.30	/	/	32.80	/	/	/	0.90	0.00	64.00	/	/	43.00	/	/	/	/	22.10	/	/	/	3.20	0.90	8.70	38.30	16.30	43.60

宝達志水町（男）

資料：衛生統計年報（人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	がん										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患	肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺	
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	くも膜下出血	脳内出血									脳梗塞	交通事故		
H13	619.64	0.00	0.00	183.40	0.00	40.70	0.00	0.00	62.17	6.42	13.57	41.47	0.00	/	0.00	8.35	0.00	102.81	23.78	6.42	66.67	15.74	19.62	31.31	101.02	67.32	0.00	24.24	0.00	13.81	11.64	10.43	7.39	7.39	57.26
H14	537.99	4.62	5.93	168.23	0.00	25.56	7.35	16.84	20.64	5.93	22.01	33.00	0.00	/	0.00	6.40	9.25	66.62	32.94	0.00	48.88	5.93	0.00	42.95	79.88	60.75	0.00	23.52	0.00	5.93	4.62	4.62	46.66	46.66	36.65
H15	559.48	0.00	0.00	188.05	9.85	35.65	6.13	0.00	47.90	0.00	15.41	62.51	0.00	/	0.00	14.09	0.00	44.06	16.64	4.46	72.68	4.46	41.14	27.07	73.01	66.88	0.00	33.93	4.46	29.47	12.58	10.03	42.04	9.63	41.93
H16	717.24	4.15	8.54	199.95	6.44	43.36	0.00	6.44	13.64	0.00	27.05	79.05	0.00	/	5.34	0.00	0.00	64.63	9.49	10.59	83.56	4.15	19.84	59.57	83.53	47.46	0.00	31.15	8.54	16.16	6.44	5.34	108.92	34.22	66.63
H17	495.76	6.86	0.00	185.24	6.57	38.12	20.00	0.00	28.31	0.00	5.06	45.92	0.00	/	10.70	14.70	0.00	76.86	15.89	13.43	49.32	0.00	38.92	10.40	51.73	45.16	0.00	13.73	0.00	6.86	0.00	3.83	21.40	0.00	38.58
H18	681.74	0.00	0.00	236.26	16.91	35.90	30.30	0.00	46.74	0.00	22.30	37.67	0.00	/	8.71	0.00	0.00	106.21	28.47	21.58	84.06	37.30	3.58	36.63	97.77	56.02	0.00	56.75	0.00	33.83	5.13	7.16	19.39	0.00	15.40
H19	527.75	0.00	0.00	174.01	6.69	18.01	11.64	13.11	32.80	6.42	6.42	47.92	0.00	/	0.00	0.00	0.00	39.80	8.69	9.89	85.06	13.76	21.48	46.34	80.30	59.47	0.00	33.03	0.00	13.76	14.48	3.47	23.79	3.47	18.43
H20	586.04	/	-	170.92	/	28.44	/	/	24.60	/	/	42.44	/	/	/	-	-	84.89	/	/	92.52	/	/	/	/	43.81	/	/	/	21.79	-	9.83	15.19	-	54.48
H21	736.08	/	-	199.84	/	54.60	/	/	14.44	/	/	44.12	/	/	/	12.14	3.36	101.41	/	/	87.01	/	/	/	/	39.01	/	/	/	9.98	6.72	13.44	88.59	23.88	27.85
H22	664.20	/	0.00	210.40	/	25.40	/	/	37.30	/	/	72.10	/	/	/	0.00	0.00	66.50	/	/	73.40	/	/	/	/	45.30	/	/	/	5.70	0.00	3.30	52.90	17.40	89.60

宝達志水町（女）

資料：衛生統計年報（人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系疾患									糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺					
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房							子宮	前立腺	くも膜下出血						脳内出血	脳梗塞		肺炎	急性気管支炎	交通事故		
H13	340.45	0.00	0.00	120.27	1.99	15.98	0.00	0.00	13.95	16.83	12.17	22.85	10.66	0.00	0.00	23.81	12.84	6.98	64.17	32.72	5.98	25.46	13.25	6.27	0.00	1.99	0.00	1.99	3.32	1.99	58.75	24.32	10.66		
H14	355.22	0.00	7.04	140.74	0.00	29.65	9.30	7.04	8.56	0.00	3.24	11.06	8.55	9.82	8.55	3.24	29.11	5.00	3.24	34.14	10.27	7.52	16.35	21.65	16.35	0.00	9.58	0.00	6.05	8.54	3.24	6.77	3.24	38.74	
H15	288.99	0.00	0.00	89.39	8.31	8.33	7.22	1.67	11.42	16.16	4.11	12.83	8.84	0.00	23.95	0.00	20.73	6.23	0.00	31.71	8.83	13.31	9.57	16.45	10.00	0.00	27.52	0.00	19.00	11.91	1.67	17.32	8.22	24.47	
H16	351.72	0.00	0.00	92.85	0.00	8.89	15.51	8.55	10.92	17.70	6.96	2.94	0.00	5.87	3.30	2.94	34.94	8.89	0.00	46.05	1.65	15.27	29.12	20.72	9.54	0.00	6.90	0.00	6.90	8.61	8.25	49.00	0.00	7.24	
H17	270.47	0.00	0.00	139.89	0.00	31.37	14.44	0.00	7.59	11.70	2.84	34.69	0.00	7.59	9.80	1.45	31.30	2.84	5.56	24.16	8.22	1.45	14.48	7.21	4.30	0.00	11.11	0.00	0.00	7.02	1.45	9.65	0.00	2.84	
H18	344.61	0.00	0.00	117.76	0.00	10.52	11.29	16.69	16.63	0.00	0.00	10.52	7.14	0.00	0.00	0.00	46.13	11.78	5.64	67.88	33.33	8.75	18.46	44.65	19.50	0.00	6.64	0.00	3.81	6.64	1.41	30.99	5.73	7.14	
H19	308.94	0.00	0.00	84.88	0.00	2.79	0.00	0.00	17.11	0.00	4.02	11.41	7.68	24.98	8.86	2.79	42.67	9.60	8.15	38.24	15.59	4.13	18.52	22.04	19.36	0.00	16.51	1.34	0.00	4.02	8.05	20.92	19.58	18.19	
H20	290.74	/	-	75.98	/	6.59	/	/	9.57	/	/	1.31	/	/	-	1.31	64.63	/	/	30.61	/	/	/	/	/	15.75	/	/	/	3.97	3.93	3.93	10.89	-	19.74
H21	300.13	/	-	96.17	/	21.40	/	/	7.21	/	/	7.09	/	/	1.26	1.26	25.90	/	/	52.64	/	/	/	/	9.01	/	/	/	3.97	1.26	13.87	12.05	-	25.26	
H22	234.70	/	0.00	61.90	/	35.00	/	/	15.70	/	/	0.00	/	/	1.20	0.00	65.90	/	/	22.20	/	/	/	/	11.00	/	/	/	1.20	1.20	10.70	22.80	13.60	0.00	

2) 年齢調整死亡率(単年)

資料：衛生統計年報(人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

中能登町(総数) 注)値は旧鳥屋町、旧鹿島町、旧鹿西町の値を計上した

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系疾患										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患 再発瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺			
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮						前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎					交通事故					
H13	406.09	0.00	1.68	131.83	6.28	22.03	6.49	4.03	23.07	11.14	9.34	19.15	4.80	0.00	0.00	3.82	2.93	45.05	14.25	3.37	54.81	4.26	12.70	35.62	34.14	22.06	0.00	23.70	0.00	15.37	7.28	4.97	58.49	13.97	21.72
H14	435.11	0.00	1.63	149.81	6.72	26.10	10.99	12.76	19.83	4.24	3.42	39.24	2.20	3.42	2.43	16.55	4.63	65.47	29.82	8.87	69.93	10.23	4.63	48.00	40.35	32.23	0.00	12.17	2.04	10.13	8.04	3.65	25.89	3.74	5.94
H15	428.86	0.00	1.64	138.66	7.93	31.86	13.37	4.25	13.17	11.27	7.90	9.41	12.46	7.41	0.00	18.75	5.61	62.01	17.00	7.40	47.98	5.61	8.17	33.06	49.98	26.46	0.00	14.40	1.14	4.54	7.55	2.29	37.88	7.43	13.65
H16	427.56	1.57	0.00	126.80	1.57	25.63	7.66	10.26	10.22	9.83	9.16	24.13	6.44	0.00	1.12	26.02	2.25	106.56	27.45	10.54	41.72	7.82	15.03	18.87	45.26	24.09	0.00	11.91	0.00	6.53	4.46	5.20	9.59	0.00	9.15
H17	409.30	0.00	0.00	150.41	3.56	45.46	8.32	7.65	3.56	7.82	4.15	25.63	9.41	3.21	4.96	13.88	5.28	68.06	18.46	13.88	22.80	0.00	7.36	14.50	39.76	27.59	0.00	17.48	0.00	0.93	4.58	3.74	30.49	15.19	14.89
H18	368.03	0.00	0.00	97.06	3.47	27.01	2.23	4.67	14.07	6.07	17.29	7.41	0.00	0.00	0.88	16.65	2.63	68.72	17.99	7.05	34.11	1.71	12.53	18.99	43.80	17.39	0.00	15.89	0.00	5.31	3.23	7.62	23.26	14.13	13.13
H19	421.20	3.96	1.40	146.03	2.26	27.91	21.61	7.94	5.10	6.19	6.19	32.97	1.40	1.70	2.23	3.96	5.91	59.91	14.17	7.63	59.01	10.25	24.24	24.52	34.90	22.36	0.00	12.72	0.00	6.28	4.84	6.60	34.40	3.20	14.91
H20	371.92	/	1.36	125.09	/	19.78	/	/	3.85	/	/	18.67	/	/	/	0.81	0.81	74.27	/	/	34.37	/	/	/	/	24.24	/	/	/	8.01	8.28	3.79	13.24	6.86	14.34
H21	386.15	/	-	124.51	/	9.81	/	/	16.82	/	/	20.85	/	/	/	8.72	2.68	60.82	/	/	52.85	/	/	/	/	23.67	/	/	/	10.10	1.53	4.60	31.67	13.61	6.46
H22	382.40	/	0.00	134.30	/	31.10	/	/	7.50	/	/	20.60	/	/	/	7.20	0.00	79.00	/	/	28.90	/	/	/	/	10.30	/	/	/	17.50	0.70	10.20	14.10	5.20	13.80

中能登町（男）

資料：衛生統計年報（人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系の疾患									糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）			脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺				
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房			子宮	前立腺	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故									
H13	567.06	0.00	4.13	179.33	13.39	30.08	7.08	8.42	46.73	4.13	17.78	29.80	0.00	/	0.00	4.13	4.10	57.30	15.60	4.10	73.55	5.19	17.69	45.50	61.25	34.15	0.00	38.23	0.00	30.03	14.49	4.10	62.79	23.56	43.95
H14	676.45	0.00	4.13	255.70	12.06	53.90	14.13	13.38	35.21	5.11	0.00	77.22	0.00	/	8.36	22.05	0.00	77.24	24.66	17.15	114.34	15.77	7.06	76.10	77.40	64.07	0.00	23.38	4.97	18.41	19.26	4.18	50.55	7.72	12.83
H15	602.52	0.00	4.50	178.40	17.68	51.72	15.45	8.56	24.82	8.56	9.69	19.18	0.00	/	0.00	28.25	6.01	100.84	32.57	13.37	50.67	0.00	7.36	43.30	81.27	46.17	0.00	15.83	3.68	7.27	13.55	0.00	53.61	14.47	21.52
H16	654.13	4.36	0.00	160.76	0.00	33.06	13.03	12.46	18.33	5.21	8.97	46.38	0.00	/	3.77	48.35	3.77	182.73	52.81	23.93	57.56	10.41	16.42	30.73	74.55	38.15	0.00	12.49	0.00	8.72	3.77	8.21	18.49	0.00	18.97
H17	629.33	0.00	0.00	254.83	8.71	95.45	12.87	15.68	4.35	7.47	5.29	50.05	0.00	/	14.56	22.96	7.28	103.34	22.09	26.38	27.22	0.00	5.29	21.93	61.21	45.23	0.00	30.59	0.00	3.12	3.12	3.12	41.07	30.16	24.28
H18	484.05	0.00	0.00	115.21	7.46	40.13	0.00	0.00	20.67	12.27	10.40	11.28	0.00	/	2.94	31.65	0.00	76.74	22.35	7.09	40.12	0.00	17.31	22.81	72.62	22.12	0.00	20.93	0.00	5.79	5.87	3.98	43.03	21.89	26.42
H19	563.10	4.10	0.00	198.80	5.18	40.35	25.23	9.69	3.71	5.18	3.71	64.07	0.00	/	6.62	9.28	13.31	79.32	19.77	2.91	77.49	0.00	42.25	35.24	51.89	28.45	0.00	14.02	0.00	4.10	6.66	5.82	50.50	0.00	0.00
H20	511.33	/	-	158.42	/	20.51	/	/	7.69	/	/	33.75	/	/	-	-	108.48	/	/	/	37.08	/	/	/	/	43.32	/	/	/	17.27	7.88	-	25.83	13.37	23.24
H21	498.10	/	-	137.88	/	5.21	/	/	12.83	/	/	48.09	/	/	10.72	-	62.33	/	/	/	76.47	/	/	/	/	40.96	/	/	/	10.50	2.60	2.60	53.82	26.73	13.77
H22	522.70	/	0.00	152.70	/	29.10	/	/	14.80	/	/	40.50	/	/	10.80	0.00	114.00	/	/	/	38.40	/	/	/	/	14.90	/	/	/	29.70	0.00	7.20	27.40	11.60	26.50

中能登町（女）

資料：衛生統計年報（人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	その他										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血			脳内出血	脳梗塞	呼吸器系の疾患			肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患		胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	くも膜下出血	脳内出血			脳梗塞	呼吸器系の疾患	肺炎			急性気管支炎	消化器系の疾患							
H13	278.38	0.00	0.00	94.58	0.00	16.64	4.62	0.00	3.62	18.53	2.84	11.52	8.94	0.00	3.62	2.84	32.07	12.08	3.62	41.87	3.62	8.34	29.92	13.53	13.53	0.00	12.87	0.00	3.62	1.78	5.34	55.20	3.62	0.00					
H14	259.60	0.00	0.00	76.29	1.72	7.74	9.58	13.58	6.78	3.45	6.61	11.18	3.86	6.61	11.94	7.29	54.43	32.86	1.72	33.99	4.40	1.72	26.16	22.05	16.91	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	3.43	7.29	0.00	0.00					
H15	296.36	0.00	0.00	111.02	0.00	16.29	12.76	1.66	3.27	12.49	5.90	2.58	24.69	14.85	10.40	4.24	32.29	6.59	3.32	44.93	9.59	9.17	24.51	32.09	14.37	0.00	12.91	0.00	1.66	3.32	3.32	23.55	0.00	5.35					
H16	260.20	0.00	0.00	104.22	2.45	20.62	1.60	8.60	2.45	15.69	8.94	8.09	12.66	0.00	5.65	1.60	39.89	2.45	1.60	35.91	5.55	16.71	13.66	30.18	17.53	0.00	12.04	0.00	5.55	5.45	3.20	3.20	0.00	0.00					
H17	242.89	0.00	0.00	84.04	0.00	7.58	5.35	1.33	3.01	8.48	2.67	6.71	19.08	6.27	5.47	4.00	38.72	11.79	5.12	21.88	0.00	8.94	11.60	23.84	14.38	0.00	3.79	0.00	0.00	5.68	4.00	18.56	0.00	6.26					
H18	280.13	0.00	0.00	83.39	0.00	15.26	3.82	8.81	8.85	2.36	24.97	3.82	0.00	0.00	1.25	3.75	68.49	15.33	7.63	30.66	2.91	9.02	17.48	27.58	15.66	0.00	7.36	0.00	3.61	2.36	8.76	5.81	5.81	0.00					
H19	307.14	4.01	2.25	100.76	0.00	17.55	14.61	6.26	6.70	6.31	8.07	10.19	2.25	2.91	0.00	0.00	40.51	8.56	11.86	43.04	18.45	6.36	18.22	25.84	18.38	0.00	13.61	0.00	8.45	2.30	6.91	21.73	6.54	30.20					
H20	257.69	/	2.19	106.08	/	19.42	/	/	1.14	/	/	9.38	/	/	1.14	1.14	40.57	/	/	34.57	/	/	/	/	9.03	/	/	/	-	7.80	5.61	2.19	-	6.91					
H21	300.47	/	-	114.77	/	9.38	/	/	14.45	/	/	5.01	/	/	5.33	5.16	62.34	/	/	34.83	/	/	/	/	14.23	/	/	/	5.45	1.09	5.44	6.54	-	-					
H22	266.40	/	0.00	124.50	/	34.90	/	/	1.00	/	/	2.10	/	/	3.10	0.00	49.50	/	/	20.80	/	/	/	/	7.30	/	/	/	4.00	1.00	11.50	5.40	0.00	1.00					

2) 年齢調整死亡率(単年)

資料：衛生統計年報(人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

管内(総数)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	がん										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)			脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮			前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故											
H13	410.55	0.41	1.03	137.06	2.11	27.37	12.48	4.30	15.91	6.09	7.79	22.11	4.24	2.07	1.85	3.99	2.52	48.85	13.66	7.41	50.54	5.45	13.00	29.60	42.64	30.14	0.00	16.17	0.26	7.46	8.32	6.01	34.40	11.92	20.41
H14	428.19	0.35	0.94	140.90	4.04	29.90	10.05	7.81	10.46	6.50	8.85	25.90	3.34	2.17	2.77	6.73	2.77	63.97	17.43	6.74	53.26	10.93	10.96	29.28	50.61	32.62	0.00	14.58	2.08	6.00	5.41	5.94	26.07	9.12	21.48
H15	433.97	0.00	1.34	128.46	5.92	23.85	7.42	3.99	10.14	9.45	8.88	24.62	7.58	3.39	2.24	8.74	3.21	57.83	21.54	4.72	58.80	11.12	15.80	29.24	48.47	29.51	0.24	15.76	0.61	7.10	6.62	9.58	34.54	11.89	28.24
H16	410.82	0.45	0.39	131.24	3.83	26.17	7.82	8.29	8.35	7.71	8.66	24.24	5.66	3.62	1.24	5.56	2.26	55.23	15.60	5.60	49.17	8.83	15.34	25.00	46.56	26.73	0.00	16.07	1.62	8.57	4.27	7.72	25.92	5.61	20.50
H17	415.17	1.11	0.39	131.84	3.61	29.98	8.83	3.58	8.65	7.73	7.01	27.41	6.52	1.62	3.34	7.17	2.09	65.32	17.12	7.55	43.05	8.50	11.96	22.13	51.07	37.47	0.12	17.21	1.11	6.54	4.64	4.90	23.71	9.00	21.42
H18	405.13	0.71	0.23	134.89	4.78	23.89	10.63	6.22	14.80	5.52	10.48	21.72	4.27	0.91	1.34	11.08	2.62	59.34	15.24	6.75	47.27	10.92	12.02	20.90	46.35	28.22	0.11	16.04	0.62	6.91	8.11	5.57	24.35	7.40	18.87
H19	398.13	1.05	0.46	124.86	2.95	17.12	8.29	7.91	12.10	5.58	8.18	22.66	4.15	3.87	4.12	5.68	4.45	59.62	17.10	7.02	45.83	9.62	13.42	22.27	43.07	26.43	0.00	14.48	1.24	5.88	7.28	7.97	20.39	5.41	20.90
H20	407.64	/	0.27	133.03	/	20.83	/	/	9.52	/	/	24.97	/	/	/	4.92	0.81	65.45	/	/	40.35	/	/	/	/	27.49	/	/	/	5.91	5.63	7.41	25.14	6.94	23.72
H21	400.56	/	0.40	130.68	/	21.41	/	/	11.00	/	/	20.17	/	/	/	4.17	1.32	57.36	/	/	41.37	/	/	/	/	27.52	/	/	/	9.45	6.55	9.70	23.35	5.86	15.59
H22	387.90	/	0.30	126.20	/	21.40	/	/	9.20	/	/	25.70	/	/	/	3.20	0.80	59.40	/	/	34.20	/	/	/	/	27.90	/	/	/	9.40	4.70	10.60	17.90	5.90	23.80

管内（男）

資料：衛生統計年報（人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系疾患										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）			脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	脾	気管、気管支及び肺	乳房	子宮			前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故											
H13	583.25	1.19	2.11	196.47	3.71	41.50	14.90	5.83	30.28	4.52	11.28	36.87	0.00	/	5.33	4.07	3.44	73.54	18.62	11.81	61.03	3.67	16.85	36.41	77.37	53.18	0.00	25.28	0.66	12.79	10.02	5.86	41.08	13.86	35.17
H14	588.93	0.48	1.20	194.41	6.18	45.17	10.30	12.29	14.75	7.11	11.40	43.60	0.00	/	7.35	9.96	2.69	89.95	23.93	11.06	66.14	10.25	11.64	39.46	86.77	52.80	0.00	17.70	4.30	6.07	7.35	5.10	45.41	18.00	31.87
H15	585.76	0.00	1.20	178.93	11.68	41.02	8.96	4.27	16.46	10.42	12.68	46.46	0.00	/	5.88	12.61	4.05	81.63	32.73	8.41	76.06	7.59	26.51	38.02	75.28	51.44	0.60	16.38	0.90	9.52	8.24	11.20	48.28	10.65	34.45
H16	578.29	1.44	0.85	179.96	7.28	41.29	11.36	12.13	12.39	7.91	11.03	41.48	0.00	/	3.59	9.90	3.12	72.78	20.25	11.06	67.58	7.39	23.77	36.42	78.13	42.51	0.00	25.66	3.72	15.28	3.64	8.13	41.36	10.05	32.33
H17	602.14	2.22	0.54	200.64	6.86	52.04	10.77	6.05	11.48	9.70	11.97	50.53	2.09	/	9.32	9.75	3.43	89.59	21.53	13.92	52.40	8.03	17.43	26.94	84.99	62.66	0.00	27.65	1.49	11.68	6.47	5.06	37.60	16.20	26.72
H18	582.93	1.03	0.57	190.94	9.90	37.65	13.75	8.68	23.32	9.32	11.91	39.35	0.00	/	3.85	12.31	1.60	83.45	20.84	9.20	63.75	8.19	17.29	32.47	78.92	47.77	0.39	26.80	0.85	11.52	11.72	5.81	37.38	8.51	28.27
H19	537.80	0.57	0.00	179.76	5.84	23.93	11.60	12.06	21.52	8.20	7.68	45.38	0.00	/	10.48	6.71	7.82	76.33	26.21	7.92	62.32	8.23	20.71	33.01	66.07	38.22	0.00	17.44	2.13	7.01	9.89	5.02	28.75	7.30	32.25
H20	572.35	/	-	187.36	/	36.86	/	/	12.73	/	/	47.94	/	/	6.55	-	91.03	/	/	/	56.11	/	/	/	/	49.04	/	/	/	10.88	6.86	5.30	34.30	9.79	37.37
H21	578.36	/	0.45	182.06	/	31.05	/	/	17.11	/	/	37.96	/	/	8.57	1.48	79.78	/	/	/	55.33	/	/	/	/	48.31	/	/	/	14.72	11.92	8.56	38.45	9.08	22.77
H22	563.50	/	0.90	180.60	/	30.30	/	/	13.70	/	/	48.20	/	/	5.20	1.50	81.50	/	/	/	50.40	/	/	/	/	47.60	/	/	/	16.90	6.60	7.30	25.70	7.60	37.00

管内（女）

資料：衛生統計年報（人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	がん										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）			脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮			前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故											
H13	286.02	0.00	0.21	95.08	0.56	17.35	10.70	3.67	4.86	7.22	5.37	11.39	8.00	3.69	3.78	2.09	30.83	9.20	5.36	43.42	6.99	10.09	24.92	20.41	15.27	0.00	9.72	0.00	3.12	6.80	6.18	29.91	10.14	5.74	
H14	307.95	0.34	0.87	102.63	2.13	17.91	9.91	4.32	7.68	6.57	6.09	12.75	6.48	4.23	4.51	2.91	41.67	11.93	3.70	44.15	11.46	10.26	22.24	28.76	20.76	0.00	12.04	0.71	5.86	4.11	6.21	8.59	0.53	11.42	
H15	324.71	0.00	1.47	93.14	1.03	11.08	6.50	4.04	4.58	8.16	5.83	9.13	14.62	6.33	6.44	2.46	38.52	12.08	2.21	45.19	13.02	7.54	23.16	33.46	16.90	0.00	14.99	0.52	4.80	4.97	8.74	23.72	13.16	22.34	
H16	288.09	0.00	0.00	97.78	1.04	16.12	5.05	5.75	5.29	8.34	6.25	11.56	10.86	6.83	1.72	1.51	39.92	10.72	1.76	36.12	9.74	8.65	17.73	27.34	16.90	0.00	8.64	0.00	2.80	4.82	7.31	14.10	1.35	9.54	
H17	275.00	0.16	0.30	84.87	1.15	14.40	8.04	1.86	6.35	6.19	2.75	9.80	10.47	3.12	4.53	1.36	46.23	13.58	3.15	35.07	8.62	7.52	18.28	30.19	21.76	0.16	8.47	0.84	2.00	3.28	4.80	12.23	2.34	16.16	
H18	276.75	0.54	0.00	95.47	0.89	12.77	7.97	4.66	7.19	2.75	9.96	9.80	8.18	1.64	9.25	3.31	41.08	10.88	4.95	35.81	13.01	7.53	14.06	27.34	16.40	0.00	7.19	0.31	2.73	4.83	5.35	14.17	6.58	10.10	
H19	294.45	1.38	0.70	84.47	0.42	12.64	5.44	3.88	4.47	3.53	8.52	6.74	7.87	7.41	4.37	1.43	46.04	10.24	6.75	33.76	10.76	6.56	15.77	29.81	18.79	0.00	11.66	0.29	4.85	5.36	9.43	15.22	4.18	10.37	
H20	283.00	/	0.41	95.09	/	9.01	/	/	6.59	/	/	8.85	/	/	3.13	1.22	44.73	/	/	27.54	/	/	/	/	/	13.42	/	/	/	1.47	4.90	8.23	17.18	4.19	10.49
H21	272.11	/	-	93.02	/	13.64	/	/	6.47	/	/	8.07	/	/	1.95	1.62	39.84	/	/	29.99	/	/	/	/	/	15.91	/	/	/	3.43	3.03	9.80	10.70	2.27	8.01
H22	256.00	/	0.00	86.70	/	15.30	/	/	5.60	/	/	8.60	/	/	1.70	0.40	41.40	/	/	22.50	/	/	/	/	/	15.50	/	/	/	2.10	3.10	12.10	12.00	3.80	11.90

2) 年齢調整死亡率(単年)

資料：衛生統計年報(人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

石川県(総数)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	がん										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)			脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮			前立腺	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故									
H13	423.38	0.84	1.07	142.83	3.37	27.36	11.74	6.10	15.52	6.02	10.33	25.28	5.63	2.47	2.31	5.40	1.88	60.18	18.11	7.86	51.24	6.25	10.28	32.77	48.45	32.83	0.19	15.40	1.49	6.94	5.66	6.17	23.69	9.28	20.70
H14	413.08	0.50	1.21	141.86	3.70	23.77	11.91	8.03	14.10	8.60	9.07	26.89	4.92	1.97	2.52	5.47	1.52	58.77	17.83	7.33	48.22	6.79	11.29	28.68	48.61	30.18	0.22	16.10	1.63	6.87	5.02	5.75	22.78	8.06	20.19
H15	421.80	0.54	0.56	138.98	5.12	23.32	11.73	5.67	12.72	7.72	9.65	25.46	5.80	3.30	2.31	5.72	2.13	60.77	19.08	6.82	47.65	6.73	12.29	26.76	48.51	29.91	0.30	16.55	1.36	6.94	4.78	5.86	24.89	8.72	22.65
H16	401.88	0.35	0.48	139.41	4.28	23.68	10.68	6.36	13.20	6.86	10.91	25.50	6.47	2.91	2.42	4.94	1.56	57.91	16.15	7.18	44.61	6.06	11.47	25.93	46.92	29.79	0.16	14.61	1.22	6.57	4.53	5.76	19.82	6.13	19.51
H17	405.02	0.48	0.64	134.45	4.90	23.90	10.28	5.11	11.94	6.39	9.12	26.82	5.74	2.22	2.67	5.10	1.52	64.01	18.94	7.27	42.02	7.30	10.71	22.87	50.88	33.02	0.33	15.41	0.70	7.34	5.13	4.86	19.93	6.56	20.51
H18	383.51	0.51	0.33	134.64	3.89	23.10	10.08	5.96	13.32	6.84	10.32	26.03	5.67	1.56	2.29	5.70	1.80	56.41	17.17	6.95	39.39	6.53	9.95	21.56	45.04	29.58	0.08	13.87	0.68	6.03	5.50	5.33	19.48	5.32	19.07
H19	385.65	0.70	0.35	131.77	4.03	18.87	10.66	5.74	12.60	6.11	9.98	26.55	5.08	2.71	2.83	4.96	1.86	56.92	15.20	6.46	41.95	7.34	10.95	22.38	44.79	28.75	0.05	15.29	0.83	6.06	4.91	5.61	17.47	4.96	19.44
H20	379.22	/	0.29	130.53	/	19.86	/	/	11.62	/	/	26.24	/	/	/	4.92	0.94	55.27	/	/	37.96	/	/	/	/	29.07	/	/	/	5.11	5.73	5.93	20.37	5.40	17.42
H21	380.09	/	0.57	130.27	/	19.31	/	/	11.33	/	/	26.01	/	/	/	5.06	1.21	53.10	/	/	37.12	/	/	/	/	28.16	/	/	/	6.57	5.56	7.69	18.21	4.67	20.22
H22	380.90	/	0.40	127.70	/	19.10	/	/	11.20	/	/	25.20	/	/	/	4.20	1.00	54.10	/	/	35.40	/	/	/	/	29.10	/	/	/	5.80	5.40	7.80	20.50	5.00	19.70

石川県（男）

資料：衛生統計年報（人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	がん										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）			脳血管疾患	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺				
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮			前立腺	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患		くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎				胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故					
H13	602.13	1.05	1.47	208.67	6.21	43.35	16.11	8.65	24.76	6.45	13.58	47.38	0.31	/	6.24	6.87	2.50	82.91	26.69	11.32	69.33	5.49	14.24		80.54	54.14	0.29	20.69	2.28	10.03	6.79	6.38	35.61	13.72	32.36
H14	579.34	0.51	2.16	200.04	7.12	36.22	14.78	12.31	21.12	10.23	10.71	47.25	0.09	/	6.82	8.89	1.27	80.03	25.75	9.49	63.12	6.46	15.39	38.52	80.62	48.86	0.30	21.22	2.47	10.05	6.16	4.33	36.21	13.09	31.18
H15	591.55	0.49	1.00	199.46	9.49	37.63	14.56	9.59	20.15	8.17	13.46	47.40	0.10	/	6.21	7.17	2.40	81.48	27.61	9.59	63.63	5.76	17.19	37.92	80.32	49.15	0.23	20.73	2.06	9.21	5.88	5.99	34.81	11.79	34.77
H16	570.20	0.61	0.76	198.04	7.61	38.72	13.09	10.00	20.87	7.44	15.12	44.86	0.00	/	6.46	6.98	1.59	76.86	22.41	10.98	60.62	4.37	17.01	37.91	79.66	48.85	0.17	19.97	2.03	9.37	5.50	4.62	31.98	9.42	29.88
H17	569.24	0.78	1.44	189.84	9.34	35.78	11.46	7.28	18.13	7.64	11.85	48.07	0.21	/	6.87	6.92	1.37	86.20	25.86	10.41	53.43	5.57	16.23	30.26	83.56	53.67	0.35	21.67	1.07	11.25	7.86	4.42	29.88	9.56	31.57
H18	541.11	0.52	0.60	189.98	7.55	36.93	10.98	8.38	18.73	9.12	13.58	45.48	0.00	/	5.88	7.25	2.19	77.32	26.19	9.65	53.94	6.06	14.82	30.71	73.39	46.70	0.20	19.33	0.75	9.23	7.65	4.32	27.91	6.40	29.61
H19	536.65	0.89	0.41	187.96	7.57	30.12	12.69	9.20	19.11	7.59	12.53	48.02	0.00	/	7.31	5.50	2.78	75.91	21.81	9.07	55.75	7.66	15.68	30.68	73.37	45.64	0.06	20.03	1.40	7.80	6.61	3.77	25.74	7.19	30.41
H20	536.87	/	0.41	183.77	/	29.71	/	/	17.83	/	/	46.31	/	/	6.49	0.80	77.09	/	/	51.25	/	/	/	/	/	48.92	/	/	/	7.74	8.11	3.47	30.74	7.65	27.20
H21	535.69	/	0.86	183.05	/	30.81	/	/	17.98	/	/	45.99	/	/	7.54	1.34	72.43	/	/	50.80	/	/	/	/	/	46.82	/	/	9.44	7.53	5.36	27.29	7.00	28.65	
H22	535.30	/	0.80	182.60	/	29.50	/	/	18.50	/	/	45.50	/	/	5.40	1.20	70.80	/	/	49.60	/	/	/	/	/	46.80	/	/	9.40	6.10	7.10	27.40	6.10	29.90	

石川県（女）

資料：衛生統計年報（人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	がん										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）				脳血管疾患			呼吸器系の疾患		消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺	
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮			前立腺	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故								
H13	293.67	0.78	0.79	96.04	1.15	15.77	8.38	4.23	7.92	5.51	7.80	9.71	10.37	4.50	4.16	1.54	42.27	11.33	5.53	38.60	6.59	6.93	23.57	29.48	20.16	0.14	10.90	0.88	4.15	4.78	6.08	14.21	5.11	9.64
H14	289.61	0.54	0.60	100.58	0.90	15.03	9.70	4.62	8.56	7.24	7.73	12.28	9.22	3.58	2.79	1.61	42.03	11.68	5.51	37.56	6.78	7.86	22.30	29.57	19.31	0.16	11.35	1.06	4.04	4.21	6.24	11.37	3.23	9.65
H15	297.44	0.55	0.39	95.49	1.60	12.72	9.71	2.69	6.49	7.33	6.78	9.85	11.01	6.02	4.80	1.95	44.54	12.22	4.88	36.34	7.03	8.28	19.80	30.05	18.85	0.33	12.79	0.82	4.77	3.96	5.73	16.59	5.83	11.00
H16	277.84	0.15	0.31	97.95	1.53	13.06	8.76	3.54	6.77	6.51	7.80	11.79	12.23	5.37	3.23	1.40	41.98	10.68	4.25	33.52	7.30	6.97	18.27	27.67	18.56	0.15	10.14	0.62	4.17	4.06	6.17	9.83	3.02	9.73
H17	284.99	0.24	0.19	95.61	1.35	15.33	9.62	3.50	6.87	5.53	6.87	11.48	10.64	4.12	3.63	1.55	46.55	13.13	4.97	33.59	8.47	6.45	17.80	31.61	21.12	0.38	9.87	0.37	3.70	3.33	5.03	12.01	3.88	9.97
H18	266.23	0.49	0.15	94.64	1.01	12.72	9.50	4.16	8.58	5.18	7.95	11.99	10.75	2.84	4.33	1.54	39.40	10.23	4.74	28.59	6.68	6.04	15.33	28.52	20.00	0.00	9.29	0.58	3.19	4.07	5.63	12.82	4.26	8.93
H19	273.11	0.58	0.31	90.83	1.05	10.29	9.21	2.89	7.31	5.12	8.10	11.06	9.64	5.03	4.28	1.04	41.08	9.98	4.31	32.04	7.07	7.09	16.95	28.02	18.98	0.05	11.47	0.40	4.56	3.63	6.43	11.00	2.96	8.85
H20	260.9	/	0.2	91.8	/	13.0	/	/	6.5	/	/	11.4	/	/	3.5	1.0	38.0	/	/	28.2	/	/	/	/	/	17.2	/	/	2.7	4.0	6.9	11.8	3.3	7.8
H21	267.69	/	0.35	94.91	/	10.60	/	/	5.83	/	/	11.70	/	/	3.36	0.98	38.00	/	/	26.78	/	/	/	/	/	16.90	/	/	3.71	4.32	8.53	9.80	2.19	11.98
H22	265.30	/	0.20	87.50	/	11.50	/	/	5.10	/	/	10.20	/	/	3.30	0.80	40.10	/	/	25.30	/	/	/	/	/	18.50	/	/	2.50	4.90	8.10	15.00	3.90	9.90

3) 年齢調整死亡率（3年移動平均）

資料：衛生統計年報（人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口）

七尾市（総数） 注）値は旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した値を計上した

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）			脳血管疾患	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺				
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮			前立腺	くも膜下出血	脳内出血		脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故										
H11	480.21	0.20	1.38	148.31	4.25	28.65	10.97	6.47	14.36	7.36	8.97	26.88	3.07	1.61	2.21	13.02	2.13	54.89	17.85	8.31	70.94	9.23	12.55	39.60	59.17	38.03	0.37	20.27	1.12	11.25	6.53	6.31	29.61	13.00	19.23
H12	451.35	0.19	0.51	145.33	3.50	30.79	13.89	4.67	15.16	6.86	7.92	25.13	3.48	1.66	2.61	12.68	2.15	53.93	17.05	8.11	57.05	6.30	10.69	32.63	54.53	34.41	0.35	18.22	0.70	9.47	7.73	6.12	25.50	8.43	21.83
H13	431.31	0.18	0.25	141.99	3.05	32.04	13.77	3.20	14.15	7.59	8.12	21.95	3.58	2.03	2.39	8.93	2.00	61.16	18.85	7.02	53.25	6.54	12.38	30.19	51.61	31.91	0.21	13.02	1.21	5.71	7.70	6.48	25.31	6.90	19.02
H14	432.70	0.00	0.81	142.52	3.50	31.01	11.41	3.88	11.09	8.35	9.16	23.76	5.69	3.31	2.63	4.58	2.20	61.82	17.77	5.80	56.87	9.77	13.79	29.76	46.17	28.00	0.20	13.16	1.18	6.07	7.44	8.24	24.27	7.67	25.33
H15	434.11	0.00	0.80	137.44	4.19	30.02	8.54	5.98	10.08	8.15	8.27	23.26	7.00	2.60	2.21	4.52	2.74	66.61	18.51	6.23	59.34	11.87	16.12	29.29	45.83	25.08	0.19	13.82	1.71	6.39	4.14	8.99	24.33	5.70	23.21
H16	437.10	0.24	1.01	130.40	3.82	26.74	8.81	4.12	9.40	6.94	7.81	26.98	7.89	2.18	1.99	4.56	3.40	67.55	20.05	7.37	56.50	12.53	15.91	26.25	46.89	27.67	0.29	16.93	1.03	8.86	4.09	7.92	27.27	8.06	25.82
H17	421.02	0.49	0.31	133.78	4.55	27.62	10.52	5.03	11.90	5.61	7.74	24.75	7.62	1.37	1.59	7.41	3.46	68.62	19.28	8.19	47.81	10.32	14.45	22.85	43.27	26.56	0.19	16.90	1.18	8.69	4.89	5.73	25.07	6.11	20.73
H18	415.08	0.81	0.53	133.00	4.13	23.21	10.37	5.32	11.61	6.59	9.83	24.04	5.94	2.40	2.17	8.24	3.55	71.16	20.42	8.00	43.31	8.64	12.73	21.43	40.23	24.98	0.18	15.46	1.55	8.04	6.62	5.05	22.38	6.41	23.50
H19	399.21	/	0.31	137.40	4.68	21.49	8.93	6.56	12.42	7.60	8.86	23.69	6.75	2.33	/	8.28	2.86	65.50	16.93	6.04	37.23	6.35	11.37	19.09	/	17.53	/	/	/	5.67	6.79	6.50	19.85	5.20	25.92
H20	393.90	/	0.48	136.93	3.72	21.87	7.59	6.39	12.67	7.05	9.06	24.07	5.47	3.90	/	4.18	2.04	60.45	13.88	6.65	36.76	7.38	10.08	18.50	/	20.55	/	/	/	5.63	6.90	8.44	15.48	4.65	23.33

七尾市（男）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	内臓疾患										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）				脳血管疾患	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺			
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮			前立腺	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	くも膜下出血		脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍				交通事故					
H11	681.06	0.00	2.73	211.49	9.89	44.69	14.19	7.81	21.61	7.63	13.30	45.42	0.00	/	6.09	18.29	2.90	78.88	30.35	9.91	94.70	8.60	18.41	57.24	95.57	58.90	0.58	30.22	1.06	17.29	8.97	2.62	43.16	19.27	33.20
H12	643.24	0.00	1.07	214.94	7.54	49.30	16.66	5.12	24.08	6.93	11.95	43.89	0.00	/	7.38	18.82	3.33	75.68	27.48	9.60	70.95	4.91	15.02	43.01	88.91	54.46	0.55	27.29	1.02	15.79	8.58	2.97	39.21	12.77	35.56
H13	607.23	0.00	0.00	202.33	4.50	47.40	17.08	6.15	21.18	8.13	11.14	39.33	0.00	/	6.31	12.84	3.24	83.69	29.37	8.08	67.46	5.09	16.65	40.19	89.75	54.07	0.52	18.49	2.19	9.10	8.91	3.28	40.26	11.16	29.54
H14	591.49	0.00	0.50	199.68	5.37	49.38	13.35	6.82	17.62	9.45	13.01	42.81	0.00	/	6.99	5.75	3.82	84.79	25.10	8.66	70.41	6.94	20.70	37.44	81.13	52.90	0.50	18.28	1.63	9.59	8.36	6.46	32.39	8.08	34.31
H15	587.61	0.00	0.48	185.40	6.63	47.51	12.85	9.40	13.49	10.08	10.71	40.76	0.00	/	5.83	6.34	4.35	86.39	24.68	9.93	75.26	8.60	25.37	38.05	80.05	47.05	0.48	19.58	2.86	10.24	6.34	8.67	34.88	6.24	31.21
H16	620.93	0.55	0.92	190.95	7.47	45.61	12.58	5.62	14.52	8.93	12.13	49.16	1.67	/	5.86	6.07	5.99	88.04	23.22	13.60	73.68	10.48	25.48	35.36	80.62	51.85	0.47	26.09	1.18	15.42	6.79	8.53	39.91	9.18	34.75
H17	614.57	0.98	0.43	193.89	8.63	44.60	14.10	8.28	18.53	7.85	9.70	44.05	1.65	/	4.98	9.39	4.72	91.40	22.43	14.24	62.98	8.00	20.76	34.21	76.82	47.49	0.34	28.13	1.87	15.19	8.61	5.80	40.68	8.27	32.35
H18	597.46	0.96	0.41	196.06	8.06	35.28	13.07	9.92	19.76	10.07	12.88	45.77	1.61	/	6.35	10.15	4.24	99.74	26.95	12.63	53.28	6.48	16.21	30.59	71.00	43.66	0.33	24.29	2.34	11.85	10.14	3.68	36.84	9.48	38.22
H19	551.17	/	0.00	187.70	8.87	31.75	10.60	11.15	19.09	10.39	9.98	44.81	0.00	/	/	10.44	2.60	90.89	24.62	8.40	46.67	2.46	16.29	27.93	/	33.02	/	/	/	7.48	10.58	3.26	28.56	5.57	41.43
H20	535.09	/	0.00	183.99	8.42	29.60	8.59	9.62	19.23	9.80	11.18	44.89	0.00	/	/	6.83	2.60	84.05	22.19	9.66	45.15	5.12	14.90	24.47	/	37.55	/	/	/	6.91	11.54	5.25	20.66	4.97	36.75

七尾市（女）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	がん										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）				脳血管疾患			呼吸器系の疾患		消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮			前立腺	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故									
H11	333.52	0.30	0.70	103.50	0.00	16.25	8.88	5.17	8.72	7.30	5.91	14.49	5.67	2.60	/	8.67	1.45	38.34	9.93	7.05	55.62	9.56	8.55	28.41	39.01	26.62	0.19	11.47	1.26	5.90	4.94	7.76	17.19	7.65	5.44
H12	310.62	0.29	0.18	96.59	0.29	16.90	12.41	4.22	8.14	6.57	5.19	12.69	6.49	2.79	/	7.75	1.27	39.13	10.25	7.38	47.57	7.53	7.47	25.31	34.58	22.50	0.18	10.57	0.71	4.00	6.81	7.47	13.66	4.94	8.15
H13	302.04	0.28	0.34	98.30	1.88	20.00	11.99	0.85	9.07	6.75	5.30	9.82	6.75	3.69	/	6.04	1.14	44.25	11.53	6.81	43.90	7.97	8.88	23.56	28.94	18.77	0.00	8.67	0.58	2.77	6.58	7.73	12.42	2.92	8.70
H14	318.53	0.00	1.03	101.84	1.82	17.07	10.72	1.47	6.40	7.01	5.76	9.92	10.82	6.12	/	4.05	1.02	43.44	11.81	4.23	46.79	11.79	8.48	24.36	25.48	13.26	0.00	9.01	0.84	2.98	6.45	8.92	18.47	7.62	16.61
H15	324.60	0.00	1.03	103.99	2.01	17.22	5.51	3.57	7.63	6.46	5.90	10.61	13.38	4.87	/	3.44	1.39	48.65	12.74	3.48	47.68	14.27	8.88	23.49	26.35	12.05	0.00	9.40	0.82	3.14	2.41	8.85	16.81	5.47	16.11
H16	302.90	0.00	1.14	88.83	0.58	13.70	6.15	3.47	5.33	5.05	4.31	10.88	13.47	4.05	/	3.49	1.52	50.05	17.10	2.81	43.08	13.60	8.18	20.13	26.91	12.57	0.14	9.18	0.94	2.92	1.92	7.48	18.05	7.42	17.30
H17	278.24	0.13	0.24	91.34	1.28	14.90	7.94	3.04	6.14	4.01	6.44	10.87	12.91	2.56	/	5.38	2.67	49.37	16.55	3.74	37.44	12.15	9.15	15.88	22.85	12.96	0.13	8.07	0.68	2.96	2.15	5.58	13.31	4.43	9.77
H18	280.73	0.67	0.58	87.98	0.91	14.05	8.80	1.39	4.61	3.95	7.56	8.71	9.72	4.56	/	6.16	2.97	49.50	15.93	4.92	36.43	10.40	9.69	15.56	21.28	12.94	0.12	8.36	0.81	4.65	4.22	5.60	11.14	3.99	9.54
H19	289.45	/	0.45	101.74	1.10	13.44	7.95	2.25	6.23	5.53	8.40	9.15	13.07	4.35	/	5.92	2.77	47.02	11.19	4.60	30.64	9.64	7.33	13.03	/	8.12	/	/	/	4.35	4.21	7.76	12.91	5.23	11.63
H20	284.88	/	0.74	99.82	0.42	12.50	7.07	2.92	5.48	5.25	8.13	9.44	12.00	5.87	/	2.07	1.32	43.65	7.81	4.37	29.01	6.70	6.83	14.54	/	10.18	/	/	/	4.16	3.72	9.66	12.75	4.72	9.47

3) 年齢調整死亡率 (3年移動平均)

資料：衛生統計年報 (人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

羽咋市 (総数)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	呼吸器系の疾患	肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	
					H11	428.21	2.59	0.59	153.31	5.02	32.66	8.78	6.93	11.33	10.10	11.00	33.44	5.45	1.02	2.59	1.39	5.71	44.27	20.13	3.83	59.23	9.40	10.77	38.47	54.44	36.28	0.00	10.88	0.91	5.51	4.90
H12	427.40	2.55	0.86	144.76	4.93	27.64	9.55	7.56	12.55	6.81	9.47	28.13	5.66	0.29	1.20	2.39	5.54	48.12	18.38	6.31	58.55	6.48	14.97	36.53	54.76	36.90	0.00	12.54	0.87	4.30	5.01	7.53	27.91	8.22	13.90	
H13	398.86	1.32	0.28	129.19	4.27	22.95	9.45	5.99	9.24	8.83	6.83	25.58	4.09	0.00	1.47	2.77	6.31	49.34	15.16	8.99	51.70	7.36	11.52	31.93	47.54	28.68	0.00	19.35	1.42	9.11	4.28	6.36	31.30	10.63	14.22	
H14	411.08	0.71	0.27	131.24	3.20	23.69	10.85	7.78	6.07	6.86	8.53	25.08	5.84	0.51	1.42	5.67	5.80	50.44	17.10	8.21	54.67	8.84	12.82	32.15	47.80	31.30	0.00	20.16	0.85	7.16	5.30	6.80	39.88	17.88	9.77	
H15	400.53	0.43	0.00	130.76	3.56	24.28	9.14	6.82	4.32	9.47	9.07	24.97	5.08	6.31	1.37	4.53	3.96	47.67	18.11	5.19	49.91	10.76	10.37	27.96	52.83	34.33	0.00	20.15	0.84	8.87	4.54	6.63	32.36	16.56	17.15	
H16	405.34	1.01	0.00	128.95	3.34	29.53	7.12	7.33	4.91	8.77	10.08	20.01	5.36	6.41	2.57	5.89	1.79	47.70	17.89	2.97	51.01	9.80	13.31	27.40	58.24	39.77	0.00	15.06	0.80	6.01	4.99	6.03	26.00	12.28	26.50	
H17	373.67	1.46	0.46	121.92	2.13	27.33	7.83	4.54	7.16	7.32	9.60	19.42	4.23	6.07	2.46	6.26	0.88	40.15	12.82	3.17	49.17	10.59	12.06	23.63	54.21	37.80	0.00	13.70	1.05	6.66	5.19	4.73	22.07	7.48	24.85	
H18	375.92	1.67	0.45	115.60	1.45	25.38	7.17	3.73	9.46	3.91	7.51	22.34	4.76	0.45	5.22	7.32	4.19	48.96	14.68	4.55	46.08	11.01	10.37	21.84	52.52	35.47	0.00	11.69	1.04	5.46	5.24	6.05	24.99	8.26	23.56	
H19	383.99	/	0.45	124.83	2.30	22.65	9.50	3.22	9.56	2.56	7.81	26.29	7.20	0.67	/	7.85	4.43	48.21	13.00	7.17	44.19	11.53	7.22	21.96	/	32.83	/	/	/	/	6.02	4.41	7.27	30.39	12.08	15.95
H20	405.62	/	0.34	129.04	4.67	26.22	10.01	3.12	9.32	3.73	7.45	21.93	6.85	1.41	/	7.87	4.32	53.30	15.35	6.94	41.77	9.27	9.12	22.25	/	32.08	/	/	/	/	7.50	4.09	8.50	29.20	11.55	21.14

羽咋市（男）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	悪性腫瘍										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患			肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮						前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故							
H11	607.45	4.26	0.00	211.20	10.28	47.63	7.29	9.13	19.00	9.65	14.30	59.33	0.00	6.79	2.63	11.66	70.54	32.58	6.56	78.75	8.60	14.04	54.62	98.44	61.83	0.00	13.92	1.16	8.77	8.85	3.57	24.22	8.25	27.62	
H12	598.63	5.31	0.00	197.19	10.14	35.73	16.39	9.32	22.66	6.61	11.11	49.72	0.00	2.85	2.78	9.37	77.78	30.51	10.81	65.33	8.66	16.29	38.95	106.63	69.05	0.00	14.73	1.12	5.26	7.82	3.44	41.81	10.24	14.61	
H13	561.76	2.38	0.00	187.25	8.93	29.74	12.59	5.80	16.00	9.72	10.54	47.49	0.00	3.85	2.53	9.51	71.21	21.21	15.58	52.10	8.24	9.95	32.06	93.08	52.80	0.00	22.11	3.42	8.00	5.22	4.49	51.15	16.50	18.60	
H14	548.88	0.93	0.00	186.48	6.35	35.68	14.38	7.37	10.61	7.81	13.15	42.97	0.00	4.25	9.69	5.26	67.42	23.06	14.33	63.16	8.95	12.90	39.53	77.17	47.69	0.00	16.80	2.27	2.94	7.76	6.19	60.98	21.88	16.08	
H15	532.93	0.00	0.00	169.77	7.32	39.82	6.83	7.15	6.24	12.80	13.37	37.81	0.00	4.11	9.10	3.25	66.36	25.38	10.47	62.34	10.83	13.31	36.49	84.56	51.52	0.00	20.83	2.22	9.90	4.60	4.96	51.10	23.66	26.15	
H16	534.87	1.65	0.00	174.73	7.05	52.02	7.26	8.42	3.08	12.30	15.79	33.17	0.00	6.87	10.32	0.00	62.67	26.89	6.04	63.59	6.97	20.41	36.22	87.00	55.82	0.00	19.98	1.68	11.00	5.84	4.41	38.88	15.39	28.59	
H17	511.29	1.66	1.10	167.18	5.02	49.10	9.86	7.98	8.71	8.96	14.98	29.74	0.00	6.15	5.57	1.12	50.71	16.78	4.97	62.52	7.82	19.24	30.71	91.88	60.94	0.00	24.04	1.69	13.55	4.93	3.08	37.86	13.25	24.64	
H18	534.61	1.62	1.11	183.40	3.57	49.58	11.39	5.26	13.24	4.76	8.65	43.15	0.00	12.82	4.42	9.31	59.54	19.66	8.41	64.27	7.12	19.57	32.87	83.83	51.16	0.00	17.16	1.69	9.60	6.26	4.42	43.70	14.43	24.01	
H19	567.56	/	1.11	199.31	5.56	46.86	15.84	3.81	16.74	2.01	7.20	52.38	0.00	/	7.84	9.29	62.98	15.57	11.68	63.18	7.80	14.08	34.49	/	54.77	/	/	/	/	11.35	4.79	5.28	55.74	20.69	25.45
H20	600.75	/	0.95	210.39	9.38	46.24	16.60	3.69	15.38	8.74	5.91	48.66	0.00	/	11.37	8.33	70.77	21.30	13.38	58.90	7.58	16.78	32.28	/	47.28	/	/	/	13.43	4.90	5.82	48.92	17.24	35.37	

羽咋市（女）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	悪性腫瘍										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺	
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮						前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故							
H11	297.90	1.21	0.98	112.36	0.00	20.56	9.67	5.16	4.95	10.40	8.66	15.51	10.28	1.70	0.41	1.62	25.95	12.14	1.62	45.59	8.86	8.93	27.80	25.64	20.35	0.00	8.05	0.82	2.68	2.47	8.60	14.22	5.29	14.69
H12	305.20	0.78	1.33	109.73	0.00	21.91	3.44	7.11	4.68	6.67	7.98	13.09	10.89	0.39	1.96	3.14	29.03	10.91	3.93	52.92	3.53	15.58	33.81	22.42	17.85	0.00	9.91	0.79	3.00	2.36	9.03	16.11	7.17	13.79
H13	277.53	0.75	0.38	89.19	0.00	18.10	5.83	7.53	4.17	8.84	4.25	9.21	7.99	0.00	2.91	4.53	33.36	10.13	4.94	49.38	5.53	13.51	30.34	19.66	14.98	0.00	16.89	0.38	9.50	2.65	7.18	13.77	5.11	10.11
H14	312.03	0.71	0.37	93.14	0.37	15.72	7.75	9.16	2.92	6.90	5.35	10.30	11.28	0.85	3.30	6.39	37.96	12.34	4.41	47.84	7.47	13.66	26.70	30.91	22.69	0.00	23.36	0.00	10.30	2.56	6.95	21.97	13.54	4.27
H15	305.52	0.67	0.00	105.85	0.36	13.83	11.20	6.77	2.95	7.96	5.83	14.69	9.75	12.04	1.85	4.45	33.87	12.47	1.77	39.37	9.42	8.24	21.71	33.66	24.44	0.00	20.26	0.00	7.55	3.95	7.18	16.74	9.21	9.26
H16	313.21	0.36	0.00	98.03	0.36	13.52	7.86	6.57	6.14	6.08	5.57	10.03	10.22	12.27	3.08	2.97	35.98	10.30	1.07	40.88	11.42	7.64	21.10	41.59	30.87	0.00	11.34	0.00	1.31	3.94	6.71	16.54	9.12	25.32
H17	274.19	1.12	0.00	90.11	0.00	11.25	6.13	1.92	5.54	5.92	5.30	12.44	8.13	11.75	7.06	0.68	32.45	9.01	2.34	37.46	12.66	5.45	18.33	31.69	24.57	0.00	5.05	0.34	0.63	4.95	5.46	10.12	2.92	25.93
H18	256.47	1.42	0.00	64.86	0.00	6.86	3.29	2.68	5.87	3.01	6.79	7.56	9.01	0.77	9.42	0.33	39.38	10.08	2.24	32.13	14.60	1.91	14.64	33.62	26.27	0.00	6.73	0.33	2.03	4.28	6.81	10.50	3.02	24.31
H19	244.20	/	0.00	68.73	0.00	4.76	3.79	2.78	3.25	2.84	8.30	7.83	13.64	1.08	7.18	0.76	35.25	10.42	3.84	30.74	14.74	1.26	14.11	/	19.55	/	/	/	1.39	3.93	8.11	9.93	3.96	7.42
H20	243.78	/	0.00	65.57	1.13	8.21	4.65	2.76	4.40	2.22	6.32	2.73	13.06	2.54	3.53	1.07	39.30	10.15	2.59	25.88	10.65	0.61	14.32	/	23.42	/	/	/	1.99	3.52	9.64	6.01	0.84	5.39

3) 年齢調整死亡率 (3年移動平均)

資料：衛生統計年報 (人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

志賀町 (総数) 注) 値は旧富来町、旧志賀町を合計した値を計上した

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系疾患										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮						前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故								
H11	476.39	0.64	1.48	143.04	2.72	32.74	8.33	7.40	7.61	15.02	12.60	25.77	2.91	1.83	1.78	1.93	2.38	70.35	25.67	10.16	53.13	7.00	14.20	27.09	61.24	43.10	0.00	19.67	1.61	8.74	8.01	11.60	28.74	13.93	27.15
H12	462.47	0.47	1.71	137.74	1.63	34.05	9.46	8.66	9.89	11.05	9.96	22.17	2.06	2.68	2.87	3.13	1.05	70.86	22.83	9.49	53.65	7.09	14.73	26.42	50.72	36.89	0.00	14.00	1.21	3.05	6.52	10.51	33.86	15.80	27.62
H13	448.71	0.45	1.68	130.68	1.67	29.30	9.23	7.70	9.80	7.72	10.25	27.48	1.76	2.15	4.18	5.61	1.19	60.18	16.07	7.57	52.85	8.71	16.18	22.64	56.58	38.91	0.00	14.79	0.94	2.98	4.96	7.29	34.73	14.18	32.01
H14	417.06	0.44	1.66	114.41	3.91	21.71	8.30	6.54	8.33	4.07	6.83	23.63	2.02	2.57	4.58	5.44	1.13	57.54	16.72	7.07	48.55	8.85	15.39	22.67	55.15	37.93	0.00	13.13	0.90	2.62	4.87	9.53	36.89	9.77	32.79
H15	410.04	0.22	0.44	119.75	6.17	20.18	6.32	6.84	6.01	5.60	9.23	27.04	2.65	0.85	3.90	4.20	0.86	49.15	16.01	4.73	48.71	11.79	14.77	20.97	55.81	35.72	0.00	13.69	1.49	4.47	6.16	10.00	30.70	7.54	34.70
H16	389.78	0.21	0.42	120.14	6.50	18.01	4.63	5.87	6.92	9.77	7.34	25.93	5.29	0.84	3.07	3.64	0.63	47.97	17.21	3.08	46.25	9.17	10.94	25.51	53.10	37.34	0.00	15.46	1.69	4.77	5.71	10.72	27.93	10.18	18.56
H17	406.04	0.54	0.00	135.07	5.69	20.19	5.84	8.87	6.71	9.96	8.35	28.97	4.00	0.34	1.69	4.73	1.22	45.14	10.17	2.49	46.36	7.89	12.20	23.17	57.64	40.91	0.00	17.20	1.68	4.73	9.11	9.03	22.46	11.43	18.84
H18	417.38	0.33	0.00	127.98	5.48	17.49	4.98	9.13	11.43	9.36	7.35	25.09	5.01	1.49	3.16	6.68	1.19	49.69	11.18	3.82	49.99	10.22	12.50	24.21	63.20	44.80	0.00	18.37	0.61	3.02	10.25	10.13	21.81	8.76	14.28
H19	435.10	/	0.00	124.61	4.75	16.95	5.10	9.23	11.62	7.68	12.85	23.06	2.39	1.53	/	6.91	1.17	57.54	14.78	4.91	54.61	12.96	18.17	19.53	/	46.39	/	/	/	3.43	11.85	9.71	29.08	4.00	18.45
H20	425.58	/	0.00	116.74	4.40	14.80	7.38	7.47	9.01	8.05	15.22	18.27	4.88	1.52	/	5.69	0.37	63.29	16.16	5.21	46.99	13.68	15.41	17.18	/	41.24	/	/	/	8.10	9.73	10.31	33.38	3.64	15.29

志賀町（男）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	悪性新生物										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患	肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	くも膜下出血	脳内出血				脳梗塞	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍				交通事故				
H11	690.84	0.00	2.12	218.51	2.49	54.94	8.07	14.47	15.47	17.06	14.68	55.33	0.00	/	4.20	1.38	3.26	90.84	32.51	15.45	84.73	9.65	24.26	43.27	85.66	56.11	0.00	34.06	4.01	16.21	12.87	10.88	43.11	19.99	46.03	
H12	681.02	1.24	3.52	210.68	1.16	56.71	9.74	13.33	17.95	12.72	12.53	45.09	0.00	/	7.76	1.42	1.73	110.07	33.41	17.01	83.23	7.58	26.00	40.83	70.69	49.59	0.00	24.90	3.35	6.30	6.81	11.35	47.86	22.52	46.48	
H13	655.81	1.19	3.47	198.17	3.70	47.87	9.38	9.88	17.07	11.95	13.88	48.58	0.00	/	11.05	8.42	0.82	100.15	24.56	12.42	69.92	5.84	24.23	29.83	82.58	51.38	0.00	23.89	2.82	6.16	5.07	6.84	50.31	21.71	51.73	
H14	593.94	1.14	2.66	164.51	8.94	35.40	7.76	8.14	12.43	5.28	6.98	38.64	0.00	/	11.93	9.20	0.78	95.52	28.44	13.19	60.48	6.30	22.63	27.29	81.80	52.20	0.00	16.56	1.92	3.71	3.45	13.14	59.61	16.15	49.05	
H15	577.21	0.75	0.00	186.83	14.11	35.01	7.99	12.39	9.29	5.86	11.58	45.63	0.00	/	9.81	9.08	0.75	68.65	22.64	7.85	65.31	9.19	24.42	28.66	78.63	44.23	0.00	16.98	3.31	6.23	3.01	13.13	55.33	11.66	46.31	
H16	537.05	0.73	0.00	177.46	12.75	27.88	7.27	10.43	10.02	14.14	8.96	47.84	0.00	/	7.47	6.68	1.46	60.09	25.27	4.01	62.74	8.27	21.52	31.17	79.54	53.37	0.00	19.68	3.60	6.46	4.29	13.75	49.03	16.23	22.02	
H17	579.46	1.68	0.00	205.41	10.04	28.70	9.03	14.51	8.52	16.69	12.57	57.45	0.00	/	4.15	4.46	0.71	61.44	14.90	3.43	67.96	7.61	22.07	32.53	87.65	60.01	0.00	24.60	3.54	7.65	11.43	11.49	35.94	18.22	23.54	
H18	576.42	0.92	0.00	178.84	8.81	20.79	5.28	12.33	19.83	15.28	9.56	50.32	0.00	/	7.61	7.10	0.69	67.89	20.40	3.32	73.17	14.74	19.66	33.05	91.43	69.39	0.00	24.79	1.02	5.27	15.95	10.44	23.77	13.92	20.09	
H19	610.63	/	0.00	184.18	9.47	24.86	5.54	13.19	20.34	12.60	18.05	42.59	0.00	/	/	5.23	0.00	85.54	26.96	5.16	85.99	19.86	29.31	29.34	/	69.45	/	/	/	/	6.69	15.74	10.71	22.36	5.38	30.01
H20	597.79	/	0.00	168.00	8.93	23.08	5.55	11.61	17.22	10.07	23.19	33.43	0.00	/	/	6.69	0.00	90.45	27.44	5.29	67.75	17.44	23.18	25.31	/	66.41	/	/	/	/	15.85	13.24	10.35	35.44	5.43	22.62

志賀町（女）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	悪性新生物										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）			脳血管疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮			前立腺	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患		くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故							
H11	308.52	1.20	1.21	85.66	3.54	16.32	8.18	1.27	0.93	13.69	10.47	4.90	5.03	2.89	2.03	2.13	53.53	19.25	6.75	30.59	4.43	7.14	16.61	45.33	35.69	0.00	7.78	0.00	2.13	5.12	11.69	17.49	8.32	6.86
H12	295.83	0.00	0.37	84.25	2.45	16.79	9.07	5.05	2.77	10.02	7.77	6.89	3.68	4.60	3.99	0.75	40.79	12.77	5.05	32.68	6.17	6.24	17.84	38.05	29.11	0.00	7.84	0.00	0.75	6.18	9.84	22.59	8.70	6.87
H13	288.98	0.00	0.35	81.19	0.00	16.23	8.62	6.37	3.77	4.09	7.00	12.91	3.27	3.75	3.13	1.44	30.81	8.93	4.62	40.68	10.87	9.53	19.07	39.33	30.79	0.00	8.87	0.00	0.70	4.98	7.48	20.10	5.80	9.72
H14	279.32	0.00	0.65	78.15	0.00	11.34	8.14	5.98	4.60	3.50	6.37	13.26	3.93	4.48	2.71	1.37	27.62	5.92	3.12	39.79	10.11	9.48	20.20	37.44	27.99	0.00	10.83	0.33	1.88	5.85	7.98	16.03	1.87	14.14
H15	274.60	0.00	0.62	68.48	0.00	9.18	4.68	2.84	3.20	6.33	6.82	13.39	5.10	1.39	0.69	1.00	31.53	9.37	2.38	35.84	12.77	6.61	16.47	40.52	29.97	0.00	10.57	0.31	2.96	8.56	8.80	5.78	2.66	21.63
H16	277.57	0.00	0.59	77.96	2.07	11.56	2.60	2.85	4.22	7.48	5.58	8.04	10.07	1.39	0.97	0.29	37.63	9.57	2.31	32.08	8.28	2.98	20.81	36.75	27.78	0.00	14.07	0.29	3.54	7.11	9.48	7.00	2.65	15.39
H17	276.68	0.00	0.00	84.53	2.18	14.90	4.24	4.83	5.44	5.68	4.47	6.08	7.53	0.52	4.17	1.54	34.26	6.68	1.91	27.58	7.26	4.10	16.22	39.67	29.88	0.00	13.28	0.28	2.50	6.80	7.90	8.84	3.40	13.96
H18	299.02	0.00	0.00	93.32	2.54	16.46	5.41	6.72	4.89	4.89	5.40	5.15	9.73	2.79	5.37	1.51	37.09	4.35	4.38	29.90	5.57	6.86	17.47	48.10	29.93	0.00	13.72	0.26	1.03	5.29	10.23	21.35	3.33	7.70
H19	301.54	/	0.00	83.01	0.52	11.86	5.57	5.66	4.43	4.01	8.68	8.47	4.78	2.88	8.04	1.76	36.15	5.94	4.57	27.02	5.84	7.84	13.34	/	31.51	/	/	/	0.52	8.81	9.66	36.82	3.27	5.02
H20	302.24	/	0.00	81.11	0.50	7.83	8.98	3.64	2.20	6.49	7.44	9.74	9.54	3.00	5.05	0.50	44.84	7.91	5.05	28.24	8.31	8.33	11.60	/	26.45	/	/	/	0.97	7.91	10.91	33.43	2.38	9.59

3) 年齢調整死亡率 (3年移動平均)

資料：衛生統計年報 (人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

宝達志水町 (総数) 注) 値は旧志雄町、旧押水町を合計した値を計上した

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	悪性新生物										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺			
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮						前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故									
H11	481.76	0.56	0.56	142.32	4.28	21.33	8.25	3.06	24.61	12.67	10.17	18.90	5.98	0.00	0.78	5.21	1.11	64.41	21.48	4.74	60.65	9.66	6.32	43.89	59.21	46.17	0.56	23.35	3.44	12.05	9.77	8.02	30.48	14.32	20.00	
H12	475.15	0.00	0.52	148.20	4.84	21.50	6.81	0.00	24.73	14.10	10.00	28.68	6.47	0.00	0.75	4.72	0.52	63.31	24.28	5.08	62.11	15.17	8.72	38.22	57.88	41.87	0.00	14.40	2.44	5.38	9.93	7.58	25.91	9.07	24.53	
H13	447.28	0.47	2.44	147.19	3.25	28.26	6.79	3.78	22.43	9.93	12.09	27.05	4.10	1.71	0.00	4.11	2.14	60.82	21.69	3.92	51.17	12.68	8.03	30.45	45.88	33.23	0.00	11.42	1.01	5.26	7.21	4.76	28.25	16.78	33.07	
H14	429.33	0.43	1.96	142.58	3.59	25.39	5.21	4.21	25.85	8.15	10.77	27.08	4.72	1.60	0.00	10.06	1.56	46.10	16.46	3.40	51.21	12.77	14.48	23.97	43.45	32.34	0.00	18.82	0.43	11.99	8.66	3.99	31.00	16.98	34.49	
H15	448.92	0.82	3.22	139.96	4.09	24.94	8.05	6.82	17.40	7.57	12.63	28.31	2.94	2.76	0.66	9.51	2.14	40.80	12.80	2.31	49.70	5.33	16.10	28.26	43.11	29.63	0.00	21.73	1.68	13.81	9.19	5.25	45.50	17.49	35.83	
H16	425.43	1.38	1.29	140.01	5.04	25.57	10.50	2.97	18.16	8.98	10.32	34.87	1.31	2.56	2.01	11.30	1.02	42.64	9.21	4.63	48.32	4.13	20.75	23.45	35.45	24.42	0.00	20.46	1.68	12.80	8.34	4.70	40.66	8.77	30.41	
H17	451.56	1.37	1.30	149.31	3.92	24.59	15.13	5.30	19.23	5.62	10.62	30.86	1.24	2.52	2.96	4.89	0.97	57.34	11.58	8.98	56.12	13.82	13.76	26.42	44.93	26.58	0.00	20.18	1.30	11.27	6.31	4.20	39.51	6.76	23.28	
H18	408.92	1.03	0.00	142.38	4.07	19.92	13.50	4.66	23.57	2.92	6.37	27.22	2.48	5.35	2.30	6.08	0.94	56.18	12.11	10.72	55.10	18.17	12.68	21.82	42.93	28.99	0.00	21.52	0.34	9.40	6.85	4.04	19.68	4.87	16.75	
H19	426.54	/	0.00	130.33	4.29	14.82	10.31	5.06	22.56	3.28	9.65	20.40	4.75	4.26	/	1.91	0.92	63.01	17.24	10.21	63.21	23.02	13.58	24.21	/	31.98	/	/	/	/	12.75	6.32	5.18	15.44	1.69	22.54
H20	423.45	/	0.00	123.68	2.40	17.53	7.92	5.37	16.93	5.45	10.13	21.45	4.53	4.26	/	4.21	1.53	58.95	16.79	11.53	63.37	18.98	16.82	26.21	/	25.37	/	/	/	/	8.54	5.29	8.77	19.61	4.33	25.43

宝達志水町（男）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系疾患									糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）			脳血管疾患	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺					
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び胆内	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房			子宮	前立腺	急性心筋梗塞		その他の虚血性心疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎				急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍		交通事故				
H11	708.71	0.00	0.00	208.13	9.27	46.82	8.48	3.28	36.45	16.41	13.69	37.76	0.00	/	2.13	4.81	2.04	81.66	28.96	2.04	98.21	13.16	8.03	77.01	100.74	80.63	0.00	32.65	0.00	15.59	6.49	8.45	56.04	28.06	25.36
H12	694.39	0.00	0.00	201.77	9.21	44.64	8.47	0.00	36.52	11.85	9.97	51.18	0.00	/	2.10	4.95	0.00	98.83	36.52	4.10	94.58	14.71	11.36	68.50	108.47	77.18	0.00	19.58	0.00	4.69	10.30	9.77	27.35	10.07	39.13
H13	622.87	1.72	2.05	193.45	5.93	43.98	8.03	5.66	33.39	9.10	14.93	49.63	0.00	/	0.00	4.89	3.43	92.62	29.25	2.16	66.99	10.44	9.24	47.31	89.33	65.20	0.00	17.75	0.00	6.68	9.79	6.86	32.81	22.65	45.49
H14	572.76	1.58	1.95	181.02	2.94	34.07	4.52	5.60	44.37	4.05	16.53	46.53	0.00	/	0.00	9.64	3.16	71.30	24.69	3.69	62.93	8.71	20.07	34.14	84.85	65.75	0.00	26.97	1.58	16.27	9.63	8.28	31.87	20.91	45.14
H15	603.64	2.94	4.66	185.26	5.33	35.68	4.46	7.60	27.57	1.87	20.95	57.41	0.00	/	1.87	6.72	2.94	58.00	19.75	5.04	68.80	4.80	20.51	43.48	78.62	57.89	0.00	29.46	4.26	17.17	7.80	6.67	66.96	30.27	47.73
H16	588.55	3.68	2.79	190.70	7.84	39.43	8.68	2.12	29.00	0.00	16.12	62.22	0.00	/	5.45	9.43	0.00	61.38	13.54	9.31	68.15	2.76	33.58	31.82	68.94	52.69	0.00	25.84	4.17	17.24	6.20	6.30	58.35	14.66	48.88
H17	636.45	3.59	2.76	208.29	10.11	39.03	16.88	2.17	29.31	0.00	18.65	54.88	0.00	/	8.32	4.94	0.00	82.64	17.71	15.19	71.80	13.28	20.96	35.38	78.49	50.03	0.00	33.85	2.76	18.73	3.90	5.57	51.62	11.84	40.97
H18	566.50	2.29	0.00	197.41	10.09	30.57	20.37	4.46	35.78	2.17	11.18	43.78	0.00	/	6.41	4.89	0.00	74.26	17.87	14.97	72.84	16.72	21.49	31.25	76.21	53.08	0.00	34.16	0.00	17.74	6.46	4.83	21.34	1.21	24.20
H19	594.32	/	0.00	191.30	10.23	27.60	17.99	4.40	33.08	4.40	11.53	42.91	0.00	/	0.00	0.00	75.51	21.69	12.59	87.44	23.88	22.23	38.08	/	52.69	/	/	/	23.03	6.69	6.87	18.96	1.15	29.83	
H20	612.48	/	0.00	181.16	5.74	33.83	8.38	10.35	23.90	4.30	7.76	45.20	0.00	/	4.36	1.12	74.50	22.46	14.71	87.42	13.34	28.05	42.59	/	47.10	/	/	14.87	7.49	8.97	41.96	9.16	32.85		

宝達志水町（女）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	悪性新生物										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）			脳血管疾患	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺			
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮			前立腺	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患		くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎				胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故				
H11	321.67	0.76	0.76	95.72	0.00	6.22	7.08	2.87	15.27	10.89	7.04	5.25	10.71	0.00	5.83	0.76	53.77	16.80	6.74	35.68	5.23	4.69	24.54	32.93	24.17	0.76	18.79	6.37	10.13	11.43	7.80	8.84	1.78	14.59
H12	326.24	0.00	0.72	110.44	0.72	8.12	4.91	0.00	15.42	15.25	10.19	12.68	11.86	0.00	4.84	0.72	37.65	15.75	5.79	42.11	14.92	6.65	20.54	25.13	17.17	0.00	13.09	4.65	6.29	10.03	6.64	26.18	8.99	9.59
H13	322.31	0.00	2.95	115.61	0.66	17.84	5.49	2.29	13.91	10.62	9.66	11.47	7.70	3.33	3.59	1.77	34.93	15.55	4.90	39.82	14.96	6.60	18.25	17.74	11.65	0.00	7.19	1.70	4.18	5.50	4.19	23.54	10.89	20.24
H14	329.12	0.00	2.32	117.15	3.36	17.77	5.58	2.92	11.22	10.77	6.47	15.64	9.39	3.24	10.97	1.07	24.35	8.04	3.36	43.48	17.64	8.84	17.00	17.44	11.08	0.00	13.03	0.00	8.94	8.07	2.27	27.96	12.49	23.69
H15	332.31	0.00	2.35	108.93	2.75	15.68	10.67	5.76	10.19	11.46	4.82	9.01	5.83	5.01	12.01	2.06	27.99	6.57	1.03	37.40	6.83	12.15	18.41	19.61	11.90	0.00	14.62	0.00	10.65	9.74	4.42	23.42	3.79	23.66
H16	304.48	0.00	0.00	107.18	2.74	15.95	12.47	3.34	9.78	15.21	4.69	17.46	2.71	4.39	12.37	1.52	29.51	5.90	1.89	33.96	6.22	9.98	17.76	14.51	7.78	0.00	15.47	0.00	8.86	9.29	3.70	24.97	2.72	12.12
H17	322.93	0.00	0.00	115.90	0.00	16.60	13.79	8.14	11.78	9.59	3.22	16.22	2.53	4.35	4.22	1.45	38.17	8.00	3.82	45.78	14.48	8.45	20.38	23.99	11.22	0.00	8.39	0.00	3.64	7.42	3.50	30.15	1.81	5.94
H18	306.88	0.00	0.00	113.15	0.00	14.26	8.55	5.57	13.82	3.76	2.33	18.91	4.99	10.20	6.21	1.40	39.95	8.18	6.43	43.79	19.44	4.80	17.08	24.73	14.49	0.00	11.22	0.47	1.30	5.86	3.74	20.71	8.41	9.15
H19	316.38	/	0.00	93.34	0.00	6.29	4.15	6.19	14.49	2.18	7.88	7.45	9.15	8.20	3.01	1.36	51.15	14.35	6.77	45.91	21.19	5.99	16.29	/	18.04	/	/	/	2.56	4.89	4.51	15.22	2.34	15.11
H20	304.02	/	0.00	86.62	0.00	8.73	5.98	0.87	12.65	5.65	9.58	6.54	8.31	8.67	3.48	1.76	41.82	11.36	7.14	48.86	20.40	7.25	18.77	/	12.99	/	/	/	2.61	3.04	8.68	7.44	0.43	22.06

3) 年齢調整死亡率 (3年移動平均)

資料：衛生統計年報（人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口）

中能登町（総数） 注）値は旧鳥屋町、旧鹿島町、旧鹿西町を合計した値を計上した

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	がん										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮						前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故								
H11	479.85	0.48	1.21	146.50	3.08	30.66	10.38	3.51	16.75	10.78	15.26	27.15	3.01	0.00	3.87	11.77	3.64	66.35	17.64	9.63	84.40	13.37	16.58	50.82	48.53	29.30	0.61	9.64	1.58	2.72	5.04	4.36	40.26	22.53	10.97
H12	449.42	0.45	1.16	141.71	3.24	26.58	11.56		15.74	10.30	14.91	26.15	4.26	0.00	2.65	8.17	3.56	60.77	15.58	8.19	64.71	5.15	12.51	43.79	49.30	31.02	0.58	15.25	1.04	7.31	3.26	4.54	44.74	19.68	14.88
H13	426.34	0.00	1.68	142.69	4.33	24.03	11.19	5.59	17.76	8.22	11.47	33.21	3.24	1.16	2.56	10.90	4.00	59.41	20.51	7.36	59.39	5.35	7.97	42.89	44.38	29.68	0.56	14.98	1.14	8.81	5.19	4.70	38.69	8.43	12.85
H14	424.12	0.00	1.65	140.58	7.10	26.73	10.30	6.99	18.59	9.23	6.95	22.48	6.46	3.61	0.80	13.24	4.35	57.60	20.52	6.56	57.28	6.61	8.47	38.72	41.76	26.89	0.00	16.61	1.08	9.88	7.67	3.60	41.00	8.37	13.80
H15	429.35	0.54	1.07	138.15	5.46	27.86	10.60	8.96	14.39	8.33	6.86	24.25	7.14	3.59	1.16	20.39	4.15	77.70	24.54	8.89	53.02	7.90	9.47	32.99	44.82	27.37	0.00	13.11	1.03	7.33	6.70	3.74	24.47	3.62	9.47
H16	420.60	0.53	0.53	138.69	4.28	34.37	9.69	7.26	9.08	9.50	7.02	19.85	9.35	3.61	2.11	19.29	4.49	78.66	20.86	10.67	36.95	4.47	10.07	21.70	44.57	25.82	0.00	14.42	0.35	3.99	5.53	3.79	25.91	7.53	12.73
H17	399.15	0.51	0.00	124.16	2.78	32.66	5.90	7.60	9.29	8.00	9.95	18.78	5.21	1.09	2.31	18.50	3.41	80.53	21.33	10.45	32.65	3.19	11.58	17.23	42.94	22.72	0.00	14.94	0.00	4.31	4.10	5.62	21.06	9.95	12.21
H18	398.82	1.33	0.49	131.03	3.00	33.32	10.65	6.75	7.60	6.65	9.13	22.08	3.65	1.67	2.64	11.39	4.43	65.36	16.82	9.47	38.68	4.02	14.51	19.56	39.53	22.47	0.00	15.25	0.00	4.22	4.21	6.04	29.39	10.94	14.28
H19	385.71	/	0.94	122.29	2.85	24.48	11.28	8.36	7.70	7.62	10.78	19.80	3.19	0.84	/	7.19	3.05	67.27	16.13	6.52	42.10	7.33	15.02	19.19	/	21.17	/	/	/	6.59	5.46	5.96	23.29	7.78	13.99
H20	384.65	/	0.89	133.30	2.36	19.08	16.01	7.62	8.62	7.67	9.37	24.12	6.28	2.84	/	4.61	3.12	62.98	13.19	7.03	48.39	8.38	17.28	22.46	/	23.52	/	/	/	6.32	4.78	4.98	24.24	7.40	10.11

中能登町（男）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	内臓疾患										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮						前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故								
H11	674.55	1.59	3.05	215.74	6.61	44.05	18.55	3.18	19.08	16.91	12.04	53.72	0.00	/	9.29	15.69	3.05	87.85	24.15	16.81	119.62	23.21	23.63	68.09	83.87	51.37	0.00	13.20	1.59	4.80	6.39	1.59	57.53	36.87	12.59
H12	605.97	1.51	2.88	205.83	6.85	41.72	18.73	5.64	26.18	12.60	13.59	48.74	0.00	/	6.22	11.87	4.39	70.74	20.54	11.53	83.89	8.31	14.46	57.84	84.51	54.85	0.00	21.69	0.00	13.58	5.03	3.01	52.33	29.61	19.59
H13	613.57	0.00	4.18	217.71	8.55	40.39	16.29	7.17	32.92	6.62	10.87	61.60	0.00	/	6.97	15.04	2.84	72.07	22.82	10.74	84.09	6.86	11.03	59.20	83.05	54.46	0.00	22.61	1.74	15.92	11.45	4.34	44.98	10.19	21.13
H14	614.36	0.00	4.25	205.03	14.71	45.43	12.16	10.04	35.30	6.11	9.13	42.00	0.00	/	2.65	18.36	3.36	78.63	24.40	11.76	78.47	6.89	10.57	54.28	73.08	47.88	0.00	25.60	2.99	18.29	16.01	2.65	55.37	14.97	26.21
H15	641.75	1.44	2.88	197.39	9.99	45.96	14.14	11.51	26.01	6.27	6.31	47.41	0.00	/	3.86	32.45	3.32	119.62	36.41	18.11	73.57	8.68	10.64	49.35	77.02	49.06	0.00	17.70	2.87	11.96	12.36	4.16	40.84	7.12	17.63
H16	626.03	1.44	1.44	198.62	8.61	59.93	13.65	12.00	16.01	7.08	7.82	38.92	0.00	/	6.39	32.51	5.83	128.26	34.99	21.35	44.18	3.44	9.42	31.33	71.64	42.89	0.00	19.28	1.17	6.32	6.73	3.85	37.25	14.81	22.00
H17	583.55	1.39	0.00	175.64	5.16	56.05	8.35	9.27	14.54	8.51	7.97	35.44	0.00	/	7.09	33.77	3.54	120.47	32.13	18.94	40.77	3.52	12.63	24.63	69.23	34.54	0.00	21.03	0.00	5.90	4.32	4.98	33.75	17.47	23.06
H18	554.84	1.40	0.00	187.90	6.85	57.99	12.36	8.41	9.65	8.22	6.36	42.02	0.00	/	7.92	21.19	6.60	86.02	21.60	11.83	47.47	0.00	20.67	26.79	61.90	31.92	0.00	21.86	0.00	4.41	5.28	4.30	44.83	17.45	16.62
H19	517.44	/	0.00	157.59	6.55	33.05	11.08	9.53	10.83	7.06	8.60	36.73	0.00	/	/	13.75	4.35	88.15	16.89	6.40	50.71	2.19	20.62	26.94	/	30.99	/	/	/	9.21	6.80	3.17	38.84	11.21	16.54
H20	521.66	/	0.00	164.68	5.68	21.87	13.11	10.97	8.02	4.51	8.57	48.55	0.00	/	/	6.82	4.38	82.95	12.24	7.04	63.00	1.98	21.30	38.80	/	37.94	/	/	/	10.48	5.54	2.76	42.16	12.20	12.46

中能登町（女）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	がん										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺	
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮						前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故							
H11	337.84	0.00	0.00	96.33	0.00	20.24	4.10	4.55	14.86	6.57	16.44	10.12	5.55	0.00	8.72	3.49	53.32	13.85	4.04	56.01	4.24	10.19	37.72	26.54	15.67	1.01	7.12	1.70	0.70	3.64	5.58	22.90	8.86	10.35
H12	336.97	0.00	0.00	95.69	0.00	15.01	5.53	4.49	8.32	9.63	14.57	11.02	7.95	0.00	5.12	2.93	54.12	12.19	5.05	50.44	2.20	10.39	34.02	27.13	16.29	0.98	9.93	1.63	1.88	1.88	5.20	36.64	9.91	10.30
H13	289.11	0.00	0.00	88.54	0.61	11.98	7.03	4.52	5.72	10.13	11.02	13.65	5.82	2.26	7.53	4.66	49.12	18.97	4.23	40.74	3.68	5.38	31.08	20.96	15.62	0.94	7.92	0.61	2.41	0.61	4.85	33.77	6.09	5.47
H14	278.91	0.00	0.00	94.39	0.57	13.46	9.08	5.09	4.55	12.11	5.18	8.48	12.33	7.12	8.70	4.80	39.33	17.15	2.86	40.28	5.77	6.59	26.77	22.88	14.99	0.00	8.96	0.00	2.29	1.72	4.01	29.22	1.15	1.68
H15	271.58	0.00	0.00	97.21	1.41	15.08	7.84	7.82	4.27	10.30	7.20	7.32	13.89	7.07	9.40	4.34	42.26	13.80	2.21	38.38	6.53	9.42	21.32	27.77	16.13	0.00	9.05	0.00	3.05	2.94	3.31	11.33	0.00	1.77
H16	266.05	0.00	0.00	99.40	0.83	15.04	6.52	3.84	2.91	11.97	5.85	5.82	18.62	7.09	7.06	3.36	37.31	7.25	3.36	33.77	5.02	11.58	16.17	28.37	15.27	0.00	9.53	0.00	2.38	4.87	3.54	15.44	0.00	3.99
H17	260.07	0.00	0.00	90.12	0.81	14.44	3.52	6.31	4.71	8.93	11.81	6.16	10.45	2.09	3.99	3.22	48.18	9.97	4.78	29.52	2.81	11.65	14.14	27.34	15.71	0.00	7.79	0.00	3.07	4.49	5.52	9.32	2.00	2.09
H18	277.52	1.32	0.78	90.03	0.00	13.50	8.09	5.36	6.14	5.71	11.71	7.09	7.19	3.08	2.18	2.48	48.97	11.63	8.29	32.15	7.16	8.15	16.01	25.72	16.14	0.00	8.21	0.00	4.04	3.42	6.62	15.22	4.05	12.64
H19	279.98	/	1.51	95.94	0.00	17.23	9.89	8.42	5.45	7.68	13.13	7.83	6.15	1.35	0.79	1.57	49.10	15.17	7.05	35.88	11.11	9.52	14.86	/	14.27	/	/	/	3.97	4.23	7.04	9.82	4.08	12.22
H20	284.58	/	1.44	103.57	0.00	16.40	15.93	7.70	5.99	9.04	9.00	7.17	8.68	4.99	2.22	0.38	48.90	15.05	10.59	38.56	13.33	12.98	12.24	/	13.81	/	/	/	5.58	3.70	5.98	11.21	2.31	12.30

3) 年齢調整死亡率 (3年移動平均)

資料：衛生統計年報 (人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

管内 (総数)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	がん										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	呼吸器系の疾患			急性気管支炎	消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺			
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	くも膜下出血	脳内出血		脳梗塞	肺炎				胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故				
H11	469.44	0.75	1.16	147.34	3.94	29.55	9.80	5.97	13.96	10.23	10.89	26.93	3.72	1.19	2.26	8.15	2.85	58.33	19.91	7.73	66.15	9.43	12.47	38.88	57.33	38.39	0.29	17.43	1.47	8.82	6.71	7.46	28.98	13.17	19.54
H12	450.47	0.65	0.88	143.83	3.50	29.32	11.33	5.34	14.78	8.82	9.66	25.59	3.98	1.23	2.24	7.87	2.54	57.80	18.78	7.79	58.06	7.26	12.17	34.18	53.58	35.69	0.22	15.78	1.06	6.78	6.75	7.20	29.58	10.94	20.44
H13	429.28	0.43	0.94	138.78	3.20	28.62	11.15	4.81	13.80	8.15	9.18	25.58	3.38	1.56	2.35	7.08	2.85	58.68	18.19	7.15	53.29	7.50	11.92	30.74	50.45	32.63	0.16	14.53	1.17	6.15	6.30	6.21	29.58	9.97	20.74
H14	424.44	0.25	1.11	135.70	4.03	27.03	9.94	5.36	12.16	7.40	8.53	24.24	5.08	2.58	2.29	6.56	2.83	56.85	17.55	6.27	54.29	9.23	13.31	29.37	47.37	30.81	0.08	15.37	0.99	6.72	6.79	7.23	31.66	10.97	23.13
H15	424.17	0.27	0.88	133.62	4.61	26.56	8.43	6.73	9.66	7.88	8.81	24.91	5.56	3.06	2.08	6.98	2.72	58.94	18.07	5.71	53.76	10.38	14.06	27.76	48.43	29.46	0.08	15.55	1.43	7.30	5.45	7.77	28.87	8.90	23.28
H16	419.74	0.52	0.70	130.51	4.42	26.69	8.03	5.28	9.03	8.29	8.20	25.41	6.56	2.87	2.29	7.13	2.52	59.54	18.07	5.96	50.20	9.47	14.32	25.36	48.56	31.12	0.12	16.39	1.10	7.45	5.14	7.31	28.17	8.92	23.47
H17	410.36	0.76	0.34	132.45	4.05	26.64	9.05	6.02	10.56	6.98	8.71	24.43	5.49	2.07	1.97	7.86	2.34	60.05	16.05	6.66	46.49	9.40	13.16	22.65	47.99	30.81	0.08	16.48	1.12	7.35	5.67	6.03	24.76	7.43	20.30
H18	405.84	0.96	0.36	130.23	3.76	23.59	9.19	5.86	11.84	6.25	8.55	23.98	4.93	2.12	2.93	7.92	3.04	61.44	16.49	7.13	45.40	9.68	12.46	21.81	46.74	30.63	0.07	15.90	0.98	6.43	6.69	6.19	22.88	7.37	20.40
H19	403.01	/	0.32	130.68	4.02	20.58	8.78	6.54	12.13	6.31	9.75	23.23	5.40	1.90	/	7.20	2.61	61.29	15.80	6.55	44.38	10.13	12.44	20.17	/	27.35	/	/	/	6.23	6.98	7.01	22.45	6.18	21.18
H20	401.99	/	0.37	130.39	3.72	20.58	9.12	6.15	11.30	6.59	10.05	22.40	5.57	2.96	/	5.14	2.19	59.99	14.74	7.00	43.43	10.08	12.39	20.13	/	27.14	/	/	/	6.78	6.49	8.39	21.73	5.99	20.16

管内（男）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系の疾患									糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺			
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房						子宮	前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍				交通事故					
H11	670.53	0.92	1.95	213.16	8.06	47.25	11.97	8.21	21.32	11.86	13.55	49.72	0.00	/	5.87	10.85	4.48	80.93	29.86	10.57	93.24	11.14	18.42	57.44	92.64	59.84	0.24	26.09	1.59	13.85	9.05	4.95	43.08	20.37	30.65
H12	641.61	1.32	1.54	208.97	6.88	46.91	14.81	6.90	24.28	9.33	11.94	46.35	0.00	/	5.98	10.58	3.92	83.65	28.60	10.93	76.10	7.46	16.86	46.50	89.72	58.35	0.23	23.37	1.24	10.91	7.84	5.47	41.24	15.43	31.76
H13	610.09	0.80	1.50	200.50	5.77	43.39	13.83	6.89	22.28	9.05	11.96	46.34	0.00	/	6.23	9.74	3.81	83.91	26.09	9.89	67.13	6.43	15.46	40.12	87.77	54.39	0.22	20.63	2.26	9.07	8.12	4.72	43.46	14.93	31.68
H14	585.45	0.53	1.52	190.07	7.22	42.54	11.35	7.45	20.42	7.42	11.80	42.40	0.00	/	6.18	9.07	3.37	81.63	25.11	10.35	67.60	7.17	18.34	37.88	79.88	52.48	0.21	19.56	1.97	9.25	8.58	7.46	44.66	14.09	33.55
H15	584.01	0.65	1.07	184.52	8.47	42.58	10.22	9.64	14.57	8.49	11.71	43.71	0.00	/	5.59	10.76	3.24	81.26	25.38	10.23	70.01	8.55	20.69	37.90	79.79	48.61	0.20	20.08	2.98	10.41	6.40	8.19	45.19	12.95	32.52
H16	588.41	1.21	0.86	186.68	8.58	44.86	10.40	7.46	13.41	9.37	11.95	46.07	0.70	/	6.32	10.63	3.54	81.42	24.76	11.14	65.16	7.68	22.51	33.65	79.26	52.05	0.20	23.27	2.03	12.21	6.08	8.04	42.59	12.40	31.29
H17	588.15	1.56	0.66	190.34	7.97	43.52	11.91	8.90	15.63	8.94	11.72	43.86	0.69	/	5.59	10.56	2.73	82.20	20.99	11.40	61.25	7.83	19.54	31.97	80.70	51.02	0.14	26.72	2.02	12.83	7.27	6.30	39.02	11.81	29.17
H18	573.63	1.28	0.36	189.94	7.47	37.70	11.93	8.83	18.79	9.03	10.51	45.24	0.67	/	7.87	9.53	4.23	83.07	22.88	10.32	59.56	8.16	18.38	30.97	76.58	49.41	0.13	23.93	1.47	10.06	9.34	5.30	34.81	10.90	28.80
H19	563.39	/	0.19	185.81	8.27	32.85	11.38	9.33	19.15	8.32	10.93	44.36	0.00	/	/	8.57	3.12	83.37	22.11	8.51	60.55	8.39	19.15	30.21	/	45.01	/	/	/	9.86	9.45	5.36	32.48	8.42	32.52
H20	561.55	/	0.16	182.93	8.16	30.62	10.02	9.33	17.08	8.41	11.78	43.73	0.00	/	/	7.33	3.11	82.05	21.63	9.66	57.68	7.98	18.72	29.50	/	45.29	/	/	/	10.78	9.58	6.33	32.75	8.50	30.70

管内（女）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系の疾患										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）			脳血管疾患			呼吸器系の疾患			肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺					
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮			前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故												
H11	321.43	0.62	0.76	100.07	0.62	16.37	8.10	4.16	8.12	9.31	8.66	11.41	6.84	1.95	/	5.86	1.72	42.50	13.18	5.64	47.22	7.37	8.23	26.80	35.86	25.70	0.28	10.39	1.53	4.44	5.11	8.41	16.27	6.57	8.78	
H12	311.64	0.24	0.44	98.04	0.62	16.57	8.65	4.35	7.33	8.53	7.80	11.52	7.46	2.09	/	5.51	1.61	39.46	11.64	5.86	45.50	6.71	8.92	25.94	31.40	21.68	0.20	10.14	1.12	3.25	5.70	7.87	19.59	7.09	9.26	
H13	295.85	0.23	0.57	94.67	0.92	17.74	9.01	3.47	7.31	7.47	6.65	11.02	6.37	2.87	/	4.96	2.26	39.54	12.18	5.51	43.36	8.24	9.15	24.24	27.38	19.39	0.12	9.86	0.55	3.64	4.80	6.84	17.40	5.22	9.90	
H14	306.80	0.11	0.85	97.23	1.24	15.45	9.03	4.01	5.71	7.36	5.79	11.07	9.75	4.80	/	4.91	2.48	37.01	11.08	3.76	44.45	10.59	9.40	23.43	27.65	17.72	0.00	12.17	0.41	4.51	5.27	7.09	20.95	8.01	12.91	
H15	306.80	0.11	0.79	97.91	1.35	14.81	7.17	4.74	5.84	7.65	6.09	11.24	10.72	5.79	/	4.23	2.28	40.06	11.57	2.56	41.77	11.44	8.83	20.95	29.86	18.14	0.00	11.90	0.40	4.53	4.64	7.43	15.28	4.96	14.55	
H16	295.74	0.06	0.59	91.85	1.04	13.84	6.51	3.91	5.38	7.54	4.94	10.21	11.94	5.40	/	4.28	1.76	41.64	12.14	2.38	38.65	10.43	7.85	19.65	30.25	18.42	0.06	10.76	0.45	3.25	4.32	6.87	16.63	5.62	16.09	
H17	279.66	0.24	0.10	92.49	1.01	14.42	6.99	4.11	6.27	5.78	6.26	10.31	9.87	3.90	/	5.11	2.05	42.39	11.75	3.32	35.65	10.45	7.95	16.63	28.24	18.32	0.05	8.15	0.39	2.52	4.31	5.77	13.45	3.40	11.95	
H18	281.90	0.69	0.34	88.10	0.83	13.21	7.15	3.47	5.99	4.13	7.08	8.78	8.78	4.03	/	6.01	2.03	44.51	11.56	4.98	34.86	10.79	7.24	16.01	28.96	18.90	0.05	9.11	0.49	3.17	4.52	6.58	13.80	4.35	12.44	
H19	284.30	/	0.37	91.44	0.56	11.41	6.67	4.14	6.09	4.71	9.03	8.60	10.42	3.55	/	5.52	1.96	43.82	10.98	5.05	32.29	11.26	6.56	13.81	/	16.17	/	/	/	/	2.98	5.00	7.71	14.82	4.28	10.38
H20	281.70	/	0.49	89.95	0.46	11.13	8.01	3.44	5.46	5.47	7.98	7.82	10.81	5.00	/	3.01	1.06	43.49	9.54	5.28	31.67	10.01	6.89	14.08	/	16.13	/	/	/	/	3.30	4.29	9.30	13.30	2.92	10.40

3) 年齢調整死亡率 (3年移動平均)

資料：衛生統計年報 (人口10万対：直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

石川県 (総数)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	悪性新生物										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)				脳血管疾患	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺			
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮			前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞		肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故										
H11	454.62	0.47	1.09	149.11	3.92	27.68	11.53	6.07	15.45	7.98	10.68	26.75	5.80	2.50	3.00	5.98	2.67	64.24	19.53	9.05	59.91	8.11	12.17	37.25	57.05	38.02	0.37	15.78	1.48	7.18	5.28	6.69	24.75	9.15	19.29
H12	441.18	0.58	0.99	146.48	3.72	27.06	11.43	6.39	15.55	7.48	10.83	25.67	6.04	2.42	2.79	5.75	2.18	63.41	19.35	8.37	54.97	7.25	11.15	34.30	54.73	36.94	0.25	15.46	1.36	6.99	5.26	6.54	24.52	8.84	19.17
H13	423.05	0.63	1.09	143.88	3.56	25.85	11.65	6.69	14.97	7.64	10.10	25.89	5.41	2.31	2.68	5.56	1.78	61.11	18.87	7.78	50.62	6.62	10.92	31.19	50.47	33.00	0.21	15.19	1.50	6.55	4.92	5.89	23.62	8.49	19.46
H14	419.50	0.63	0.95	141.30	4.08	24.77	11.80	6.62	14.11	7.47	9.67	25.91	5.47	2.60	2.38	5.55	1.85	59.92	18.34	7.32	49.03	6.61	11.31	29.35	48.54	30.94	0.24	15.99	1.49	6.89	5.14	5.92	23.79	8.68	21.15
H15	412.22	0.46	0.74	140.13	4.37	23.56	11.42	6.69	13.36	7.72	9.87	26.01	5.74	2.73	2.42	5.38	1.74	59.13	17.67	7.11	46.83	6.55	11.71	27.08	47.99	29.94	0.23	15.76	1.41	6.80	4.78	5.79	22.49	7.63	20.75
H16	409.34	0.45	0.56	137.56	4.75	23.65	10.88	5.70	12.63	6.97	9.90	25.92	5.99	2.80	2.46	5.25	1.73	60.90	18.05	7.09	44.67	6.68	11.46	25.13	48.78	30.93	0.26	15.52	1.09	6.97	4.82	5.47	21.56	7.16	20.87
H17	396.55	0.45	0.48	136.07	4.36	23.58	10.35	5.79	12.81	6.68	10.12	26.07	5.95	2.23	2.46	5.24	1.64	59.44	17.43	7.12	41.91	6.62	10.68	23.40	47.63	30.82	0.19	14.61	0.87	6.64	5.06	5.30	19.75	6.01	19.68
H18	391.31	0.57	0.44	133.56	4.28	21.94	10.34	5.60	12.63	6.44	9.80	26.45	5.49	2.17	2.60	5.25	1.73	59.07	17.08	6.88	41.08	7.06	10.52	22.25	46.84	30.41	0.15	14.86	0.74	6.49	5.18	5.28	18.96	5.61	19.71
H19	382.66	/	0.32	132.19	3.93	20.59	10.10	5.61	12.49	6.53	10.24	26.26	5.54	2.20	/	5.18	1.53	56.15	15.67	6.92	39.73	6.71	10.27	21.35	/	29.14	/	/	/	5.73	5.37	5.63	18.22	4.73	18.67
H20	380.79	/	0.40	130.75	3.97	19.51	10.07	5.13	11.87	6.45	10.43	26.10	5.58	2.50	/	5.07	1.30	54.86	14.81	7.00	38.91	6.81	10.71	20.05	/	28.60	/	/	/	5.73	5.34	6.44	17.50	4.45	19.13

石川県（男）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系疾患									糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）			脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺				
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房			子宮	前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故												
H11	637.59	0.55	1.88	213.10	7.22	43.75	14.81	8.44	23.52	8.96	14.02	48.32	0.08	/	7.99	7.99	3.01	86.44	28.33	12.48	80.37	7.77	17.06	52.58	92.70	60.04	0.36	21.63	2.07	10.82	6.62	5.71	37.13	13.38	28.74	
H12	624.64	0.78	1.55	212.21	6.70	43.25	15.03	8.81	24.15	8.40	14.43	47.41	0.14	/	7.38	7.88	2.53	85.95	28.26	12.00	74.68	6.82	15.50	49.56	89.49	58.99	0.34	20.76	1.83	10.10	6.58	6.12	36.93	12.85	29.31	
H13	597.47	0.75	1.73	206.85	6.65	40.59	15.31	9.53	22.97	8.95	12.99	47.27	0.16	/	7.10	7.85	2.12	83.02	27.51	10.66	68.09	6.14	14.96	44.22	83.22	53.19	0.31	19.82	2.02	9.48	6.09	5.22	36.26	12.92	30.46	
H14	590.89	0.68	1.55	202.69	7.66	38.92	15.14	10.22	22.00	8.30	12.58	47.42	0.16	/	6.42	7.70	2.05	81.49	26.69	10.12	65.32	5.92	15.66	41.03	80.54	50.68	0.27	20.83	2.27	9.71	6.28	5.56	35.48	12.85	32.70	
H15	580.42	0.53	1.28	199.26	8.08	37.53	14.12	10.62	20.72	8.61	13.10	46.55	0.06	/	6.50	7.68	1.75	79.39	25.20	10.05	62.49	5.56	16.59	38.07	80.20	48.94	0.23	20.67	2.20	9.55	5.87	4.98	34.35	11.42	31.90	
H16	576.80	0.63	1.07	195.78	8.79	37.41	13.01	8.93	19.72	7.74	13.47	46.73	0.10	/	6.50	7.00	1.77	81.54	25.25	10.33	59.06	5.21	16.79	35.24	81.20	50.61	0.25	20.80	1.72	9.96	6.44	4.98	32.27	10.29	32.03	
H17	559.82	0.64	0.93	192.48	8.19	37.15	11.86	8.52	19.21	8.07	13.51	46.05	0.07	/	6.39	7.06	1.74	80.16	24.89	10.31	55.82	5.32	15.96	32.85	78.86	49.79	0.24	20.32	1.28	9.95	7.02	4.45	29.94	8.47	30.30	
H18	548.79	0.74	0.80	189.19	8.15	34.27	11.71	8.29	18.68	8.11	12.65	47.18	0.07	/	6.69	6.53	2.12	79.72	24.62	9.68	54.35	6.45	15.53	30.56	76.67	48.59	0.20	20.36	1.08	9.45	7.36	4.16	27.83	7.72	30.60	
H19	537.98	/	0.46	187.10	7.40	32.24	11.98	8.43	18.49	7.84	13.38	46.60	0.00	/	/	6.38	1.92	76.73	22.96	9.87	53.58	6.53	14.74	30.09	/	47.14	/	/	/	/	8.25	7.44	3.84	26.96	6.51	29.10
H20	536.19	/	0.55	184.86	7.57	30.21	12.14	7.66	18.28	7.50	13.74	46.77	0.03	/	/	6.54	1.63	75.07	21.40	10.17	52.53	6.61	15.31	28.51	/	47.14	/	/	/	/	8.30	7.43	4.23	26.74	6.57	28.66

石川県（女）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患（高血圧性を除く）			脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺	
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮			前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故										
H11	323.94	0.41	0.60	104.05	1.37	15.92	9.05	4.25	8.98	7.46	8.04	11.64	10.90	4.47	4.32	2.40	47.72	12.95	6.54	45.60	8.06	8.26	27.43	36.69	25.79	0.38	10.81	1.03	3.99	4.38	7.04	14.57	5.53	10.41
H12	309.54	0.47	0.62	100.16	1.37	15.39	8.68	4.56	8.58	6.88	8.03	10.46	11.30	4.37	4.06	1.97	46.22	12.54	5.83	41.22	7.25	7.59	24.57	34.62	24.36	0.21	10.92	1.00	4.21	4.36	6.65	14.44	5.39	9.56
H13	296.08	0.60	0.66	99.19	1.10	15.28	8.84	4.49	8.51	6.60	7.82	10.80	10.05	4.21	3.73	1.56	44.05	12.17	5.66	38.50	6.77	7.62	22.85	31.30	21.35	0.15	11.05	1.09	3.94	4.07	6.11	13.14	4.38	9.04
H14	293.75	0.63	0.59	97.50	1.21	14.53	9.27	3.85	7.65	6.71	7.41	10.60	10.24	4.73	3.90	1.70	42.95	11.74	5.29	37.50	6.82	7.71	21.86	29.70	19.42	0.21	11.68	0.92	4.31	4.30	6.01	14.10	4.73	10.09
H15	288.21	0.41	0.43	98.02	1.35	13.55	9.37	3.64	7.29	7.01	7.43	11.37	10.83	4.99	3.59	1.65	42.86	11.53	4.87	35.79	7.06	7.70	20.09	29.07	18.88	0.21	11.43	0.83	4.34	4.06	6.04	12.57	4.03	10.10
H16	286.49	0.31	0.29	96.25	1.49	13.69	9.35	3.24	6.71	6.43	7.15	11.07	11.27	5.15	3.89	1.63	44.35	12.02	4.70	34.42	7.58	7.21	18.60	29.79	19.52	0.28	10.94	0.60	4.23	3.78	5.63	12.78	4.24	10.22
H17	276.12	0.30	0.22	95.97	1.29	13.71	9.29	3.72	7.41	5.72	7.54	11.73	11.20	4.11	3.72	1.49	42.62	11.33	4.65	31.86	7.48	6.48	17.10	29.27	19.90	0.17	9.74	0.52	3.68	3.82	5.60	11.55	3.70	9.54
H18	274.72	0.44	0.22	93.63	1.14	12.75	9.45	3.52	7.60	5.28	7.64	11.50	10.34	4.00	4.09	1.37	42.32	11.08	4.68	31.38	7.40	6.53	16.67	29.32	20.00	0.15	10.21	0.45	3.82	3.68	5.72	11.94	3.69	9.26
H19	266.71	/	0.21	92.31	1.10	11.96	8.72	3.42	7.49	5.55	7.83	11.47	10.52	4.08	4.05	1.17	39.44	9.99	4.52	29.61	6.71	6.71	15.48	/	18.70	/	/	/	3.50	3.91	6.33	11.31	3.09	8.54
H20	265.94	/	0.28	91.65	1.10	11.17	8.61	3.09	6.57	5.62	7.82	11.28	10.99	4.65	3.52	0.98	39.29	9.89	4.60	28.89	6.70	6.76	14.67	/	17.62	/	/	/	3.73	3.94	7.35	10.53	2.46	9.63

七尾市死亡数（総数）（3年移動平均）

年	死亡総数	脳管感染症	結核	悪性新生物	内臓器										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血			脳内出血	脳梗塞	呼吸器系の疾患	肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	くも膜下出血	くも膜下出血														くも膜下出血
H11	1,999	1	7	570	15	118	40	24	50	29	40	110	10	8	11	44	12	252	78	42	350	33	53	210	299	200	2	73	6	35	31	43	86	33	40		
H12	1,915	1	3	569	12	126	50	19	56	29	34	103	11	8	14	44	13	259	76	44	291	22	45	181	276	180	2	72	3	32	36	43	75	23	46		
H13	1,883	1	2	553	9	131	54	13	54	34	31	92	11	8	12	31	12	295	87	39	282	25	53	179	270	174	1	58	6	21	35	49	80	18	42		
H14	1,929	0	4	563	10	126	48	15	48	38	37	102	17	12	14	22	12	305	86	35	297	38	57	187	256	161	1	60	6	21	39	67	83	18	52		
H15	1,987	0	4	559	12	121	41	23	44	37	34	104	19	9	12	21	15	325	85	34	311	48	65	191	262	147	1	65	8	23	23	77	90	13	50		
H16	2,050	1	5	574	12	116	43	18	43	36	33	122	21	8	14	25	20	344	94	39	298	50	64	178	277	158	2	70	4	29	24	72	101	19	50		
H17	2,080	3	2	607	16	125	52	22	52	32	34	116	20	5	13	34	21	373	95	45	264	41	64	157	272	155	2	74	4	32	29	57	104	18	49		
H18	2,129	5	4	604	15	115	53	21	48	36	42	113	17	7	16	38	23	404	109	53	260	36	62	158	272	161	2	70	5	31	43	54	98	19	53		
H19	2,129	/	3	611	17	107	47	25	48	40	44	116	19	8	/	36	19	409	99	47	239	32	57	147	/	137	/	/	/	27	46	72	95	18	57		
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

七尾市期待死亡数（総数）（平成12年の全国死亡率を基準）

年	死亡総数	脳管感染症	結核	悪性新生物	内臓器										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血			脳内出血	脳梗塞	呼吸器系の疾患	肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	くも膜下出血	くも膜下出血														くも膜下出血
H11	1,916.42	2.49	5.34	576.98	19.48	99.33	46.71	23.58	65.43	30.70	37.51	106.91	16.36	0.00	0.00	24.49	12.69	299.00	93.02	49.40	272.45	28.10	61.59	174.57	281.89	183.03	2.90	74.93	7.81	29.59	35.95	45.06	73.11	21.60	48.71		
H12	1,966.35	2.57	5.48	587.85	19.73	101.29	47.72	23.95	66.28	31.50	38.25	109.18	16.47	0.00	0.00	25.05	13.18	308.12	95.60	50.86	281.10	28.54	63.05	181.05	292.02	189.90	3.01	76.64	8.03	29.89	37.20	47.17	74.25	21.58	48.60		
H13	2,027.97	2.67	5.65	600.37	20.02	103.59	48.93	24.39	67.23	32.43	39.10	111.70	16.58	0.00	0.00	25.73	13.82	319.55	98.73	52.67	291.88	29.06	64.80	189.23	304.78	198.67	3.16	78.76	8.31	30.25	38.78	50.04	75.69	21.58	48.49		
H14	2,109.62	2.80	5.87	617.24	20.46	106.68	50.53	25.00	68.59	33.64	40.24	114.97	16.77	0.00	0.00	26.62	14.65	334.47	102.81	55.04	305.84	29.77	67.09	199.75	321.28	210.04	3.35	81.62	8.67	30.81	40.82	53.90	77.86	21.79	48.66		
H15	2,181.48	2.92	6.06	631.73	20.85	109.35	51.93	25.53	69.70	34.69	41.22	117.75	16.91	0.00	0.00	27.41	15.40	347.69	106.39	57.14	318.24	30.38	69.11	209.14	335.97	220.19	3.52	84.15	9.00	31.30	42.63	57.35	79.75	21.97	48.80		
H16	2,252.12	3.03	6.25	645.40	21.21	111.90	53.28	26.04	70.68	35.70	42.15	120.36	17.04	0.00	0.00	28.17	16.16	360.81	109.91	59.21	330.58	30.96	71.06	218.55	350.66	230.40	3.69	86.62	9.32	31.75	44.45	60.87	81.53	22.07	48.95		
H17	2,322.09	3.15	6.44	658.07	21.50	114.30	54.56	26.49	71.50	36.68	43.00	122.76	17.16	0.00	0.00	28.91	16.93	373.98	113.40	61.28	343.07	31.51	72.99	228.18	365.64	240.84	3.86	89.06	9.64	32.14	46.30	64.47	83.25	22.12	49.02		
H18	2,391.60	3.26	6.62	670.69	21.79	116.69	55.83	26.94	72.41	37.65	43.84	125.13	17.24	0.00	0.00	29.63	17.72	387.12	116.87	63.34	355.48	32.03	74.88	237.79	380.58	251.28	4.04	91.46	9.96	32.52	48.14	68.12	84.91	22.14	48.94		
H19	2,322.19	/	5.09	653.51	21.15	101.94	56.10	26.71	66.51	35.50	45.77	126.23	19.02	0.00	/	28.39	13.92	385.78	102.14	63.40	298.46	28.81	69.38	192.20	/	256.02	/	/	/	30.31	47.75	68.05	77.83	16.46	45.64		
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

95%信頼上限値・95%信頼下限値は、観察区域死亡数がポアソン分布に従うものと仮定して95%の信頼区間を表示させました。
 信頼上限が1より小さければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が良い。
 信頼下限が1より大きければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が悪い。

<< 標準化死亡比(SMR)とその信頼区間について >>

標準化死亡比とは、年齢構成の異なる集団間の死亡傾向を比較する指標であるが、上記の帳表は、2000年の全国を標準集団として標準化死亡比を計算したものである。
 人口規模の小さい観察区域においては、観察区域死亡数が小さいため(1000人以下)偶然変動の影響を受けやすく指標値が大きく変動する。そのためデータを3年移動平均(複数年法)し中央年を表示年とした。
 また、複数の観察区域間で指数値を比較する際、標準化死亡比は基準となる集団との死亡水準比較の指標であり死亡構造を表す指標ではないことも念頭に置いてください。

七尾市死亡数（男）（3年移動平均）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	呼吸器系の疾患				肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺							
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞							肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍				
H11	1,051	0	5	328	15	69	22	11	32	12	22	75	0	0	11	25	5	130	50	17	163	12	30	102	169	105	1	42	2	23	15	5	50	22	32		
H12	1,015	0	2	343	11	79	26	8	37	11	20	74	0	0	14	27	6	129	46	18	125	7	24	79	160	98	1	41	2	22	14	6	47	16	34		
H13	985	0	0	321	6	76	28	10	34	13	16	67	0	0	12	19	6	141	50	16	125	9	27	78	168	102	1	30	4	13	15	7	51	13	29		
H14	998	0	1	328	7	81	24	11	31	15	20	74	0	0	14	11	7	143	42	18	129	11	34	76	161	106	1	30	3	13	15	15	48	11	33		
H15	1,025	0	1	315	9	79	24	16	24	17	16	73	0	0	12	12	8	142	39	19	141	14	42	81	166	97	1	34	5	15	12	21	55	8	34		
H16	1,098	1	2	346	11	82	24	11	26	16	21	89	1	0	14	12	12	153	39	26	136	15	42	77	170	106	1	41	2	21	13	22	63	11	33		
H17	1,123	2	1	355	14	79	27	16	31	16	18	82	1	0	13	15	10	167	40	28	126	12	36	78	166	97	1	48	3	23	17	16	69	11	36		
H18	1,119	2	1	361	13	65	27	16	32	19	23	87	1	0	16	16	9	193	54	28	111	10	29	72	162	96	1	41	3	18	22	11	63	13	40		
H19	1,077	/	0	347	14	58	22	17	29	20	20	90	0	0	/	16	5	191	51	21	103	6	30	67	/	/	/	/	/	14	24	10	53	10	41		
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

七尾市期待死亡数（男）（平成12年の全国死亡率を基準）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	呼吸器系の疾患				肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺							
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞							肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍				
H11	994.01	1.03	3.61	336.36	15.83	61.71	22.88	14.13	42.84	13.35	19.32	75.05	0.15	0.00	15.12	12.07	4.27	138.01	47.61	24.67	123.34	9.67	31.29	79.07	152.15	94.34	1.20	39.66	4.11	19.08	15.92	12.12	43.70	14.41	33.48		
H12	1,017.55	1.05	3.70	342.90	16.05	62.94	23.36	14.36	43.39	13.68	19.67	76.71	0.16	0.00	15.60	12.29	4.42	141.66	48.75	25.30	126.93	9.75	31.91	81.86	157.60	97.89	1.25	40.35	4.20	19.22	16.46	12.74	44.19	14.35	33.36		
H13	1,046.83	1.09	3.81	350.64	16.32	64.42	23.95	14.63	44.02	14.06	20.08	78.61	0.16	0.00	16.19	12.57	4.62	146.24	50.16	26.10	131.41	9.86	32.66	85.37	164.52	102.46	1.31	41.21	4.32	19.40	17.14	13.60	44.86	14.32	33.25		
H14	1,087.57	1.14	3.97	361.53	16.73	66.49	24.76	15.03	44.97	14.59	20.67	81.21	0.17	0.00	16.99	12.96	4.89	152.52	52.08	27.19	137.48	10.03	33.72	90.05	173.75	108.55	1.39	42.46	4.49	19.72	18.05	14.75	46.04	14.46	33.38		
H15	1,121.86	1.18	4.10	370.80	17.10	68.26	25.46	15.37	45.76	15.04	21.17	83.40	0.17	0.00	17.66	13.30	5.10	157.79	53.70	28.12	142.61	10.17	34.63	94.00	181.49	113.65	1.46	43.52	4.63	20.00	18.81	15.66	47.02	14.57	33.48		
H16	1,150.84	1.21	4.22	378.31	17.39	69.71	26.04	15.65	46.36	15.41	21.57	85.17	0.18	0.00	18.24	13.58	5.30	162.29	55.06	28.91	147.02	10.28	35.38	97.43	188.26	118.14	1.52	44.42	4.75	20.23	19.48	16.50	47.77	14.58	33.57		
H17	1,175.96	1.24	4.32	384.36	17.61	70.90	26.51	15.87	46.77	15.72	21.89	86.62	0.18	0.00	18.76	13.80	5.48	166.27	56.23	29.60	150.97	10.36	36.00	100.57	194.48	122.31	1.57	45.16	4.85	20.38	20.09	17.30	48.35	14.54	33.54		
H18	1,202.96	1.28	4.42	391.10	17.83	72.21	27.03	16.11	47.31	16.07	22.23	88.21	0.19	0.00	19.33	14.05	5.67	170.52	57.49	30.33	155.20	10.44	36.68	103.94	201.14	126.74	1.63	45.94	4.96	20.52	20.73	18.13	48.97	14.49	33.39		
H19	1,165.03	/	3.33	376.94	17.19	62.86	26.13	16.15	42.28	15.71	22.94	88.13	0.16	0.00	/	13.55	4.67	170.67	51.13	32.20	132.44	9.83	34.90	84.30	/	/	/	/	/	18.85	20.67	16.83	44.26	10.79	32.11		
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

95%信頼上限値・95%信頼下限値は、観察区域死亡数がポアソン分布に従うものと仮定して95%の信頼区間を表示させました。

信頼上限が1より小さければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が良い。

信頼下限が1より大きければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が悪い。

<< 標準化死亡比(SMR)とその信頼区間について >>

標準化死亡比とは、年齢構成の異なる集団間の死亡傾向を比較する指標であるが、上記の帳表は、2000年の全国を標準集団として標準化死亡比を計算したものである。人口規模の小さい観察区域においては、観察区域死亡数が小さいため(1000人以下)偶然変動の影響を受けやすく指標値が大きく変動する。そのためデータを3年移動平均(複数年法)し中央年を表示年とした。また、複数の観察区域間で指数値を比較する際、標準化死亡比は基準となる集団との死亡水準比較の指標であり死亡構造を表す指標ではないことも念頭に置いてください。

七尾市死亡数（女）（3年移動平均）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	呼吸器系の疾患				肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺				
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞										の疾患			
H11	948	1	2	242	0	49	18	13	18	17	18	35	10	8	0	19	7	122	28	25	187	21	23	108	130	95	1	31	4	12	16	38	36	11	8		
H12	900	1	1	226	1	47	24	11	19	18	14	29	11	8	0	17	7	130	30	26	166	15	21	102	116	82	1	31	1	10	22	37	28	7	12		
H13	898	1	2	232	3	55	26	3	20	21	15	25	11	8	0	12	6	154	37	23	157	16	26	101	102	72	0	28	2	8	20	42	29	5	13		
H14	931	0	3	235	3	45	24	4	17	23	17	28	17	12	0	11	5	162	44	17	168	27	23	111	95	55	0	30	3	8	24	52	35	7	19		
H15	962	0	3	244	3	42	17	7	20	20	18	31	19	9	0	9	7	183	46	15	170	34	23	110	96	50	0	31	3	8	11	56	35	5	16		
H16	952	0	3	228	1	34	19	7	17	20	12	33	20	8	0	13	8	191	55	13	162	35	22	101	107	52	1	29	2	8	11	50	38	8	17		
H17	957	1	1	252	2	46	25	6	21	16	16	34	19	5	0	19	11	206	55	17	138	29	28	79	106	58	1	26	1	9	12	41	35	7	13		
H18	1,010	3	3	243	2	50	26	5	16	17	19	26	16	7	0	22	14	211	55	25	149	26	33	86	110	65	1	29	2	13	21	43	35	6	13		
H19	1,052		3	264	3	49	25	8	19	20	24	26	19	8		20	14	218	48	26	136	26	27	80		55				13	22	62	42	8	16		
H20																																					

七尾市期待死亡数（女）（平成12年の全国死亡率を基準）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	呼吸器系の疾患				肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺				
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞										の疾患			
H11	906.61	1.46	1.65	233.78	3.14	36.17	23.51	9.14	21.41	17.27	17.92	30.00	16.57	9.94	0.00	12.22	8.44	159.19	44.62	24.34	147.75	18.53	29.82	94.53	126.81	86.85	1.70	34.65	3.65	10.11	19.81	33.08	28.70	6.99	14.77		
H12	933.93	1.51	1.70	238.55	3.21	36.99	24.07	9.31	21.83	17.74	18.33	30.70	16.64	10.08	0.00	12.57	8.78	164.79	46.11	25.20	152.88	18.89	30.71	98.25	131.60	90.25	1.76	35.73	3.78	10.31	20.54	34.56	29.39	7.04	14.81		
H13	967.85	1.58	1.77	244.06	3.29	37.96	24.72	9.51	22.28	18.30	18.80	31.50	16.72	10.23	0.00	13.00	9.21	171.80	47.92	26.25	159.30	19.29	31.76	103.00	137.72	94.62	1.85	37.06	3.94	10.54	21.45	36.55	30.23	7.10	14.86		
H14	1,011.54	1.66	1.84	251.15	3.40	39.21	25.56	9.77	22.85	19.00	19.40	32.50	16.85	10.45	0.00	13.52	9.79	180.74	50.20	27.60	167.46	19.81	33.06	109.05	145.58	100.25	1.96	38.77	4.16	10.84	22.62	39.25	31.34	7.21	14.98		
H15	1,051.44	1.74	1.91	257.36	3.50	40.32	26.31	10.00	23.33	19.62	19.93	33.38	16.94	10.63	0.00	13.99	10.32	188.97	52.27	28.83	174.97	20.26	34.24	114.68	152.87	105.49	2.07	40.33	4.35	11.10	23.69	41.80	32.35	7.30	15.08		
H16	1,093.67	1.82	1.99	263.83	3.60	41.48	27.10	10.24	23.82	20.27	20.47	34.29	17.03	10.84	0.00	14.49	10.89	197.71	54.47	30.14	182.96	20.74	35.48	120.68	160.63	111.08	2.18	41.98	4.56	11.37	24.84	44.52	33.39	7.38	15.19		
H17	1,137.87	1.90	2.07	270.43	3.71	42.69	27.90	10.48	24.29	20.93	21.02	35.23	17.12	11.04	0.00	15.02	11.49	206.92	56.80	31.52	191.44	21.21	36.79	127.07	168.84	117.00	2.29	43.71	4.78	11.64	26.06	47.33	34.48	7.46	15.31		
H18	1,180.78	1.98	2.15	276.66	3.81	43.83	28.66	10.71	24.74	21.57	21.53	36.11	17.19	11.22	0.00	15.51	12.09	215.90	59.04	32.86	199.67	21.66	38.04	133.33	176.88	122.82	2.41	45.39	5.00	11.89	27.24	50.18	35.51	7.52	15.38		
H19	1,143.49		1.69	270.84	3.60	38.02	29.73	10.32	23.51	19.63	22.62	36.24	19.05	10.19		14.73	9.21	213.60	50.43	30.85	164.73	19.03	34.12	106.93		124.33				11.30	26.92	51.25	33.04	5.54	13.24		
H20																																					

95%信頼上限値・95%信頼下限値は、観察区域死亡数がポアソン分布に従うものと仮定して95%の信頼区間を表示させました。

信頼上限が1より小さければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が良い。

信頼下限が1より大きければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が悪い。

<< 標準化死亡比(SMR)とその信頼区間について >>

標準化死亡比とは、年齢構成の異なる集団間の死亡傾向を比較する指標であるが、上記の帳表は、2000年の全国を標準集団として標準化死亡比を計算したものである。人口規模の小さい観察区域においては、観察区域死亡数が小さいため(1000人以下)偶然変動の影響を受けやすく指標値が大きく変動する。そのためデータを3年移動平均(複数年法)し中央年を表示年とした。また、複数の観察区域間で指数値を比較する際、標準化死亡比は基準となる集団との死亡水準比較の指標であり死亡構造を表す指標ではないことも念頭に置いてください。

羽咋市死亡数（総数）（3年移動平均）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	内臓疾患											糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺					
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺							くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎							胃潰瘍及び十二指腸潰瘍				
H11	758	5	1	237	4	54	15	11	15	19	17	52	6	2	5	3	11	85	37	7	126	14	22	89	113	80	0	19	3	6	13	22	38	11	21		
H12	773	5	2	225	4	48	16	13	18	14	17	45	5	1	2	5	13	93	35	14	124	10	26	87	117	81	0	24	3	6	10	24	47	11	16		
H13	733	3	1	209	4	39	16	10	15	18	13	42	4	0	3	6	17	98	29	20	111	12	19	79	113	71	0	33	4	11	8	20	44	11	14		
H14	778	2	1	222	5	42	19	13	11	16	16	40	6	1	4	12	16	99	34	19	123	14	22	86	120	78	0	34	2	10	10	22	50	15	10		
H15	794	1	0	232	6	45	19	11	9	23	17	40	6	6	4	10	11	99	36	13	116	17	21	77	140	94	0	33	2	10	14	23	43	14	15		
H16	821	2	0	231	6	53	15	12	12	22	19	35	7	6	6	12	5	106	35	9	124	20	24	78	158	111	0	27	1	9	14	23	37	10	21		
H17	782	3	1	212	4	47	15	8	16	19	17	34	6	5	5	10	3	106	27	12	117	20	21	70	154	113	0	29	2	10	13	20	36	10	20		
H18	809	4	1	213	3	48	13	7	19	11	14	43	7	1	11	13	7	126	31	15	112	19	17	70	148	105	0	26	2	9	11	26	40	10	19		
H19	838	/	1	229	5	47	17	7	17	8	13	53	9	2	/	12	7	126	29	21	112	18	14	73	/	100	/	/	/	8	10	32	51	13	15		
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

羽咋市期待死亡数（総数）（平成12年全国死亡率を基準）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	内臓疾患											糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺					
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺							くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎							胃潰瘍及び十二指腸潰瘍				
H11	798.35	1.05	2.21	235.88	7.94	40.72	19.22	9.65	26.51	12.64	15.34	43.56	6.66	0.00	0.00	10.09	5.48	125.64	38.68	20.70	114.55	11.48	25.45	74.15	119.54	78.11	1.25	31.15	3.27	12.08	15.23	20.17	30.07	8.72	19.74		
H12	818.95	1.08	2.27	240.48	8.05	41.54	19.65	9.81	26.91	12.97	15.65	44.50	6.70	0.00	0.00	10.32	5.68	129.36	39.73	21.29	118.05	11.67	26.05	76.77	123.63	80.88	1.30	31.85	3.36	12.21	15.73	21.03	30.57	8.74	19.74		
H13	841.98	1.12	2.33	245.62	8.18	42.47	20.13	9.99	27.35	13.34	16.00	45.54	6.74	0.00	0.00	10.59	5.90	133.53	40.91	21.96	121.97	11.87	26.71	79.69	128.21	83.99	1.35	32.64	3.46	12.36	16.30	21.97	31.15	8.77	19.73		
H14	866.07	1.16	2.40	251.09	8.34	43.45	20.63	10.19	27.84	13.72	16.37	46.63	6.79	0.00	0.00	10.87	6.13	137.86	42.13	22.66	126.01	12.09	27.41	82.69	132.92	87.19	1.40	33.49	3.57	12.54	16.88	22.98	31.77	8.82	19.73		
H15	887.94	1.19	2.46	256.16	8.49	44.37	21.10	10.38	28.29	14.07	16.72	47.63	6.83	0.00	0.00	11.13	6.33	141.77	43.25	23.29	129.68	12.30	28.05	85.40	137.17	90.07	1.45	34.26	3.67	12.72	17.41	23.85	32.33	8.86	19.73		
H16	905.42	1.22	2.51	259.86	8.59	45.04	21.46	10.52	28.59	14.35	16.98	48.37	6.85	0.00	0.00	11.33	6.51	145.00	44.15	23.80	132.72	12.45	28.55	87.71	140.76	92.53	1.49	34.87	3.75	12.83	17.85	24.63	32.73	8.86	19.68		
H17	927.71	1.25	2.57	264.10	8.69	45.84	21.87	10.66	28.89	14.68	17.27	49.22	6.86	0.00	0.00	11.57	6.74	149.20	45.28	24.46	136.70	12.61	29.17	90.77	145.53	95.82	1.54	35.62	3.85	12.93	18.44	25.71	33.26	8.87	19.63		
H18	949.26	1.29	2.63	268.03	8.77	46.58	22.27	10.79	29.18	14.99	17.53	49.99	6.87	0.00	0.00	11.80	6.99	153.31	46.38	25.11	140.59	12.76	29.75	93.81	150.24	99.10	1.59	36.35	3.95	13.02	19.02	26.82	33.75	8.86	19.53		
H19	919.08	/	2.01	260.93	8.53	40.67	22.34	10.69	26.73	14.10	18.31	50.41	7.58	0.00	/	11.29	5.46	152.22	40.42	25.10	117.66	11.46	27.52	75.49	/	100.47	/	/	/	12.12	18.78	26.55	30.88	6.59	18.21		
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

95%信頼上限値・95%信頼下限値は、観察区域死亡数がポアソン分布に従うものと仮定して95%の信頼区間を表示させました。

信頼上限が1より小さければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が良い。

信頼下限が1より大きければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が悪い。

<< 標準化死亡比(SMR)とその信頼区間について >>

標準化死亡比とは、年齢構成の異なる集団間の死亡傾向を比較する指標であるが、上記の帳表は、2000年の全国を標準集団として標準化死亡比を計算したものである。

人口規模の小さい観察区域においては、観察区域死亡数が小さいため(1000人以下)偶然変動の影響を受けやすく指標値が大きく変動する。そのためデータを3年移動平均(複数年法)し中央年を表示年とした。

また、複数の観察区域間で指数値を比較する際、標準化死亡比は基準となる集団との死亡水準比較の指標であり死亡構造を表す指標ではないことも念頭に置いてください。

羽咋市死亡数（男）（3年移動平均）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	内臓疾患											糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患	肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び胆内臓	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺							くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞													
H11	398	3	0	137	4	31	5	6	11	7	9	40	0	0	5	2	8	48	23	4	56	4	10	41	70	46	0	8	1	4	7	3	17	6	12		
H12	404	4	0	131	4	25	10	7	14	5	8	34	0	0	2	2	7	55	22	8	46	4	12	29	81	54	0	9	1	2	4	3	27	7	8		
H13	381	2	0	127	4	21	7	5	11	8	8	32	0	0	3	2	8	51	15	12	37	4	7	25	75	44	0	14	3	3	2	4	29	8	8		
H14	394	1	0	131	4	26	9	6	8	7	10	28	0	0	4	8	5	50	17	12	49	4	10	34	67	42	0	12	2	1	4	6	34	9	8		
H15	398	0	0	127	5	30	6	5	5	12	10	25	0	0	4	8	3	51	19	9	48	5	10	32	77	48	0	15	2	5	4	5	29	9	11		
H16	415	1	0	132	5	39	7	6	3	11	12	23	0	0	6	9	0	50	20	6	52	5	14	33	84	55	0	15	1	7	5	5	25	6	13		
H17	407	1	1	125	4	37	7	6	7	8	11	22	0	0	5	4	1	46	13	6	50	6	12	29	92	63	0	18	1	9	4	4	26	8	11		
H18	426	1	1	138	3	38	7	4	10	4	7	34	0	0	11	3	6	50	15	9	55	6	12	34	84	53	0	13	1	7	5	6	29	8	11		
H19	453	/	1	151	5	38	10	3	12	2	5	44	0	0	/	4	6	53	12	11	57	5	10	37	/	57	/	/	/	7	4	7	36	9	11		
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

羽咋市期待死亡数（男）（平成12年全国死亡率を基準）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	内臓疾患											糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患	肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び胆内臓	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺							くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞												
H11	414.20	0.43	1.51	139.02	6.52	25.55	9.49	5.84	17.58	5.54	7.98	31.00	0.06	0.00	6.36	4.99	1.82	57.74	19.82	10.32	51.76	3.96	12.98	33.43	64.43	40.12	0.51	16.45	1.71	7.84	6.72	5.30	18.00	5.85	13.62	
H12	423.59	0.44	1.54	141.84	6.62	26.07	9.69	5.94	17.83	5.68	8.13	31.73	0.07	0.00	6.55	5.09	1.87	59.14	20.28	10.57	53.15	4.00	13.23	34.50	66.47	41.41	0.53	16.72	1.75	7.90	6.92	5.48	18.23	5.85	13.60	
H13	436.34	0.46	1.59	145.32	6.75	26.73	9.95	6.06	18.15	5.85	8.31	32.56	0.07	0.00	6.80	5.21	1.95	61.11	20.88	10.91	55.05	4.04	13.56	35.98	69.39	43.33	0.55	17.09	1.80	7.98	7.21	5.84	18.56	5.86	13.57	
H14	451.54	0.48	1.64	149.21	6.90	27.48	10.25	6.20	18.51	6.04	8.52	33.45	0.07	0.00	7.09	5.36	2.06	63.51	21.59	11.32	57.30	4.10	13.94	37.73	72.93	45.72	0.59	17.55	1.86	8.10	7.57	6.38	18.96	5.88	13.57	
H15	465.93	0.49	1.70	153.03	7.06	28.21	10.54	6.35	18.86	6.22	8.73	34.33	0.07	0.00	7.36	5.50	2.16	65.76	22.27	11.71	59.42	4.16	14.31	39.36	76.20	47.91	0.62	18.01	1.92	8.22	7.90	6.84	19.33	5.90	13.58	
H16	477.22	0.50	1.74	155.94	7.17	28.76	10.76	6.45	19.09	6.37	8.88	35.02	0.07	0.00	7.58	5.61	2.24	67.54	22.80	12.02	61.15	4.20	14.59	40.72	78.90	49.71	0.64	18.34	1.97	8.30	8.17	7.20	19.60	5.88	13.56	
H17	488.27	0.52	1.79	158.66	7.25	29.29	10.97	6.54	19.27	6.51	9.02	35.70	0.07	0.00	7.82	5.70	2.32	69.29	23.32	12.32	62.90	4.23	14.86	42.14	81.68	51.55	0.67	18.64	2.01	8.33	8.43	7.54	19.86	5.88	13.50	
H18	498.04	0.53	1.82	161.05	7.32	29.76	11.16	6.62	19.46	6.64	9.14	36.28	0.08	0.00	8.03	5.79	2.39	70.84	23.78	12.59	64.46	4.24	15.09	43.41	84.18	53.22	0.69	18.90	2.05	8.36	8.68	7.86	20.08	5.87	13.41	
H19	480.47	/	1.37	154.82	7.06	25.85	10.75	6.63	17.33	6.47	9.41	36.13	0.07	0.00	/	5.56	1.95	70.55	21.04	13.28	54.72	3.98	14.29	35.03	/	54.34	/	/	/	7.66	8.60	7.22	18.13	4.37	12.87	
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

95%信頼上限値・95%信頼下限値は、観察区域死亡数がポアソン分布に従うものと仮定して95%の信頼区間を表示させました。
 信頼上限が1より小さければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が良い。
 信頼下限が1より大きければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が悪い。

<< 標準化死亡比(SMR)とその信頼区間について >>

標準化死亡比とは、年齢構成の異なる集団間の死亡傾向を比較する指標であるが、上記の帳表は、2000年の全国を標準集団として標準化死亡比を計算したものである。
 人口規模の小さい観察区域においては、観察区域死亡数が小さいため(1000人以下)偶然変動の影響を受けやすく指標値が大きく変動する。そのためデータを3年移動平均(複数年法)し中央年を表示年とした。
 また、複数の観察区域間で指数値を比較する際、標準化死亡比は基準となる集団との死亡水準比較の指標であり死亡構造を表す指標ではないことも念頭に置いてください。

羽咋市死亡数（女）（3年移動平均）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	内臓疾患										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺						
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故												
H11	360	2	1	100	0	23	10	5	4	12	8	12	6	2	0	1	3	37	14	3	70	10	12	48	43	34	0	11	2	2	6	19	21	5	9		
H12	369	1	2	94	0	23	6	6	4	9	9	11	5	1	0	3	6	38	13	6	78	6	14	58	36	27	0	15	2	4	6	21	20	4	8		
H13	352	1	1	82	0	18	9	5	4	10	5	10	4	0	0	4	9	47	14	8	74	8	12	54	38	27	0	19	1	8	6	16	15	3	6		
H14	384	1	1	91	1	16	10	7	3	9	6	12	6	1	0	4	11	49	17	7	74	10	12	52	53	36	0	22	0	9	6	16	16	6	2		
H15	396	1	0	105	1	15	13	6	4	11	7	15	6	6	0	2	8	48	17	4	68	12	11	45	63	46	0	18	0	5	10	18	14	5	4		
H16	406	1	0	99	1	14	8	6	9	11	7	12	7	6	0	3	5	56	15	3	72	15	10	45	74	56	0	12	0	2	9	18	12	4	8		
H17	375	2	0	87	0	10	8	2	9	11	6	12	6	5	0	6	2	60	14	6	67	14	9	41	62	50	0	11	1	1	9	16	10	2	9		
H18	383	3	0	75	0	10	6	3	9	7	7	9	7	1	0	10	1	76	16	6	57	13	5	36	64	52	0	13	1	2	6	20	11	2	8		
H19	385	/	0	78	0	9	7	4	5	6	8	9	9	2	/	8	1	73	17	10	55	13	4	36	/	43	/	/	/	1	6	25	15	4	4		
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

羽咋市期待死亡数（女）（平成12年全国死亡率を基準）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	内臓疾患										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺						
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故												
H11	380.82	0.62	0.68	95.41	1.29	14.85	9.66	3.74	8.62	7.09	7.31	12.24	6.71	4.04	0.00	5.03	3.68	67.52	18.66	10.30	62.60	7.53	12.35	40.65	54.44	37.51	0.74	14.56	1.56	4.11	8.44	14.97	11.87	2.81	5.96		
H12	392.48	0.64	0.71	97.39	1.32	15.19	9.90	3.81	8.79	7.29	7.47	12.52	6.74	4.10	0.00	5.18	3.83	69.90	19.28	10.66	64.77	7.68	12.70	42.24	56.51	38.99	0.77	15.02	1.61	4.20	8.75	15.67	12.16	2.83	6.00		
H13	403.70	0.66	0.73	99.43	1.35	15.53	10.13	3.88	8.98	7.49	7.65	12.82	6.77	4.16	0.00	5.33	3.96	72.18	19.89	11.00	66.85	7.83	13.07	43.74	58.44	40.35	0.79	15.46	1.67	4.29	9.05	16.23	12.45	2.86	6.03		
H14	413.75	0.68	0.75	101.43	1.38	15.87	10.36	3.96	9.17	7.68	7.83	13.11	6.79	4.22	0.00	5.47	4.07	74.19	20.46	11.31	68.70	7.98	13.41	45.03	60.10	41.50	0.82	15.86	1.71	4.37	9.30	16.64	12.73	2.90	6.05		
H15	422.61	0.70	0.77	103.19	1.41	16.17	10.56	4.02	9.34	7.86	7.99	13.37	6.81	4.27	0.00	5.60	4.17	75.98	20.97	11.59	70.34	8.12	13.72	46.17	61.56	42.52	0.83	16.21	1.75	4.45	9.53	17.00	12.97	2.93	6.07		
H16	430.13	0.71	0.78	104.48	1.43	16.39	10.72	4.07	9.45	7.99	8.10	13.56	6.80	4.31	0.00	5.71	4.26	77.54	21.39	11.82	71.77	8.22	13.96	47.21	62.90	43.47	0.85	16.51	1.79	4.50	9.74	17.39	13.16	2.94	6.08		
H17	442.23	0.74	0.80	106.32	1.46	16.72	10.94	4.13	9.60	8.18	8.26	13.83	6.80	4.36	0.00	5.85	4.42	80.07	22.04	12.20	74.08	8.35	14.33	48.95	65.13	45.07	0.88	16.98	1.85	4.58	10.07	18.13	13.46	2.96	6.09		
H18	454.60	0.76	0.83	108.12	1.49	17.06	11.16	4.20	9.75	8.38	8.42	14.10	6.80	4.40	0.00	6.00	4.59	82.68	22.70	12.59	76.47	8.48	14.70	50.76	67.45	46.74	0.92	17.47	1.91	4.65	10.41	18.92	13.76	2.98	6.09		
H19	439.01	/	0.65	105.84	1.41	14.78	11.56	4.05	9.25	7.61	8.86	14.15	7.54	4.01	/	5.69	3.48	81.49	19.34	11.82	62.90	7.45	13.17	40.51	/	47.05	/	/	/	4.42	10.24	19.17	12.77	2.19	5.26		
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

95%信頼上限値・95%信頼下限値は、観察区域死亡数がポアソン分布に従うものと仮定して95%の信頼区間を表示させました。
 信頼上限が1より小さければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が良い。
 信頼下限が1より大きければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が悪い。

<< 標準化死亡比(SMR)とその信頼区間について >>

標準化死亡比とは、年齢構成の異なる集団間の死亡傾向を比較する指標であるが、上記の帳表は、2000年の全国を標準集団として標準化死亡比を計算したものである。
 人口規模の小さい観察区域においては、観察区域死亡数が小さいため(1000人以下)偶然変動の影響を受けやすく指標値が大きく変動する。そのためデータを3年移動平均(複数年法)し中央年を表示年とした。
 また、複数の観察区域間で指数値を比較する際、標準化死亡比は基準となる集団との死亡水準比較の指標であり死亡構造を表す指標ではないことも念頭に置いてください。

志賀町死亡数（総数）（3年移動平均）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性 新生物	消化器系										呼吸器系			腎不全			老衰	不慮の 事故		自殺													
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝 内胆管	胆のう等	膵	気管、気 管支及び 肺	乳房	子宮	前立腺	糖尿病	高血圧 性疾患	心疾患 (高血圧 性を除く)	急性心筋 梗塞	その他の 虚血性 心疾患		脳血管疾 患	くも膜下 出血		脳内 出血	脳梗塞	呼吸器系 の疾患	肺炎	急性気管 支炎	消化器系 の疾患	胃潰瘍及 び十二指 腸潰瘍	肝疾患	腎不全	交通 事故			
H1 1	888	1	4	257	4	60	17	12	11	28	23	45	6	4	3	4	5	147	49	24	112	11	30	66	143	108	0	31	3	11	21	39	39	11	23		
H1 2	897	1	4	254	2	63	18	11	15	21	18	44	4	5	7	7	4	150	43	23	117	12	28	71	131	99	0	34	3	7	18	37	43	14	24		
H1 3	897	1	4	250	2	57	19	10	15	16	19	54	3	4	10	11	4	134	34	18	123	14	33	70	148	107	0	38	3	7	15	28	40	12	25		
H1 4	876	1	4	223	6	45	18	8	13	11	14	47	2	5	11	11	4	130	32	18	119	13	33	69	155	111	0	36	3	6	16	38	42	10	25		
H1 5	874	1	2	235	10	44	17	14	10	13	18	50	3	2	9	8	3	118	33	13	116	16	33	64	163	116	0	33	4	6	19	42	37	7	25		
H1 6	882	1	2	242	11	44	15	13	13	21	14	44	7	2	7	4	3	128	35	11	116	13	25	76	168	126	0	33	4	8	17	46	34	6	16		
H1 7	934	2	0	268	8	46	19	18	13	20	16	54	6	1	4	6	5	130	24	10	118	14	26	76	186	141	0	36	4	9	21	40	31	6	19		
H1 8	976	1	0	260	8	42	18	16	19	18	16	49	7	2	7	10	5	150	27	13	132	17	28	85	197	151	0	34	2	7	24	45	32	8	15		
H1 9	1,016	/	0	256	9	39	16	16	19	15	27	53	3	2	/	15	5	160	33	14	129	19	33	74	/	162	/	/	/	6	25	46	39	8	17		
H2 0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

志賀町期待死亡数（総数）（平成12年全国死亡率を基準）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性 新生物	消化器系										呼吸器系			腎不全			老衰	不慮の 事故		自殺													
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝 内胆管	胆のう等	膵	気管、気 管支及び 肺	乳房	子宮	前立腺	糖尿病	高血圧 性疾患	心疾患 (高血圧 性を除く)	急性心筋 梗塞	その他の 虚血性 心疾患		脳血管疾 患	くも膜下 出血		脳内 出血	脳梗塞	呼吸器系 の疾患	肺炎	急性気管 支炎	消化器系 の疾患	胃潰瘍及 び十二指 腸潰瘍	肝疾患	腎不全	交通 事故			
H1 1	882.33	1.17	2.46	261.05	8.71	45.08	21.31	10.60	29.35	14.15	17.02	48.62	7.07	0.00	0.00	11.21	6.07	139.48	43.07	22.99	127.51	12.55	28.19	82.93	133.42	87.07	1.38	34.24	3.63	13.06	16.97	22.08	32.41	9.03	20.09		
H1 2	913.00	1.22	2.54	267.05	8.84	46.19	21.89	10.81	29.78	14.60	17.42	49.82	7.14	0.00	0.00	11.53	6.39	145.17	44.61	23.89	132.86	12.80	29.04	87.01	139.80	91.47	1.46	35.29	3.77	13.24	17.76	23.58	33.16	9.06	20.13		
H1 3	943.25	1.27	2.62	273.00	8.98	47.28	22.46	11.01	30.22	15.04	17.82	50.99	7.20	0.00	0.00	11.86	6.71	150.78	46.12	24.78	138.14	13.06	29.89	91.03	146.08	95.80	1.53	36.34	3.91	13.42	18.54	25.06	33.91	9.09	20.15		
H1 4	969.70	1.31	2.69	278.08	9.11	48.22	22.96	11.19	30.61	15.42	18.17	51.99	7.23	0.00	0.00	12.13	7.00	155.71	47.44	25.55	142.75	13.26	30.60	94.57	151.64	99.67	1.60	37.24	4.03	13.56	19.22	26.46	34.55	9.11	20.08		
H1 5	994.22	1.35	2.76	282.92	9.24	49.12	23.44	11.37	30.97	15.78	18.50	52.93	7.26	0.00	0.00	12.40	7.26	160.26	48.66	26.28	147.02	13.45	31.28	97.84	156.75	103.20	1.66	38.09	4.14	13.71	19.85	27.68	35.16	9.15	20.04		
H1 6	1,020.19	1.39	2.83	287.66	9.36	50.01	23.92	11.54	31.29	16.15	18.83	53.85	7.28	0.00	0.00	12.67	7.55	165.17	49.96	27.05	151.66	13.64	31.98	101.44	162.35	107.11	1.72	38.98	4.25	13.84	20.54	29.04	35.75	9.13	19.99		
H1 7	1,046.21	1.43	2.90	291.98	9.44	50.85	24.38	11.68	31.51	16.52	19.12	54.70	7.28	0.00	0.00	12.94	7.85	170.19	51.28	27.84	156.46	13.81	32.69	105.22	168.20	111.20	1.79	39.86	4.38	13.93	21.26	30.44	36.32	9.10	19.88		
H1 8	1,068.81	1.47	2.96	295.76	9.52	51.58	24.78	11.81	31.75	16.84	19.37	55.43	7.26	0.00	0.00	13.18	8.12	174.58	52.42	28.53	160.62	13.95	33.28	108.51	173.31	114.78	1.85	40.61	4.48	14.00	21.89	31.70	36.79	9.06	19.72		
H1 9	1,022.93	/	2.25	286.14	9.20	44.71	24.67	11.63	29.15	15.71	20.05	55.52	7.99	0.00	/	12.50	6.22	170.93	45.14	28.00	132.43	12.43	30.45	85.98	/	114.50	/	/	/	12.99	21.30	30.63	33.47	6.72	17.97		
H2 0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

95%信頼上限値・95%信頼下限値は、観察区域死亡数がポアソン分布に従うものと仮定して95%の信頼区間を表示させました。

信頼上限が1より小さければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が良い。

信頼下限が1より大きければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が悪い。

<< 標準化死亡率(SMR)とその信頼区間について >>

標準化死亡率とは、年齢構成の異なる集団間の死亡傾向を比較する指標であるが、上記の帳表は、2000年の全国を標準集団として標準化死亡率を計算したものである。

人口規模の小さい観察区域においては、観察区域死亡数が小さいため(1000人以下)偶然変動の影響を受けやすく指標値が大きく変動する。そのためデータを3年移動平均(複数年法)し中央年を表示年とした。

また、複数の観察区域間で指数値を比較する際、標準化死亡率は基準となる集団との死亡水準比較の指標であり死亡構造を表す指標ではないことも念頭に置いてください。

志賀町死亡数（男）（3年移動平均）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	呼吸器系の疾患			急性気管支炎	消化器系の疾患	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺						
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	脾	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	肺炎	脳梗塞									くも膜下出血	脳内出血	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍			
H1 1	481	0	2	156	2	40	6	10	10	13	10	40	0	0	3	1	3	68	22	13	64	6	19	36	70	48	0	21	3	9	11	11	25	8	17		
H1 2	497	1	3	156	1	42	7	9	12	10	9	35	0	0	7	1	2	84	21	15	65	5	19	37	63	45	0	22	3	5	6	12	27	9	18		
H1 3	492	1	3	152	2	38	7	7	12	9	10	38	0	0	10	6	1	80	18	11	57	4	18	30	74	47	0	21	3	5	5	8	25	9	20		
H1 4	458	1	2	128	6	28	6	6	8	5	5	31	0	0	11	7	1	75	19	12	52	3	17	28	77	49	0	15	2	3	4	16	30	7	20		
H1 5	445	1	0	144	10	28	7	10	6	6	8	36	0	0	9	7	1	54	16	7	55	4	19	29	75	45	0	14	3	4	4	17	27	5	18		
H1 6	439	1	0	143	10	25	7	9	7	13	6	36	0	0	7	3	2	53	18	4	53	3	18	30	81	57	0	18	3	5	5	18	24	4	10		
H1 7	488	2	0	170	7	26	10	12	7	15	9	45	0	0	4	1	1	61	13	4	56	4	17	33	93	67	0	22	3	6	8	15	18	4	10		
H1 8	489	1	0	153	6	21	7	9	14	13	8	41	0	0	7	3	1	69	18	4	61	8	16	35	100	76	0	18	1	4	12	14	15	5	8		
H1 9	518	/	0	161	7	24	7	9	14	11	15	39	0	0	/	4	0	81	24	5	65	10	18	34	/	75	/	/	/	4	12	15	17	5	10		
H2 0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

志賀町期待死亡数（男）（平成12年全国死亡率を基準）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	呼吸器系の疾患			急性気管支炎	消化器系の疾患	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺						
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	脾	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	肺炎	脳梗塞									くも膜下出血	脳内出血	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍			
H1 1	462.06	0.48	1.68	154.25	7.16	28.38	10.56	6.43	19.41	6.20	8.81	34.50	0.07	0.00	7.21	5.54	2.08	64.84	22.14	11.56	58.35	4.27	14.36	38.15	73.66	46.08	0.59	18.10	1.91	8.45	7.67	6.35	19.40	6.04	13.96		
H1 2	476.40	0.50	1.73	157.77	7.27	29.06	10.83	6.55	19.65	6.37	9.00	35.38	0.07	0.00	7.50	5.66	2.19	67.09	22.82	11.95	60.54	4.33	14.72	39.88	77.10	48.36	0.62	18.52	1.97	8.53	8.01	6.80	19.79	6.05	14.01		
H1 3	489.42	0.52	1.78	161.15	7.39	29.71	11.08	6.67	19.92	6.54	9.18	36.21	0.07	0.00	7.76	5.78	2.27	69.11	23.44	12.30	62.51	4.38	15.05	41.41	80.12	50.35	0.65	18.90	2.02	8.62	8.31	7.17	20.13	6.07	14.05		
H1 4	500.16	0.53	1.83	164.15	7.51	30.28	11.31	6.78	20.18	6.69	9.34	36.95	0.08	0.00	7.97	5.89	2.34	70.75	23.95	12.59	64.10	4.41	15.33	42.65	82.56	51.95	0.67	19.21	2.07	8.68	8.55	7.47	20.40	6.08	14.00		
H1 5	510.30	0.54	1.87	167.07	7.63	30.83	11.52	6.89	20.44	6.83	9.50	37.65	0.08	0.00	8.17	5.99	2.40	72.29	24.43	12.86	65.60	4.45	15.59	43.81	84.81	53.42	0.69	19.52	2.11	8.76	8.77	7.73	20.64	6.08	13.96		
H1 6	520.55	0.55	1.91	169.92	7.74	31.37	11.74	6.98	20.66	6.97	9.65	38.37	0.08	0.00	8.39	6.09	2.47	73.87	24.92	13.14	67.18	4.48	15.85	45.06	87.23	54.99	0.71	19.81	2.15	8.81	9.00	7.99	20.85	6.04	13.88		
H1 7	530.37	0.57	1.95	172.34	7.81	31.84	11.92	7.06	20.78	7.11	9.77	39.02	0.08	0.00	8.62	6.17	2.54	75.42	25.39	13.41	68.81	4.49	16.09	46.40	89.81	56.68	0.73	20.05	2.19	8.81	9.25	8.24	21.02	5.99	13.73		
H1 8	540.05	0.58	1.99	174.88	7.89	32.33	12.12	7.14	20.95	7.25	9.90	39.68	0.08	0.00	8.85	6.26	2.60	76.95	25.86	13.68	70.38	4.49	16.32	47.69	92.30	58.30	0.75	20.30	2.23	8.82	9.48	8.50	21.19	5.94	13.55		
H1 9	516.33	/	1.48	167.50	7.58	27.93	11.61	7.12	18.76	7.03	10.14	39.36	0.07	0.00	/	5.99	2.09	75.77	22.68	14.27	59.05	4.20	15.37	37.97	/	58.54	/	/	/	8.08	9.27	7.58	19.06	4.43	12.80		
H2 0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

95%信頼上限値・95%信頼下限値は、観察区域死亡数がポアソン分布に従うものと仮定して95%の信頼区間を表示させました。

信頼上限が1より小さければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が良い。

信頼下限が1より大きければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が悪い。

<< 標準化死亡比(SMR)とその信頼区間について >>

標準化死亡比とは、年齢構成の異なる集団間の死亡傾向を比較する指標であるが、上記の帳表は、2000年の全国を標準集団として標準化死亡比を計算したものである。

人口規模の小さい観察区域においては、観察区域死亡数が小さいため(1000人以下)偶然変動の影響を受けやすく指標値が大きく変動する。そのためデータを3年移動平均(複数年法)し中央年を表示年とした。

また、複数の観察区域間で指数値を比較する際、標準化死亡比は基準となる集団との死亡水準比較の指標であり死亡構造を表す指標ではないことも念頭に置いてください。

志賀町死亡数（女）（3年移動平均）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	原因別										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺							
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	くも膜下出血	脳内出血								脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍			
H11	407	1	2	101	2	20	11	2	1	15	13	5	6	4	0	3	2	79	27	11	48	5	11	30	73	60	0	10	0	2	10	28	14	3	6		
H12	400	0	1	98	1	21	11	2	3	11	9	9	4	5	0	6	2	66	22	8	52	7	9	34	68	54	0	12	0	2	12	25	16	5	6		
H13	405	0	1	98	0	19	12	3	3	7	9	16	3	4	0	5	3	54	16	7	66	10	15	40	74	60	0	17	0	2	10	20	15	3	5		
H14	418	0	2	95	0	17	12	2	5	6	9	16	2	5	0	4	3	55	13	6	67	10	16	41	78	62	0	21	1	3	12	22	12	3	5		
H15	429	0	2	91	0	16	10	4	4	7	10	14	3	2	0	1	2	64	17	6	61	12	14	35	88	71	0	19	1	2	15	25	10	2	7		
H16	443	0	2	99	1	19	8	4	6	8	8	8	7	2	0	1	1	75	17	7	63	10	7	46	87	69	0	15	1	3	12	28	10	2	6		
H17	446	0	0	98	1	20	9	6	6	5	7	9	6	1	0	5	4	69	11	6	62	10	9	43	93	74	0	14	1	3	13	25	13	2	9		
H18	487	0	0	107	2	21	11	7	5	5	8	8	7	2	0	7	4	81	9	9	71	9	12	50	97	75	0	16	1	3	12	31	17	3	7		
H19	498	/	0	95	2	15	9	7	5	4	12	14	3	2	/	11	5	79	9	9	64	9	15	40	/	87	/	/	/	2	13	31	22	3	7		
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

志賀町期待死亡数（女）（平成12年全国死亡率を基準）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	原因別										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺						
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	くも膜下出血	脳内出血								脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍		
H11	417.00	0.68	0.77	105.10	1.43	16.36	10.67	4.10	9.67	7.93	8.13	13.60	7.06	4.36	0.00	5.63	3.98	74.22	20.75	11.35	68.82	8.31	13.72	44.52	59.46	40.85	0.80	16.00	1.71	4.55	9.27	15.71	12.94	3.00	6.12	
H12	434.02	0.71	0.80	107.83	1.46	16.84	10.99	4.19	9.89	8.20	8.37	14.00	7.10	4.44	0.00	5.83	4.20	77.74	21.65	11.88	72.03	8.51	14.24	46.91	62.55	43.06	0.84	16.67	1.79	4.66	9.73	16.75	13.36	3.03	6.16	
H13	451.68	0.75	0.83	110.59	1.51	17.33	11.32	4.29	10.11	8.48	8.60	14.39	7.14	4.52	0.00	6.04	4.44	81.41	22.58	12.43	75.38	8.71	14.77	49.41	65.77	45.38	0.89	17.36	1.87	4.78	10.21	17.86	13.80	3.06	6.19	
H14	467.78	0.78	0.86	112.90	1.54	17.75	11.61	4.38	10.29	8.72	8.80	14.72	7.16	4.58	0.00	6.23	4.66	84.77	23.41	12.93	78.44	8.87	15.23	51.74	68.80	47.56	0.93	17.99	1.96	4.87	10.65	18.98	14.19	3.08	6.20	
H15	482.57	0.81	0.88	115.08	1.58	18.14	11.88	4.46	10.46	8.95	8.99	15.04	7.17	4.64	0.00	6.40	4.86	87.86	24.18	13.40	81.25	9.03	15.66	53.87	71.55	49.55	0.97	18.57	2.03	4.97	11.06	19.96	14.55	3.12	6.21	
H16	498.75	0.84	0.91	117.31	1.62	18.55	12.17	4.54	10.61	9.18	9.18	15.36	7.18	4.71	0.00	6.58	5.09	91.27	25.02	13.90	84.38	9.18	16.13	56.26	74.64	51.79	1.01	19.20	2.11	5.05	11.51	21.08	14.93	3.13	6.24	
H17	515.44	0.87	0.94	119.51	1.65	18.97	12.45	4.62	10.76	9.42	9.36	15.67	7.18	4.77	0.00	6.77	5.34	94.81	25.89	14.43	87.63	9.34	16.60	58.77	77.86	54.13	1.06	19.85	2.20	5.14	11.98	22.25	15.32	3.14	6.25	
H18	529.27	0.90	0.97	121.23	1.68	19.31	12.68	4.68	10.88	9.61	9.50	15.92	7.16	4.81	0.00	6.92	5.54	97.77	26.61	14.87	90.34	9.45	16.99	60.88	80.57	56.11	1.10	20.39	2.27	5.21	12.38	23.28	15.63	3.14	6.25	
H19	504.28	/	0.75	117.62	1.57	16.59	13.01	4.48	10.29	8.65	9.88	15.84	7.92	4.31	/	6.49	4.12	94.95	22.37	13.68	73.15	8.24	15.02	47.82	/	55.60	/	/	/	4.90	12.00	23.08	14.37	2.31	5.21	
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

95%信頼上限値・95%信頼下限値は、観察区域死亡数がポアソン分布に従うものと仮定して95%の信頼区間を表示させました。

信頼上限が1より小さければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が良い。
 信頼下限が1より大きければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が悪い。

<< 標準化死亡比(SMR)とその信頼区間について >>

標準化死亡比とは、年齢構成の異なる集団間の死亡傾向を比較する指標であるが、上記の帳表は、2000年の全国を標準集団として標準化死亡比を計算したものである。
 人口規模の小さい観察区域においては、観察区域死亡数が小さいため(1000人以下)偶然変動の影響を受けやすく指標値が大きく変動する。そのためデータを3年移動平均(複数年法)し中央年を表示年とした。
 また、複数の観察区域間で指数値を比較する際、標準化死亡比は基準となる集団との死亡水準比較の指標であり死亡構造を表す指標ではないことも念頭に置いてください。

宝達志水町死亡数（総数）（3年移動平均）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	内臓疾患											糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血			脳内出血	脳梗塞	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	脾	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺							肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍													
H1 1	502	1	1	136	3	26	9	2	22	14	10	19	5	0	1	5	2	71	22	6	75	7	7	60	78	61	1	23	3	10	14	13	24	9	12		
H1 2	494	0	1	144	4	26	7	0	23	16	10	29	5	0	1	4	1	70	24	7	75	10	12	53	74	52	0	17	2	5	14	13	21	7	12		
H1 3	465	1	3	144	3	32	7	3	22	11	12	28	3	1	0	4	4	68	23	5	64	10	11	43	61	42	0	15	1	7	12	9	20	10	16		
H1 4	466	1	2	147	4	28	6	4	27	12	11	32	3	1	0	9	3	51	16	5	64	10	18	36	64	46	0	22	1	12	14	8	23	10	18		
H1 5	512	2	3	151	4	28	9	8	21	11	11	33	2	3	1	10	4	53	14	4	72	7	17	48	70	48	0	23	2	13	15	11	33	10	19		
H1 6	510	2	1	160	5	32	12	5	20	12	9	42	1	3	3	13	2	61	11	7	70	5	20	45	61	42	0	22	2	11	13	11	34	6	16		
H1 7	552	2	1	166	5	31	17	5	21	7	9	38	1	3	5	7	2	90	16	13	75	10	13	50	75	44	0	23	1	9	11	11	33	4	12		
H1 8	536	1	0	160	5	26	16	3	24	3	9	38	2	3	4	8	2	97	19	18	71	11	13	44	73	47	0	25	1	6	12	12	24	4	9		
H1 9	577	/	/	156	5	20	14	4	27	5	12	30	4	2	/	3	2	102	25	20	80	14	15	48	/	54	/	/	/	8	12	16	24	4	11		
H2 0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

宝達志水町期待死亡数（総数）（平成12年全国死亡率を基準）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	内臓疾患											糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血			脳内出血	脳梗塞	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	脾	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺							肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍													
H1 1	470.31	0.62	1.31	140.24	4.70	24.17	11.38	5.72	15.76	7.51	9.12	26.00	3.96	0.00	0.00	5.98	3.15	73.64	22.83	12.15	67.18	6.83	15.07	43.25	69.77	45.38	0.72	18.33	1.92	7.16	8.89	11.24	17.97	5.32	11.88		
H1 2	485.66	0.64	1.35	143.41	4.78	24.74	11.68	5.83	16.02	7.74	9.33	26.63	4.00	0.00	0.00	6.15	3.30	76.45	23.60	12.59	69.81	6.97	15.51	45.24	72.88	47.52	0.76	18.87	1.99	7.26	9.27	11.96	18.36	5.34	11.91		
H1 3	505.74	0.67	1.40	147.29	4.87	25.46	12.06	5.97	16.32	8.02	9.59	27.37	4.04	0.00	0.00	6.36	3.52	80.16	24.59	13.18	73.29	7.13	16.06	47.89	77.04	50.41	0.81	19.57	2.08	7.38	9.79	13.00	18.86	5.36	11.94		
H1 4	526.73	0.71	1.46	151.38	4.98	26.22	12.46	6.12	16.64	8.32	9.86	28.14	4.08	0.00	0.00	6.58	3.75	84.05	25.62	13.79	76.92	7.30	16.63	50.66	81.39	53.43	0.86	20.30	2.17	7.52	10.32	14.09	19.40	5.40	11.98		
H1 5	544.19	0.74	1.50	154.87	5.08	26.87	12.80	6.25	16.92	8.57	10.10	28.79	4.12	0.00	0.00	6.77	3.94	87.27	26.49	14.30	79.94	7.45	17.11	52.95	84.97	55.93	0.90	20.92	2.25	7.64	10.77	14.96	19.84	5.43	12.01		
H1 6	562.21	0.76	1.55	158.27	5.17	27.51	13.14	6.38	17.17	8.82	10.33	29.42	4.15	0.00	0.00	6.96	4.14	90.65	27.38	14.84	83.11	7.59	17.61	55.39	88.77	58.58	0.94	21.56	2.33	7.76	11.24	15.91	20.26	5.43	12.02		
H1 7	578.33	0.79	1.59	161.01	5.23	28.04	13.43	6.48	17.34	9.04	10.51	29.92	4.17	0.00	0.00	7.12	4.33	93.74	28.18	15.32	86.03	7.71	18.04	57.67	92.31	61.08	0.99	22.12	2.41	7.84	11.68	16.84	20.63	5.42	12.00		
H1 8	594.97	0.82	1.63	163.85	5.30	28.58	13.72	6.58	17.55	9.26	10.70	30.44	4.19	0.00	0.00	7.29	4.53	96.94	28.99	15.82	89.01	7.82	18.47	60.01	95.96	63.66	1.03	22.70	2.49	7.93	12.13	17.85	20.99	5.40	11.94		
H1 9	573.95	/	1.25	158.88	5.12	24.85	13.73	6.49	16.03	8.68	11.12	30.56	4.62	0.00	/	6.95	3.52	95.93	25.16	15.66	74.12	7.01	16.99	48.12	/	64.33	/	/	/	7.35	11.94	17.67	19.14	4.01	11.13		
H2 0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

95%信頼上限値・95%信頼下限値は、観察区域死亡数がポアソン分布に従うものと仮定して95%の信頼区間を表示させました。

信頼上限が1より小さければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が良い。

信頼下限が1より大きければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が悪い。

<< 標準化死亡比(SMR)とその信頼区間について >>

標準化死亡比とは、年齢構成の異なる集団間の死亡傾向を比較する指標であるが、上記の帳表は、2000年の全国を標準集団として標準化死亡比を計算したものである。

人口規模の小さい観察区域においては、観察区域死亡数が小さいため(1000人以下)偶然変動の影響を受けやすく指標値が大きく変動する。そのためデータを3年移動平均(複数年法)し中央年を表示年とした。

また、複数の観察区域間で指数値を比較する際、標準化死亡比は基準となる集団との死亡水準比較の指標であり死亡構造を表す指標ではないことも念頭に置いてください。

宝達志水町死亡数(男) (3年移動平均)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	死因										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血			脳内出血	脳梗塞	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	脾	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	くも膜下出血	脳内出血			脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍								
H11	273	0	0	80	3	20	3	1	14	7	5	15	0	0	1	2	1	33	11	1	41	3	3	35	44	35	0	13	0	6	3	4	19	8	6		
H12	275	0	0	80	3	20	3	0	14	5	4	21	0	0	1	2	0	39	14	2	41	4	5	32	47	32	0	9	0	2	5	5	11	4	8		
H13	249	1	1	78	2	19	3	2	13	4	6	21	0	0	0	2	2	36	12	1	30	4	4	22	40	28	0	8	0	3	5	4	10	6	10		
H14	236	1	1	75	1	13	2	2	18	2	7	22	0	0	0	4	2	27	9	2	29	4	8	17	41	31	0	11	1	6	5	5	8	5	11		
H15	254	2	2	79	2	14	2	3	13	1	7	26	0	0	1	3	2	26	8	3	34	3	8	23	40	30	0	11	2	6	4	4	19	7	12		
H16	253	2	1	84	3	18	4	1	13	0	5	29	0	0	3	4	0	30	6	5	32	2	12	18	37	29	0	10	2	6	3	4	20	4	11		
H17	283	2	1	95	5	20	7	1	13	0	6	26	0	0	5	2	0	41	9	7	33	4	8	20	42	26	0	14	1	6	2	4	19	3	9		
H18	268	1	0	93	5	16	9	2	15	1	5	24	0	0	4	2	0	37	9	7	34	4	8	20	43	28	0	14	0	5	3	4	12	1	5		
H19	289	/	/	94	5	14	9	2	16	2	5	24	0	0	/	0	0	36	10	6	40	5	9	24	/	/	/	/	/	6	3	6	12	1	6		
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

宝達志水町期待死亡数(男) (平成12年全国死亡率を基準)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	死因										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血			脳内出血	脳梗塞	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	脾	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	くも膜下出血	脳内出血			脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍								
H11	243.86	0.25	0.89	81.89	3.83	15.03	5.58	3.43	10.35	3.27	4.70	18.29	0.04	0.00	3.73	2.94	1.06	33.93	11.67	6.06	30.41	2.35	7.65	19.60	37.75	23.45	0.30	9.68	1.01	4.62	3.94	3.04	10.74	3.55	8.16		
H12	250.38	0.26	0.91	83.57	3.89	15.35	5.71	3.49	10.48	3.35	4.79	18.70	0.04	0.00	3.86	3.00	1.10	34.95	11.97	6.23	31.40	2.37	7.82	20.37	39.27	24.47	0.31	9.88	1.03	4.67	4.09	3.24	10.91	3.56	8.16		
H13	258.39	0.27	0.94	85.54	3.96	15.73	5.86	3.56	10.65	3.45	4.89	19.16	0.04	0.00	4.01	3.07	1.16	36.21	12.35	6.45	32.61	2.40	8.01	21.32	41.19	25.75	0.33	10.12	1.07	4.72	4.28	3.51	11.12	3.57	8.17		
H14	267.60	0.28	0.98	87.98	4.05	16.20	6.04	3.65	10.86	3.56	5.02	19.73	0.04	0.00	4.19	3.16	1.22	37.63	12.78	6.70	33.98	2.44	8.25	22.38	43.29	27.14	0.35	10.40	1.10	4.79	4.49	3.78	11.39	3.60	8.21		
H15	276.01	0.29	1.01	90.21	4.15	16.63	6.21	3.74	11.07	3.67	5.14	20.23	0.04	0.00	4.36	3.24	1.28	38.93	13.17	6.93	35.22	2.47	8.47	23.34	45.19	28.42	0.37	10.66	1.14	4.87	4.68	4.03	11.63	3.62	8.25		
H16	283.95	0.30	1.04	92.29	4.23	17.04	6.37	3.82	11.25	3.77	5.25	20.71	0.04	0.00	4.52	3.32	1.33	40.16	13.54	7.14	36.42	2.50	8.67	24.27	47.04	29.65	0.38	10.91	1.17	4.93	4.86	4.27	11.81	3.61	8.26		
H17	290.13	0.31	1.06	93.58	4.27	17.30	6.48	3.87	11.35	3.83	5.31	20.98	0.04	0.00	4.65	3.37	1.39	41.18	13.82	7.32	37.41	2.51	8.81	25.08	48.70	30.80	0.40	11.09	1.19	4.96	5.02	4.55	11.93	3.57	8.21		
H18	295.84	0.32	1.08	94.98	4.32	17.58	6.59	3.92	11.48	3.90	5.38	21.29	0.05	0.00	4.76	3.42	1.43	42.11	14.08	7.48	38.30	2.53	8.95	25.80	50.16	31.80	0.41	11.25	1.22	4.99	5.17	4.77	12.03	3.54	8.13		
H19	284.54	/	0.81	90.92	4.15	15.20	6.32	3.91	10.16	3.80	5.53	21.12	0.04	0.00	/	3.27	1.16	41.87	12.43	7.87	32.41	2.37	8.44	20.75	/	/	/	/	/	4.56	5.11	4.42	10.80	2.63	7.81		
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

95%信頼上限値・95%信頼下限値は、観察区域死亡数がポアソン分布に従うものと仮定して95%の信頼区間を表示させました。

信頼上限が1より小さければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が良い。

信頼下限が1より大きければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が悪い。

<< 標準化死亡比(SMR)とその信頼区間について >>

標準化死亡比とは、年齢構成の異なる集団間の死亡傾向を比較する指標であるが、上記の帳表は、2000年の全国を標準集団として標準化死亡比を計算したものである。

人口規模の小さい観察区域においては、観察区域死亡数が小さいため(1000人以下)偶然変動の影響を受けやすく指標値が大きく変動する。そのためデータを3年移動平均(複数年法)し中央年を表示年とした。

また、複数の観察区域間で指数値を比較する際、標準化死亡比は基準となる集団との死亡水準比較の指標であり死亡構造を表す指標ではないことも念頭に置いてください。

宝達志水町(女)

年		死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	その他の原因別											糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血			脳内出血			脳梗塞	呼吸器系の疾患		肺炎	急性気管支炎		消化器系の疾患		胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
						食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	脾	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺							胃	膵	十二指腸	小腸	大腸	胆嚢		膵臓	急性		慢性	急性	慢性								
H 1 1	SMR	%	102.61	276.26	246.47	98.36	-	67.91	104.57	45.05	154.30	165.52	114.50	54.66	125.25	-	99.99	47.76	96.60	99.98	83.17	93.17	88.70	54.58	106.59	108.20	120.67	237.58	117.25	332.65	162.66	224.41	109.28	70.76	58.43	165.89							
	95%信頼上限		0.39	5.98	5.34	0.43	-	0.52	0.80	0.98	1.06	1.19	0.95	0.50	1.04	-	1.06	1.03	0.45	0.62	0.69	0.44	0.81	0.50	0.53	0.51	0.60	5.14	0.74	3.53	1.49	1.38	0.72	0.59	1.27	1.27							
	95%信頼下限		0.39	4.41	3.93	0.42	-	0.47	0.72	0.72	0.97	1.09	0.84	0.44	0.92	-	0.90	0.76	0.44	0.58	0.61	0.43	0.71	0.43	0.52	0.50	0.58	3.79	0.69	2.98	1.30	1.30	0.67	0.52	0.93	1.14							
H 1 2	SMR	%	94.41	-	236.72	109.53	126.89	65.99	67.65	-	169.48	251.52	133.60	106.23	124.19	-	64.33	45.34	75.38	87.22	79.59	89.16	129.96	92.10	85.17	81.87	88.28	-	90.17	211.89	118.97	175.27	91.49	137.21	173.44	109.76							
	95%信頼上限		0.36	-	5.13	0.47	2.75	0.50	0.62	-	1.11	1.55	1.02	0.73	1.03	-	0.86	0.98	0.36	0.55	0.66	0.42	0.99	0.66	0.44	0.40	0.46	-	0.62	2.85	1.26	1.15	0.63	0.87	1.84	1.01							
	95%信頼下限		0.36	-	3.78	0.46	2.03	0.45	0.54	-	1.03	1.45	0.92	0.67	0.91	-	0.70	0.72	0.35	0.52	0.58	0.41	0.89	0.60	0.43	0.39	0.45	-	0.57	2.29	1.07	1.07	0.58	0.81	1.55	0.87							
H 1 3	SMR	%	88.54	-	450.37	109.42	122.39	137.90	65.16	42.64	164.82	153.61	129.13	89.80	73.80	39.76	61.57	84.53	73.43	91.06	60.15	84.20	126.15	88.03	79.74	59.73	57.79	-	74.95	99.75	153.85	128.28	52.55	131.88	228.37	163.13							
	95%信頼上限		0.34	-	6.05	0.47	2.65	0.81	0.60	0.92	1.08	1.11	0.99	0.65	0.78	0.86	0.83	1.14	0.35	0.56	0.55	0.40	0.97	0.63	0.41	0.31	0.33	-	0.54	2.16	1.41	0.92	0.43	0.84	2.09	1.25							
	95%信頼下限		0.34	-	4.88	0.46	1.95	0.76	0.52	0.68	1.00	1.01	0.89	0.59	0.66	0.63	0.67	0.92	0.34	0.53	0.48	0.39	0.87	0.58	0.40	0.30	0.31	-	0.49	1.59	1.23	0.84	0.39	0.78	1.82	1.12							
H 1 4	SMR	%	89.78	-	214.80	115.83	354.70	153.74	62.88	82.87	160.63	210.99	83.35	124.19	73.25	38.90	147.63	39.45	52.05	55.10	42.68	81.99	122.78	120.45	67.66	61.46	58.00	-	112.05	-	224.18	155.46	29.00	190.38	281.99	189.05							
	95%信頼上限		0.34	-	4.65	0.49	3.77	0.87	0.58	1.11	1.06	1.34	0.76	0.79	0.78	0.84	1.22	0.85	0.26	0.40	0.45	0.38	0.94	0.77	0.36	0.31	0.33	-	0.69	-	1.72	1.02	0.31	1.07	2.33	1.36							
	95%信頼下限		0.34	-	3.43	0.48	3.18	0.82	0.50	0.90	0.98	1.25	0.66	0.74	0.66	0.62	1.08	0.63	0.25	0.36	0.38	0.38	0.85	0.71	0.35	0.30	0.31	-	0.65	-	1.54	0.95	0.26	1.02	2.07	1.24							
H 1 5	SMR	%	97.08	-	207.19	113.13	229.89	139.69	107.01	202.52	139.98	204.59	81.23	84.72	48.56	114.60	199.97	75.04	56.14	45.43	13.65	85.38	80.08	104.83	84.89	76.55	66.34	-	117.73	-	255.66	181.81	63.86	172.51	167.42	188.27							
	95%信頼上限		0.37	-	4.49	0.48	3.09	0.80	0.77	1.67	0.96	1.30	0.74	0.61	0.65	1.22	1.44	1.01	0.28	0.35	0.30	0.39	0.73	0.69	0.42	0.37	0.36	-	0.71	-	1.84	1.12	0.46	0.99	1.78	1.36							
	95%信頼下限		0.36	-	3.31	0.47	2.49	0.76	0.70	1.49	0.88	1.21	0.65	0.56	0.53	1.03	1.31	0.81	0.27	0.31	0.22	0.39	0.64	0.64	0.41	0.36	0.34	-	0.67	-	1.68	1.05	0.42	0.94	1.50	1.23							
H 1 6	SMR	%	93.02	-	-	116.57	223.31	135.85	118.83	158.29	120.24	237.90	79.16	153.26	24.12	112.49	248.49	71.11	61.64	36.36	26.13	81.67	58.75	89.98	87.15	58.31	45.52	-	113.15	-	178.51	157.71	59.97	167.37	110.77	133.89							
	95%信頼上限		0.35	-	-	0.49	3.00	0.78	0.81	1.45	0.87	1.43	0.73	0.90	0.52	1.19	1.63	0.96	0.30	0.30	0.35	0.38	0.62	0.62	0.43	0.29	0.27	-	0.68	-	1.48	1.00	0.43	0.96	1.49	1.11							
	95%信頼下限		0.35	-	-	0.48	2.42	0.74	0.75	1.26	0.79	1.34	0.63	0.85	0.39	1.01	1.51	0.77	0.29	0.27	0.28	0.37	0.53	0.57	0.42	0.28	0.25	-	0.64	-	1.31	0.93	0.39	0.91	1.20	0.98							
H 1 7	SMR	%	94.00	-	-	106.53	-	104.05	144.72	155.08	135.11	134.80	57.98	138.10	24.00	110.62	133.78	67.82	93.58	49.05	75.35	86.73	115.12	54.46	92.54	76.73	60.21	-	81.87	-	104.90	136.09	56.82	162.73	54.95	79.95							
	95%信頼上限		0.35	-	-	0.45	-	0.64	0.92	1.42	0.93	0.97	0.62	0.83	0.52	1.18	1.11	0.91	0.42	0.35	0.58	0.39	0.88	0.45	0.45	0.36	0.32	-	0.54	-	1.11	0.90	0.41	0.93	1.19	0.85							
	95%信頼下限		0.35	-	-	0.45	-	0.60	0.86	1.24	0.85	0.88	0.52	0.78	0.38	0.99	0.98	0.73	0.41	0.32	0.52	0.39	0.79	0.40	0.43	0.35	0.31	-	0.50	-	0.94	0.83	0.37	0.89	0.88	0.72							
H 1 8	SMR	%	90.24	-	-	98.34	-	92.18	98.67	37.97	149.34	37.40	75.49	157.33	47.84	108.94	155.62	64.39	109.80	67.46	132.48	73.27	131.72	52.73	70.55	66.54	60.50	-	96.35	78.87	34.24	130.15	61.02	135.51	163.78	106.30							
	95%信頼上限		0.34	-	-	0.42	-	0.59	0.71	0.82	0.98	0.50	0.69	0.90	0.64	1.16	1.19	0.87	0.47	0.43	0.82	0.34	0.95	0.44	0.36	0.32	0.32	-	0.59	1.71	0.74	0.86	0.42	0.81	1.74	0.97							
	95%信頼下限		0.34	-	-	0.41	-	0.55	0.65	0.61	0.91	0.40	0.60	0.86	0.52	0.98	1.07	0.70	0.47	0.40	0.77	0.33	0.86	0.39	0.34	0.31	0.31	-	0.56	1.26	0.55	0.79	0.38	0.77	1.47	0.85							
H 1 9	SMR	%	100.84	/	/	93.34	-	64.00	68.16	79.12	192.74	61.95	126.47	67.49	86.41	80.41	82.34	85.49	123.03	119.27	181.76	96.80	193.51	70.99	88.72	/	85.67	/	/	/	72.38	132.81	75.64	146.46	222.34	154.19							
	95%信頼上限		1.12	/	/	1.17	-	1.15	1.28	1.89	3.07	1.32	2.20	1.22	1.71	1.92	1.76	2.04	1.53	1.80	2.77	1.27	3.20	1.28	1.24	/	1.18	/	/	/	1.73	2.20	1.23	2.29	4.74	2.89							
	95%信頼下限		0.89	/	/	0.70	-	0.13	0.08	-0.31	0.79	-0.08	0.33	0.13	0.02	-0.31	-0.11	-0.33	0.93	0.59	0.87	0.67	0.67	0.14	0.53	/	0.53	/	/	/	-0.28	0.46	0.29	0.64	-0.29	0.19							
H 2 0	SMR	%	99.73	/	/	104.10	-	73.55	80.49	78.19	156.03	142.02	213.93	66.57	108.26	80.06	107.79	124.50	92.75	101.11	165.02	94.49	148.86	81.32	93.44	/	61.66	/	/	/	71.56	100.62	146.05	96.06	147.73	248.26							
	95%信頼上限		1.11	/	/	1.28	-	1.28	1.45	1.87	2.58	2.47	3.35	1.20	2.03	1.91	2.13	2.65	1.18	1.56	2.55	1.24	2.59	1.42	1.29	/	0.89	/	/	/	1.71	1.75	2.10	1.63	3.52	4.20							
	95%信頼下限		0.88	/	/	0.80	-	0.19	0.16	-0.30	0.54	0.37	0.93	0.13	0.13	-0.31	0.02	-0.16	0.67	0.46	0.75	0.65	0.39	0.21	0.58	/	0.35	/	/	/	-0.28	0.26	0.82	0.29	-0.57	0.76							

宝達志水町死亡数（女）（3年移動平均）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	原因別										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血			脳内出血	脳梗塞	呼吸器系の疾患		肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患		胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	脾	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	くも膜下出血	脳内出血			脳梗塞	肺炎			急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍							
H1 1	229	1	1	56	0	6	6	1	8	7	5	4	5	0	0	3	1	38	11	5	34	4	4	25	34	26	1	10	3	4	11	9	5	1	6			
H1 2	219	0	1	64	1	6	4	0	9	11	6	8	5	0	0	2	1	31	10	5	34	6	7	21	27	20	0	8	2	3	9	8	10	3	4			
H1 3	216	0	2	66	1	13	4	1	9	7	6	7	3	1	0	2	2	32	11	4	34	6	7	21	21	14	0	7	1	4	7	5	10	4	6			
H1 4	230	0	1	72	3	15	4	2	9	10	4	10	3	1	0	5	1	24	7	3	35	6	10	19	23	15	0	11	0	6	9	3	15	5	7			
H1 5	258	0	1	72	2	14	7	5	8	10	4	7	2	3	0	7	2	27	6	1	38	4	9	25	30	18	0	12	0	7	11	7	14	3	7			
H1 6	257	0	0	76	2	14	8	4	7	12	4	13	1	3	0	9	2	31	5	2	38	3	8	27	24	13	0	12	0	5	10	7	14	2	5			
H1 7	269	0	0	71	0	11	10	4	8	7	3	12	1	3	0	5	2	49	7	6	42	6	5	30	33	18	0	9	0	3	9	7	14	1	3			
H1 8	268	0	0	67	0	10	7	1	9	2	4	14	2	3	0	6	2	60	10	11	37	7	5	24	30	19	0	11	1	1	9	8	12	3	4			
H1 9	288	/	0	62	0	6	5	2	11	3	7	6	4	2	/	3	2	66	15	14	40	9	6	24	/	27	/	/	/	2	9	10	12	3	5			
H2 0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

宝達志水町期待死亡数（女）（平成12年全国死亡率を基準）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	原因別										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患 (高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血			脳内出血	脳梗塞	呼吸器系の疾患		肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患		胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	脾	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	くも膜下出血	脳内出血			脳梗塞	肺炎			急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍							
H1 1	223.18	0.36	0.41	56.93	0.77	8.83	5.74	2.22	5.18	4.23	4.37	7.32	3.99	2.41	0.00	3.00	2.09	39.34	11.00	6.01	36.49	4.51	7.33	23.45	31.42	21.55	0.42	8.53	0.90	2.46	4.90	8.24	7.07	1.71	3.62			
H1 2	231.98	0.38	0.42	58.43	0.79	9.09	5.91	2.27	5.31	4.37	4.49	7.53	4.03	2.46	0.00	3.11	2.21	41.13	11.46	6.28	38.13	4.62	7.60	24.66	32.98	22.66	0.44	8.87	0.94	2.52	5.13	8.74	7.29	1.73	3.64			
H1 3	243.96	0.40	0.44	60.32	0.82	9.43	6.14	2.35	5.46	4.56	4.65	7.79	4.07	2.51	0.00	3.25	2.37	43.58	12.08	6.65	40.38	4.76	7.95	26.34	35.16	24.22	0.47	9.34	1.00	2.60	5.46	9.51	7.58	1.75	3.68			
H1 4	256.18	0.42	0.47	62.16	0.85	9.76	6.36	2.41	5.60	4.74	4.80	8.05	4.10	2.57	0.00	3.39	2.54	46.11	12.71	7.03	42.69	4.89	8.30	28.08	37.42	25.86	0.51	9.82	1.06	2.68	5.79	10.34	7.88	1.77	3.70			
H1 5	265.77	0.44	0.48	63.65	0.87	10.02	6.54	2.47	5.72	4.89	4.92	8.26	4.12	2.62	0.00	3.50	2.67	48.09	13.21	7.33	44.51	5.00	8.59	29.45	39.19	27.13	0.53	10.19	1.11	2.74	6.05	10.96	8.12	1.79	3.72			
H1 6	276.29	0.46	0.50	65.20	0.90	10.31	6.73	2.53	5.82	5.04	5.05	8.48	4.15	2.67	0.00	3.62	2.81	50.29	13.75	7.65	46.53	5.11	8.89	30.98	41.16	28.56	0.56	10.61	1.16	2.80	6.34	11.67	8.36	1.81	3.73			
H1 7	286.16	0.48	0.52	66.65	0.92	10.57	6.91	2.58	5.92	5.19	5.17	8.69	4.17	2.71	0.00	3.74	2.95	52.36	14.27	7.96	48.42	5.21	9.18	32.42	43.01	29.90	0.59	10.99	1.21	2.86	6.61	12.32	8.60	1.82	3.75			
H1 8	296.98	0.50	0.54	68.13	0.94	10.85	7.09	2.63	6.03	5.35	5.30	8.90	4.18	2.75	0.00	3.86	3.11	54.65	14.82	8.30	50.50	5.31	9.48	34.02	45.08	31.40	0.62	11.42	1.27	2.92	6.92	13.11	8.86	1.83	3.76			
H1 9	285.61	/	0.42	66.42	0.88	9.38	7.34	2.53	5.71	4.84	5.53	8.89	4.63	2.49	/	3.64	2.34	53.64	12.58	7.70	41.32	4.65	8.45	27.05	/	31.52	/	/	/	2.76	6.78	13.22	8.19	1.35	3.24			
H2 0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

95%信頼上限値・95%信頼下限値は、観察区域死亡数がポアソン分布に従うものと仮定して95%の信頼区間を表示させました。
 信頼上限が1より小さければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が良い。
 信頼下限が1より大きければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が悪い。

<< 標準化死亡比(SMR)とその信頼区間について >>

標準化死亡比とは、年齢構成の異なる集団間の死亡傾向を比較する指標であるが、上記の帳表は、2000年の全国を標準集団として標準化死亡比を計算したものである。
 人口規模の小さい観察区域においては、観察区域死亡数が小さいため(1000人以下)偶然変動の影響を受けやすく指標値が大きく変動する。そのためデータを3年移動平均(複数年法)し中央年を表示年とした。
 また、複数の観察区域間で指数値を比較する際、標準化死亡比は基準となる集団との死亡水準比較の指標であり死亡構造を表す指標ではないことも念頭に置いてください。

4) 標準化死亡率 (SMR) (3年移動平均)

◎ 平成12年全国の性別年齢階級(18)別死因简单分類(130)死亡率(人口10万対)を標準集団死亡率とし観察区域期待死亡数を算出

資料：衛生統計年報

中能登町(総数) 注) 値は旧鳥屋町、旧鹿島町、旧鹿西町を合計したものの

年	SMR	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	食道	胃	結腸	直腸等	肝及び胆内臓	胆のう等	脾	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	呼吸器系の疾患	肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	
H1 1	SMR	%	106.51	133.02	122.51	108.81	49.74	134.43	104.74	68.81	98.76	170.03	155.93	115.46	59.79	-	-	186.62	184.90	100.57	98.81	93.42	144.24	116.03	116.79	155.97	87.16	87.35	115.94	65.71	126.73	32.93	64.57	68.60	140.10	230.60	68.04
	95% 信頼上限		0.38	2.88	1.65	0.42	0.53	0.61	0.59	0.57	0.52	0.94	0.84	0.53	0.64	-	-	1.07	1.33	0.41	0.48	0.54	0.58	0.74	0.60	0.65	0.37	0.39	2.51	0.37	1.35	0.35	0.46	0.45	0.67	1.30	0.43
	95% 信頼下限		0.38	2.12	1.33	0.42	0.45	0.60	0.56	0.50	0.50	0.90	0.80	0.52	0.54	-	-	1.02	1.21	0.41	0.47	0.51	0.57	0.69	0.58	0.64	0.36	0.38	1.85	0.35	1.14	0.30	0.42	0.42	0.65	1.24	0.40
H1 2	SMR	%	99.19	127.99	118.75	104.17	48.93	115.25	115.64	80.96	97.13	144.44	160.84	109.70	78.98	-	-	129.70	176.30	92.68	85.38	77.29	120.21	68.28	98.07	134.66	88.01	92.18	110.49	97.98	81.62	86.62	44.24	71.76	145.95	214.10	67.77
	95% 信頼上限		0.36	2.77	1.60	0.40	0.52	0.54	0.63	0.62	0.51	0.83	0.85	0.51	0.72	-	-	0.82	1.27	0.38	0.43	0.46	0.49	0.52	0.52	0.57	0.37	0.41	2.39	0.50	1.10	0.59	0.37	0.46	0.69	1.23	0.43
	95% 信頼下限		0.36	2.04	1.29	0.40	0.44	0.53	0.60	0.56	0.49	0.79	0.82	0.50	0.63	-	-	0.77	1.16	0.38	0.41	0.44	0.48	0.47	0.50	0.56	0.36	0.40	1.76	0.48	0.88	0.55	0.32	0.42	0.67	1.17	0.40
H1 3	SMR	%	98.33	-	172.67	102.30	80.11	99.96	112.60	92.52	100.15	100.11	123.98	133.04	78.27	-	-	176.56	192.34	99.63	115.67	74.60	111.29	78.09	60.21	130.68	84.36	91.51	105.44	95.24	78.85	117.36	67.94	74.50	138.40	91.18	53.98
	95% 信頼上限		0.36	-	1.83	0.39	0.66	0.48	0.61	0.67	0.52	0.64	0.70	0.60	0.72	-	-	1.01	1.32	0.41	0.54	0.45	0.45	0.56	0.36	0.55	0.35	0.40	2.28	0.48	1.06	0.72	0.47	0.46	0.66	0.70	0.37
	95% 信頼下限		0.35	-	1.55	0.39	0.59	0.46	0.59	0.61	0.50	0.59	0.66	0.59	0.62	-	-	0.96	1.21	0.40	0.53	0.42	0.45	0.51	0.34	0.54	0.35	0.39	1.68	0.47	0.85	0.68	0.43	0.43	0.64	0.63	0.34
H1 4	SMR	%	96.04	-	167.51	97.30	125.75	109.73	96.73	129.43	102.99	136.03	80.67	87.46	116.38	-	-	233.04	183.66	92.12	111.98	66.03	108.34	98.42	68.31	118.56	81.96	84.41	-	100.62	76.19	126.08	106.02	57.46	152.13	60.22	60.56
	95% 信頼上限		0.35	-	1.78	0.38	0.86	0.51	0.55	0.82	0.53	0.78	0.51	0.42	0.89	-	-	1.24	1.26	0.38	0.53	0.41	0.44	0.65	0.39	0.50	0.34	0.37	-	0.50	1.02	0.76	0.62	0.38	0.71	0.55	0.40
	95% 信頼下限		0.35	-	1.50	0.37	0.79	0.50	0.52	0.77	0.51	0.74	0.48	0.41	0.80	-	-	1.19	1.16	0.37	0.51	0.38	0.44	0.60	0.37	0.50	0.34	0.36	-	0.49	0.82	0.71	0.59	0.35	0.69	0.48	0.37
H1 5	SMR	%	99.55	115.60	109.14	97.59	108.19	116.64	94.77	152.72	78.42	113.93	94.92	99.57	115.66	-	-	324.10	178.51	111.09	103.12	87.86	103.49	118.41	76.46	107.09	87.76	85.10	-	82.81	74.42	103.73	95.24	55.63	124.60	29.84	53.69
	95% 信頼上限		0.36	2.50	1.47	0.38	0.78	0.54	0.53	0.92	0.43	0.68	0.57	0.46	0.89	-	-	1.60	1.22	0.45	0.49	0.50	0.42	0.73	0.42	0.46	0.36	0.37	-	0.43	1.00	0.66	0.57	0.37	0.60	0.40	0.37
	95% 信頼下限		0.36	1.85	1.18	0.37	0.71	0.53	0.51	0.86	0.41	0.64	0.54	0.45	0.80	-	-	1.55	1.12	0.44	0.48	0.47	0.42	0.68	0.40	0.45	0.36	0.37	-	0.41	0.81	0.61	0.54	0.34	0.58	0.32	0.34
H1 6	SMR	%	93.32	110.31	52.71	98.24	91.00	142.71	85.88	124.47	49.92	137.76	107.95	83.66	133.54	-	-	290.81	210.00	108.07	81.20	112.25	75.68	73.70	83.28	73.84	80.44	71.72	-	79.98	35.67	71.38	90.53	57.00	109.16	59.27	66.72
	95% 信頼上限		0.34	2.39	1.14	0.38	0.70	0.63	0.49	0.79	0.31	0.78	0.62	0.40	0.96	-	-	1.45	1.33	0.43	0.40	0.59	0.32	0.53	0.45	0.33	0.33	0.32	-	0.42	0.77	0.51	0.54	0.36	0.54	0.54	0.42
	95% 信頼下限		0.34	1.76	0.84	0.38	0.63	0.62	0.47	0.74	0.29	0.74	0.59	0.39	0.88	-	-	1.41	1.24	0.43	0.39	0.57	0.31	0.48	0.43	0.32	0.33	0.31	-	0.40	0.57	0.47	0.51	0.34	0.52	0.47	0.39
H1 7	SMR	%	88.01	104.89	-	88.32	59.56	141.53	53.49	109.49	53.56	97.44	112.56	76.17	75.51	-	-	224.89	197.09	110.05	77.90	101.86	69.18	51.41	93.80	63.93	76.08	62.08	-	73.41	-	80.22	71.46	84.06	90.28	102.84	66.37
	95% 信頼上限		0.32	2.27	-	0.34	0.55	0.63	0.35	0.72	0.32	0.60	0.63	0.37	0.69	-	-	1.18	1.25	0.44	0.38	0.54	0.29	0.43	0.49	0.29	0.32	0.28	-	0.39	-	0.55	0.45	0.47	0.46	0.74	0.42
	95% 信頼下限		0.32	1.67	-	0.34	0.47	0.62	0.33	0.67	0.30	0.56	0.60	0.36	0.60	-	-	1.14	1.17	0.44	0.37	0.52	0.29	0.38	0.47	0.28	0.31	0.27	-	0.37	-	0.51	0.42	0.44	0.44	0.67	0.39
H1 8	SMR	%	86.22	198.59	48.71	92.10	58.46	134.57	80.46	118.75	48.20	110.86	94.85	81.73	56.08	-	-	130.16	183.81	93.61	80.04	91.84	71.99	70.23	86.06	68.29	74.19	62.10	-	70.54	-	68.99	67.38	96.05	114.12	116.72	59.58
	95% 信頼上限		0.31	2.67	1.05	0.35	0.54	0.60	0.46	0.75	0.30	0.65	0.56	0.39	0.60	-	-	0.78	1.17	0.38	0.39	0.49	0.30	0.51	0.45	0.30	0.31	0.28	-	0.37	-	0.50	0.43	0.50	0.55	0.80	0.39
	95% 信頼下限		0.31	2.15	0.78	0.35	0.47	0.59	0.44	0.70	0.28	0.61	0.53	0.38	0.50	-	-	0.74	1.09	0.37	0.38	0.47	0.30	0.46	0.43	0.30	0.30	0.27	-	0.36	-	0.45	0.40	0.48	0.54	0.74	0.36
H1 9	SMR	%	90.92	/	127.34	94.49	60.08	109.95	91.54	155.54	57.23	144.93	111.75	83.54	50.80	-	/	79.23	140.36	93.18	88.50	61.11	98.82	133.92	111.47	89.67	/	62.30	/	/	/	95.07	88.44	96.35	107.72	117.15	63.76
	95% 信頼上限		0.98	/	3.04	1.08	1.19	1.46	1.36	2.40	0.90	2.16	1.67	1.12	1.08	-	/	1.38	2.53	1.11	1.21	0.96	1.19	2.10	1.56	1.14	/	0.80	/	/	/	1.57	1.37	1.39	1.49	2.11	1.05
	95% 信頼下限		0.84	/	-0.49	0.81	0.01	0.74	0.47	0.71	0.25	0.74	0.57	0.55	-0.07	-	/	0.21	0.28	0.76	0.56	0.27	0.79	0.58	0.67	/	0.45	/	/	/	0.33	0.40	0.54	0.66	0.23	0.22	
H2 0	SMR	%	93.80	/	124.08	102.95	59.23	86.31	112.02	141.33	70.63	159.17	96.06	109.43	101.19	-	/	99.67	90.30	93.78	77.02	89.30	107.57	153.88	113.63	101.37	/	65.06	/	/	/	104.47	79.00	83.00	113.86	58.24	56.99
	95% 信頼上限		1.01	/	2.96	1.17	1.17	1.18	1.61	2.21	1.06	2.33	1.46	1.42	1.82	-	/	1.65	1.79	1.11	1.07	1.31	1.28	2.34	1.58	1.27	/	0.83	/	/	/	1.69	1.24	1.21	1.56	1.24	0.96
	95% 信頼下限		0.87	/	-0.48	0.89	0.01	0.54	0.63	0.61	0.35	0.86	0.46	0.77	0.20	-	/	0.35	0.02	0.77	0.47	0.48	0.87	0.73	0.69	/	0.48	/	/	/	0.40	0.34	0.45	0.72	-0.08	0.17	

中能登町死亡数（総数）（3年移動平均）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	原因別										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺						
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故												
H11	620	1	2	193	3	41	15	5	20	16	18	38	3	0	5	14	7	91	28	14	119	10	22	82	74	48	1	15	3	3	7	9	31	15	10		
H12	596	1	2	189	3	36	17	6	20	14	19	37	4	0	3	10	7	87	25	12	103	6	19	74	78	53	1	23	2	8	5	10	33	14	10		
H13	610	0	3	190	5	32	17	7	21	10	15	46	4	1	4	14	8	97	35	12	99	7	12	75	78	55	1	23	2	11	8	11	32	6	8		
H14	615	0	3	185	8	36	15	10	22	14	10	31	6	3	2	19	8	93	35	11	100	9	14	71	79	53	0	25	2	12	13	9	36	4	9		
H15	652	1	2	189	7	39	15	12	17	12	12	36	6	3	3	27	8	115	33	15	98	11	16	66	87	55	0	21	2	10	12	9	30	2	8		
H16	635	1	1	195	6	49	14	10	11	15	14	31	7	3	5	25	10	117	27	20	75	7	18	48	84	49	0	21	1	7	12	10	27	4	10		
H17	624	1	0	180	4	50	9	9	12	11	15	29	4	1	6	20	10	125	27	19	72	5	21	44	84	45	0	20	0	8	10	16	23	7	10		
H18	639	2	1	193	4	49	14	10	11	13	13	32	3	2	7	12	10	112	29	18	79	7	20	50	87	48	0	20	0	7	10	20	30	8	9		
H19	654	/	2	193	4	35	16	13	12	16	16	33	3	2	/	7	6	111	28	12	91	12	24	53	/	49	/	/	9	13	20	26	6	9			
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

中能登町期待死亡数（総数）（平成12年の全国死亡率を基準）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	原因別										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺						
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故												
H11	582.11	0.75	1.63	177.37	6.03	30.50	14.32	7.27	20.25	9.41	11.54	32.91	5.02	0.00	0.00	7.50	3.79	90.48	28.34	14.99	82.50	8.62	18.84	52.57	84.90	54.95	0.86	22.83	2.37	9.11	10.84	13.12	22.13	6.50	14.70		
H12	600.87	0.78	1.68	181.43	6.13	31.24	14.70	7.41	20.59	9.69	11.81	33.73	5.06	0.00	0.00	7.71	3.97	93.87	29.28	15.53	85.68	8.79	19.37	54.95	88.63	57.50	0.91	23.47	2.45	9.24	11.30	13.94	22.61	6.54	14.76		
H13	620.33	0.81	1.74	185.72	6.24	32.01	15.10	7.57	20.97	9.99	12.10	34.58	5.11	0.00	0.00	7.93	4.16	97.36	30.26	16.09	88.96	8.96	19.93	57.39	92.46	60.11	0.95	24.15	2.54	9.37	11.78	14.76	23.12	6.58	14.82		
H14	640.36	0.84	1.79	190.14	6.36	32.81	15.51	7.73	21.36	10.29	12.40	35.44	5.16	0.00	0.00	8.15	4.36	100.96	31.26	16.66	92.30	9.14	20.49	59.89	96.39	62.79	0.99	24.85	2.63	9.52	12.26	15.66	23.66	6.64	14.86		
H15	654.95	0.87	1.83	193.67	6.47	33.44	15.83	7.86	21.68	10.53	12.64	36.15	5.19	0.00	0.00	8.33	4.48	103.52	32.00	17.07	94.69	9.29	20.93	61.63	99.13	64.63	1.02	25.36	2.69	9.64	12.60	16.18	24.08	6.70	14.90		
H16	680.45	0.91	1.90	198.49	6.59	34.34	16.30	8.03	22.03	10.89	12.97	37.06	5.24	0.00	0.00	8.60	4.76	108.26	33.25	17.82	99.10	9.50	21.61	65.00	104.42	68.32	1.09	26.26	2.80	9.81	13.26	17.54	24.73	6.75	14.99		
H17	708.97	0.95	1.97	203.81	6.72	35.33	16.83	8.22	22.41	11.29	13.33	38.07	5.30	0.00	0.00	8.89	5.07	113.58	34.66	18.65	104.08	9.73	22.39	68.83	110.40	72.49	1.16	27.24	2.93	9.97	13.99	19.03	25.48	6.81	15.07		
H18	741.13	1.01	2.05	209.56	6.84	36.41	17.40	8.42	22.82	11.73	13.71	39.15	5.35	0.00	0.00	9.22	5.44	119.64	36.23	19.60	109.74	9.97	23.24	73.21	117.27	77.29	1.24	28.35	3.08	10.15	14.84	20.82	26.29	6.85	15.11		
H19	719.33	/	1.57	204.25	6.66	31.83	17.48	8.36	20.97	11.04	14.32	39.50	5.91	0.00	/	8.84	4.27	119.12	31.64	19.64	92.09	8.96	21.53	59.11	/	78.65	/	/	9.47	14.70	20.76	24.14	5.12	14.12			
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

95%信頼上限値・95%信頼下限値は、観察区域死亡数がポアソン分布に従うものと仮定して95%の信頼区間を表示させました。

信頼上限が1より小さければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が良い。

信頼下限が1より大きければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が悪い。

<< 標準化死亡比(SMR)とその信頼区間について >>

標準化死亡比とは、年齢構成の異なる集団間の死亡傾向を比較する指標であるが、上記の帳表は、2000年の全国を標準集団として標準化死亡比を計算したものである。

人口規模の小さい観察区域においては、観察区域死亡数が小さいため(1000人以下)偶然変動の影響を受けやすく指標値が大きく変動する。そのためデータを3年移動平均(複数年法)し中央年を表示年とした。

また、複数の観察区域間で指数値を比較する際、標準化死亡比は基準となる集団との死亡水準比較の指標であり死亡構造を表す指標ではないことも念頭に置いてください。

中能登町（男）

年	SMR	%	死亡 総数	膵管 感染症	結核	悪性 新生物	臓器別																	糖尿病	高血圧 性疾患	心疾患 (高血圧 性を除く)	急性 心筋梗塞	その他の 虚血性 心疾患	脳血管 疾患			呼吸器系 の疾患			消化器系 の疾患			肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事 故		自殺
							食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝 内胆管	胆のう等	膵	気管、気 管支及び 肺	乳房	子宮	前立腺	くも膜下 出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管 支炎	胃潰瘍及び 十二指腸潰 瘍						肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事 故	交通 事故										
H 1 1	SMR	%	106.98	301.04	171.53	104.73	59.32	116.06	135.95	44.20	65.86	231.91	80.76	124.38	-	101.45	206.75	144.07	107.80	91.30	112.99	152.50	262.41	109.54	150.94	96.64	97.24	-	55.16	75.57	33.12	57.93	25.23	123.81	227.68	58.59							
	95% 信頼上限		0.40	6.52	2.31	0.42	0.63	0.59	0.86	0.59	0.43	1.47	0.67	0.60	-	0.84	1.42	1.94	0.48	0.52	0.74	0.66	1.80	0.68	0.70	0.43	0.47	-	0.40	1.64	0.45	0.62	0.55	0.68	1.45	0.45							
	95% 信頼下限		0.40	4.81	1.86	0.42	0.53	0.57	0.80	0.48	0.40	1.37	0.59	0.58	-	0.74	1.30	1.56	0.47	0.50	0.69	0.65	1.65	0.63	0.68	0.42	0.46	-	0.36	1.21	0.36	0.52	0.40	0.65	1.35	0.40							
H 1 2	SMR	%	97.14	290.92	166.08	100.32	58.21	108.19	132.33	64.91	100.74	179.99	94.66	112.84	-	58.53	151.30	207.37	86.96	75.94	72.95	118.22	129.37	77.66	129.89	96.50	102.39	-	84.73	-	98.23	55.68	47.86	114.24	181.03	58.33							
	95% 信頼上限		0.36	6.30	2.23	0.40	0.62	0.56	0.84	0.69	0.58	1.23	0.72	0.55	-	0.62	1.16	2.20	0.40	0.46	0.56	0.53	1.19	0.53	0.61	0.43	0.49	-	0.52	-	0.75	0.59	0.64	0.63	1.24	0.45							
	95% 信頼下限		0.36	4.64	1.80	0.40	0.52	0.54	0.78	0.58	0.55	1.13	0.65	0.54	-	0.52	1.04	1.86	0.39	0.43	0.50	0.52	1.03	0.49	0.59	0.42	0.47	-	0.49	-	0.68	0.50	0.52	0.60	1.14	0.40							
H 1 3	SMR	%	99.70	-	242.53	105.05	76.12	105.64	116.23	84.80	120.01	87.59	77.15	137.46	-	75.58	197.23	133.87	88.85	86.34	71.01	114.83	95.76	56.95	129.20	97.06	104.94	-	90.60	71.52	129.45	125.86	69.03	119.30	44.96	67.78							
	95% 信頼上限		0.37	-	2.58	0.42	0.70	0.54	0.76	0.78	0.66	0.80	0.64	0.64	-	0.69	1.35	1.80	0.40	0.50	0.54	0.51	1.02	0.44	0.60	0.43	0.49	-	0.54	1.55	0.89	0.91	0.73	0.65	0.60	0.49							
	95% 信頼下限		0.37	-	2.17	0.42	0.61	0.52	0.71	0.68	0.63	0.70	0.57	0.63	-	0.60	1.24	1.45	0.40	0.47	0.49	0.50	0.86	0.39	0.59	0.42	0.48	-	0.51	1.14	0.82	0.83	0.62	0.62	0.49	0.44							
H 1 4	SMR	%	97.41	-	236.42	98.52	130.81	122.14	88.32	124.84	124.95	85.51	75.64	92.22	-	36.63	241.35	128.56	88.38	90.18	80.58	106.91	94.66	55.76	117.82	86.36	92.24	-	103.59	139.49	144.02	173.47	43.10	151.67	67.02	77.37							
	95% 信頼上限		0.36	-	2.51	0.40	0.94	0.61	0.64	0.96	0.67	0.78	0.63	0.47	-	0.49	1.53	1.73	0.40	0.51	0.58	0.48	1.01	0.43	0.56	0.39	0.44	-	0.60	1.88	0.95	1.10	0.58	0.78	0.71	0.53							
	95% 信頼下限		0.36	-	2.12	0.39	0.86	0.59	0.58	0.86	0.64	0.68	0.55	0.45	-	0.40	1.43	1.39	0.39	0.48	0.53	0.47	0.85	0.38	0.54	0.38	0.43	-	0.56	1.51	0.88	1.03	0.47	0.75	0.60	0.49							
H 1 5	SMR	%	103.52	271.47	155.48	97.20	92.05	125.14	99.54	143.81	89.12	84.26	59.70	106.11	-	54.16	381.18	126.63	123.65	100.83	124.88	103.19	125.27	64.28	109.20	93.90	96.47	-	73.16	137.77	95.17	136.65	63.30	136.65	44.50	67.65							
	95% 信頼上限		0.38	5.88	2.09	0.39	0.76	0.62	0.68	1.04	0.52	0.77	0.55	0.52	-	0.58	2.11	1.70	0.53	0.55	0.77	0.46	1.15	0.46	0.52	0.41	0.45	-	0.46	1.85	0.73	0.94	0.67	0.72	0.60	0.49							
	95% 信頼下限		0.38	4.33	1.68	0.39	0.68	0.60	0.63	0.94	0.49	0.67	0.48	0.50	-	0.49	2.01	1.37	0.53	0.53	0.72	0.45	1.00	0.42	0.51	0.41	0.44	-	0.43	1.49	0.66	0.86	0.57	0.69	0.48	0.44							
H 1 6	SMR	%	98.28	262.24	75.48	100.18	90.48	158.64	97.16	141.14	54.12	102.64	73.18	89.04	-	87.12	372.71	241.21	129.37	86.48	153.92	69.30	61.87	62.79	75.26	81.36	75.72	-	64.33	66.94	62.67	81.84	58.49	107.17	88.63	76.96							
	95% 信頼上限		0.36	5.68	1.63	0.40	0.75	0.74	0.67	1.02	0.37	0.85	0.61	0.45	-	0.72	2.07	2.21	0.55	0.49	0.88	0.33	0.83	0.45	0.38	0.36	0.37	-	0.42	1.45	0.57	0.68	0.62	0.59	0.81	0.53							
	95% 信頼下限		0.36	4.19	1.20	0.40	0.66	0.73	0.61	0.93	0.34	0.75	0.54	0.43	-	0.64	1.97	1.92	0.54	0.46	0.84	0.32	0.67	0.41	0.37	0.36	0.36	-	0.39	1.07	0.50	0.60	0.52	0.57	0.71	0.48							
H 1 7	SMR	%	91.93	252.57	-	89.63	53.33	150.24	59.11	98.79	53.33	119.47	71.58	79.51	-	100.35	318.14	172.33	126.67	72.60	138.06	66.65	61.05	78.62	65.61	79.20	61.72	-	55.79	-	61.98	62.57	72.77	98.27	110.14	86.31							
	95% 信頼上限		0.34	5.47	-	0.36	0.57	0.71	0.49	0.82	0.37	0.91	0.59	0.41	-	0.77	1.83	1.83	0.54	0.43	0.81	0.32	0.82	0.52	0.34	0.35	0.31	-	0.38	-	0.57	0.57	0.67	0.55	0.91	0.57							
	95% 信頼下限		0.34	4.03	-	0.36	0.48	0.69	0.43	0.72	0.34	0.82	0.52	0.39	-	0.69	1.73	1.54	0.53	0.40	0.77	0.31	0.66	0.48	0.33	0.35	0.30	-	0.35	-	0.49	0.50	0.58	0.53	0.81	0.53							
H 1 8	SMR	%	85.90	242.01	-	92.80	69.78	150.36	57.39	96.59	39.31	115.60	55.90	91.32	-	111.92	198.99	217.96	98.18	64.75	92.04	61.90	-	67.90	68.37	72.18	56.04	-	61.11	-	45.96	59.61	67.62	121.54	109.54	57.52							
	95% 信頼上限		0.32	5.24	-	0.37	0.64	0.71	0.47	0.80	0.30	0.88	0.51	0.45	-	0.81	1.31	2.00	0.43	0.39	0.61	0.30	-	0.47	0.35	0.32	0.29	-	0.40	-	0.49	0.55	0.62	0.65	0.91	0.44							
	95% 信頼下限		0.32	3.86	-	0.37	0.56	0.69	0.42	0.71	0.27	0.80	0.45	0.44	-	0.73	1.21	1.74	0.42	0.37	0.56	0.29	-	0.43	0.34	0.32	0.28	-	0.37	-	0.41	0.47	0.54	0.62	0.80	0.40							
H 1 9	SMR	%	85.11	98.11	-	83.11	72.27	98.70	47.48	134.75	51.27	98.60	81.24	87.92	-	114.72	133.12	96.55	66.90	48.30	82.15	31.95	80.41	88.28	98.11	57.23	98.11	-	61.11	-	45.96	59.61	67.62	121.54	109.54	57.52							
	95% 信頼上限		0.94	98.11	-	0.99	1.43	1.42	0.94	2.35	0.89	1.85	1.46	1.22	-	2.15	3.18	1.23	1.06	0.91	1.09	0.95	1.33	1.24	98.11	0.80	98.11	-	0.40	-	0.49	0.55	0.62	0.65	0.91	1.07							
	95% 信頼下限		0.76	98.11	-	0.67	0.01	0.55	0.01	0.35	0.13	0.12	0.16	0.53	-	0.14	-0.51	0.71	0.27	0.06	0.55	-0.31	0.28	0.53	98.11	0.34	98.11	-	0.35	-	0.49	0.50	0.58	0.53	0.81	0.53							
H 2 0	SMR	%	86.88	98.11	-	87.72	70.85	62.72	57.98	151.01	43.17	57.63	79.60	120.29	-	89.83	128.91	88.68	47.48	56.50	102.68	31.58	78.72	120.99	69.06	98.11	98.11	-	61.11	-	45.96	59.61	67.62	121.54	109.54	57.52							
	95% 信頼上限		0.96	98.11	-	1.04	1.40	0.97	1.09	2.56	0.78	1.23	1.43	1.60	-	1.78	3.08	1.13	0.80	1.02	1.33	0.93	1.30	1.62	98.11	0.94	98.11	-	0.40	-	0.49	0.55	0.62	0.65	0.91	1.07							
	95% 信頼下限		0.78	98.11	-	0.71	0.01	0.29	0.07	0.46	0.09	-0.08	0.16	0.80	-	0.02	-0.50	0.64	0.15	0.11	0.73	-0.30	0.27	0.80	98.11	0.44	98.11	-	0.35	-	0.49	0.50	0.58	0.53	0.81	0.53							

中能登町死亡数（男）（3年移動平均）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系											糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺					
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺							肺炎	急性気管支炎	交通事故													
H11	342	1	2	113	3	23	10	2	9	10	5	30	0	0	5	8	2	48	14	9	61	8	11	39	48	30	0	7	1	2	3	1	17	10	6		
H12	320	1	2	111	3	22	10	3	14	8	6	28	0	0	3	6	3	40	12	6	49	4	8	35	50	33	0	11	0	6	3	2	16	8	6		
H13	337	0	3	119	4	22	9	4	17	4	5	35	0	0	4	8	2	42	14	6	49	3	6	36	52	35	0	12	1	8	7	3	17	2	7		
H14	338	0	3	114	7	26	7	6	18	4	5	24	0	0	2	10	2	43	15	7	47	3	6	34	48	32	0	14	2	9	10	2	22	3	8		
H15	364	1	2	114	5	27	8	7	13	4	4	28	0	0	3	16	2	61	17	11	46	4	7	32	53	34	0	10	2	6	8	3	20	2	7		
H16	356	1	1	120	5	35	8	7	8	5	5	24	0	0	5	16	4	66	15	14	32	2	7	23	48	28	0	9	1	4	5	3	16	4	8		
H17	344	1	0	110	3	34	5	5	8	6	5	22	0	0	6	14	3	67	13	13	32	2	9	21	49	24	0	8	0	4	4	4	15	5	9		
H18	333	1	0	117	4	35	5	5	6	6	4	26	0	0	7	9	4	54	12	9	31	0	8	23	47	23	0	9	0	3	4	4	19	5	6		
H19	319	/	0	101	4	20	4	7	7	5	6	25	0	0	/	5	2	53	11	5	35	1	9	24	/	24	/	/	/	5	5	3	18	3	6		
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

中能登町期待死亡数（男）（平成12年の全国死亡率を基準）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系											糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	呼吸器系の疾患			消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺					
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺							肺炎	急性気管支炎	交通事故													
H11	319.68	0.33	1.17	107.90	5.06	19.82	7.36	4.53	13.67	4.31	6.19	24.12	0.05	0.00	4.93	3.87	1.39	44.53	15.33	7.97	40.00	3.05	10.04	25.84	49.67	30.85	0.39	12.69	1.32	6.04	5.18	3.96	13.73	4.39	10.24		
H12	329.43	0.34	1.20	110.65	5.15	20.33	7.56	4.62	13.90	4.44	6.34	24.81	0.05	0.00	5.13	3.97	1.45	46.00	15.80	8.22	41.45	3.09	10.30	26.95	51.81	32.23	0.41	12.98	1.36	6.11	5.39	4.18	14.01	4.42	10.29		
H13	338.00	0.35	1.24	113.28	5.25	20.82	7.74	4.72	14.17	4.57	6.48	25.46	0.05	0.00	5.29	4.06	1.49	47.27	16.22	8.45	42.67	3.13	10.54	27.86	53.58	33.35	0.42	13.25	1.40	6.18	5.56	4.35	14.25	4.45	10.33		
H14	346.97	0.36	1.27	115.72	5.35	21.29	7.93	4.81	14.41	4.68	6.61	26.03	0.05	0.00	5.46	4.14	1.56	48.66	16.63	8.69	43.96	3.17	10.76	28.86	55.58	34.69	0.44	13.51	1.43	6.25	5.76	4.64	14.51	4.48	10.34		
H15	351.62	0.37	1.29	117.28	5.43	21.58	8.04	4.87	14.59	4.75	6.70	26.39	0.05	0.00	5.54	4.20	1.58	49.33	16.86	8.81	44.58	3.19	10.89	29.30	56.44	35.24	0.45	13.67	1.45	6.30	5.85	4.74	14.64	4.49	10.35		
H16	362.22	0.38	1.32	119.78	5.53	22.06	8.23	4.96	14.78	4.87	6.83	26.95	0.06	0.00	5.74	4.29	1.66	51.02	17.35	9.10	46.17	3.23	11.15	30.56	58.99	36.98	0.47	13.99	1.49	6.38	6.11	5.13	14.93	4.51	10.40		
H17	374.20	0.40	1.37	122.73	5.63	22.63	8.46	5.06	15.00	5.02	6.98	27.67	0.06	0.00	5.98	4.40	1.74	52.89	17.91	9.42	48.01	3.28	11.45	32.01	61.87	38.89	0.50	14.34	1.54	6.45	6.39	5.50	15.26	4.54	10.43		
H18	387.68	0.41	1.42	126.08	5.73	23.28	8.71	5.18	15.27	5.19	7.16	28.47	0.06	0.00	6.25	4.52	1.84	55.00	18.53	9.78	50.08	3.32	11.78	33.64	65.11	41.04	0.53	14.73	1.60	6.53	6.71	5.92	15.63	4.56	10.43		
H19	374.83	/	1.07	121.53	5.53	20.26	8.42	5.19	13.65	5.07	7.39	28.44	0.05	0.00	/	4.36	1.50	54.90	16.44	10.35	42.61	3.13	11.19	27.19	/	41.94	/	/	/	6.01	6.66	5.44	14.16	3.42	10.05		
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

95%信頼上限値・95%信頼下限値は、観察区域死亡数がポアソン分布に従うものと仮定して95%の信頼区間を表示させました。

信頼上限が1より小さければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が良い。

信頼下限が1より大きければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が悪い。

<< 標準化死亡比(SMR)とその信頼区間について >>

標準化死亡比とは、年齢構成の異なる集団間の死亡傾向を比較する指標であるが、上記の帳表は、2000年の全国を標準集団として標準化死亡比を計算したものである。

人口規模の小さい観察区域においては、観察区域死亡数が小さいため(1000人以下)偶然変動の影響を受けやすく指標値が大きく変動する。そのためデータを3年移動平均(複数年法)し中央年を表示年とした。

また、複数の観察区域間で指数値を比較する際、標準化死亡比は基準となる集団との死亡水準比較の指標であり死亡構造を表す指標ではないことも念頭に置いてください。

中能登町(女)

年	SMR	%	死亡 総数	膵管 感染症	結核	悪性 新生物	がん別													糖尿病	高血圧 性疾患	心疾患 (高血圧 性を除く)	急性 心筋梗塞	その他の 冠心性 心疾患	脳血管 疾患	呼吸器系 の疾患			消化器系 の疾患			肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事 故		自殺
							食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝 内胆管	胆のう等	膵	気管、気 管支及び 肺	乳房	子宮	前立腺	肺がん	悪性 肺がん							気管支 がん	急性 心筋梗塞	脳出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎				慢性気管 支炎	胃潰瘍及び 十二指腸潰 瘍	
H1 1	SMR	%	105.32	-	-	114.87	-	168.00	71.70	109.88	171.01	117.49	243.40	89.53	59.98	-	166.66	208.85	93.54	107.65	71.00	135.77	36.10	125.47	159.18	71.63	72.69	207.73	79.30	190.33	33.16	70.14	87.45	166.20	238.88	90.98	
	95% 信頼上限		0.40	-	-	0.48	-	0.90	0.59	1.17	1.05	0.90	1.43	0.61	0.64	-	1.28	1.73	0.42	0.62	0.59	0.59	0.49	0.77	0.72	0.36	0.39	4.50	0.54	2.56	0.72	0.64	0.60	0.95	1.98	0.83	
	95% 信頼下限		0.39	-	-	0.47	-	0.87	0.53	0.98	0.99	0.81	1.35	0.56	0.54	-	1.15	1.53	0.42	0.59	0.52	0.58	0.39	0.72	0.71	0.34	0.37	3.32	0.50	2.06	0.53	0.56	0.55	0.91	1.75	0.72	
H1 2	SMR	%	100.81	-	-	109.45	-	127.33	97.69	107.52	91.28	113.98	237.37	98.21	79.46	-	107.60	158.59	97.97	96.20	81.70	121.21	35.35	121.38	137.48	73.57	76.86	197.30	114.59	182.10	64.84	33.53	81.99	196.13	284.07	90.33	
	95% 信頼上限		0.38	-	-	0.46	-	0.73	0.70	1.14	0.70	0.87	1.39	0.65	0.73	-	0.99	1.45	0.44	0.56	0.63	0.53	0.48	0.75	0.63	0.36	0.40	4.27	0.69	2.45	0.87	0.45	0.56	1.07	2.17	0.83	
	95% 信頼下限		0.38	-	-	0.45	-	0.69	0.64	0.96	0.63	0.79	1.32	0.60	0.63	-	0.86	1.26	0.43	0.53	0.56	0.52	0.38	0.70	0.62	0.35	0.39	3.15	0.65	1.97	0.70	0.36	0.52	1.02	1.96	0.72	
H1 3	SMR	%	95.79	-	-	97.11	101.33	88.36	108.34	104.94	59.46	110.24	177.60	116.72	78.93	32.49	155.72	224.99	109.45	148.97	78.05	107.22	69.05	63.83	130.40	64.91	72.86	186.80	100.84	86.78	94.88	15.97	76.69	167.64	187.39	22.38	
	95% 信頼上限		0.36	-	-	0.41	2.19	0.56	0.74	1.11	0.55	0.84	1.13	0.72	0.72	0.70	1.19	1.72	0.48	0.77	0.60	0.48	0.63	0.49	0.60	0.32	0.38	4.04	0.62	1.88	1.01	0.35	0.53	0.95	1.72	0.48	
	95% 信頼下限		0.36	-	-	0.41	1.62	0.52	0.68	0.94	0.47	0.76	1.05	0.67	0.63	0.52	1.07	1.55	0.47	0.74	0.54	0.47	0.55	0.44	0.59	0.31	0.37	2.98	0.58	1.39	0.85	0.25	0.48	0.90	1.49	0.36	
H1 4	SMR	%	93.60	-	-	94.56	98.43	85.81	105.11	136.46	57.94	177.57	86.22	72.14	117.52	95.56	225.32	214.33	95.32	136.24	49.87	108.95	101.01	82.11	117.97	73.91	72.95	-	97.02	-	92.41	45.83	63.53	151.52	46.08	22.18	
	95% 信頼上限		0.35	-	-	0.40	2.13	0.55	0.72	1.25	0.53	1.13	0.71	0.52	0.90	1.02	1.48	1.64	0.42	0.72	0.46	0.48	0.77	0.56	0.55	0.35	0.38	-	0.60	-	0.98	0.49	0.46	0.87	1.00	0.48	
	95% 信頼下限		0.35	-	-	0.40	1.57	0.51	0.66	1.09	0.46	1.05	0.63	0.47	0.81	0.86	1.37	1.48	0.42	0.69	0.40	0.47	0.70	0.52	0.54	0.35	0.36	-	0.56	-	0.83	0.41	0.42	0.83	0.74	0.35	
H1 5	SMR	%	94.42	-	-	97.63	191.91	100.42	89.63	166.86	56.69	137.98	134.47	80.38	116.85	93.90	266.92	206.75	99.49	105.39	48.21	103.34	115.27	89.60	104.47	78.22	70.34	-	94.06	-	120.45	59.00	52.48	105.33	-	21.99	
	95% 信頼上限		0.35	-	-	0.41	2.58	0.60	0.65	1.38	0.52	0.95	0.92	0.55	0.89	1.00	1.65	1.58	0.44	0.58	0.44	0.46	0.83	0.59	0.49	0.37	0.37	-	0.58	-	1.10	0.54	0.40	0.67	-	0.48	
	95% 信頼下限		0.35	-	-	0.41	2.08	0.57	0.59	1.22	0.45	0.87	0.85	0.51	0.81	0.84	1.54	1.42	0.43	0.56	0.38	0.45	0.76	0.55	0.48	0.36	0.35	-	0.54	-	0.96	0.47	0.36	0.62	-	0.35	
H1 6	SMR	%	87.20	-	-	94.73	92.75	113.20	74.18	97.30	41.45	165.90	146.45	68.09	135.07	91.76	209.53	193.41	88.94	75.24	68.52	80.96	80.09	104.96	72.17	77.94	66.01	-	97.74	-	87.75	97.49	56.45	111.49	-	43.49	
	95% 信頼上限		0.33	-	-	0.40	2.01	0.65	0.57	1.03	0.44	1.05	0.96	0.49	0.97	0.97	1.38	1.48	0.39	0.45	0.52	0.37	0.66	0.65	0.36	0.36	0.34	-	0.59	-	0.93	0.70	0.41	0.69	-	0.58	
	95% 信頼下限		0.33	-	-	0.39	1.48	0.62	0.51	0.87	0.37	0.98	0.89	0.45	0.89	0.82	1.28	1.33	0.39	0.43	0.47	0.36	0.59	0.61	0.35	0.36	0.33	-	0.55	-	0.79	0.64	0.37	0.64	-	0.47	
H1 7	SMR	%	83.12	-	-	85.66	89.53	124.74	47.65	125.93	53.85	79.60	157.29	65.81	76.51	29.86	133.66	209.99	95.34	83.25	64.66	71.04	46.69	109.41	62.09	70.98	61.65	-	92.75	-	113.47	78.55	88.69	77.78	87.93	21.48	
	95% 信頼上限		0.31	-	-	0.36	1.94	0.69	0.44	1.15	0.49	0.66	1.00	0.47	0.70	0.65	1.02	1.51	0.41	0.48	0.49	0.33	0.50	0.66	0.32	0.33	0.32	-	0.56	-	1.04	0.60	0.53	0.53	1.18	0.47	
	95% 信頼下限		0.31	-	-	0.36	1.43	0.66	0.38	1.00	0.43	0.58	0.93	0.43	0.61	0.48	0.92	1.38	0.41	0.45	0.45	0.32	0.42	0.62	0.31	0.33	0.31	-	0.52	-	0.90	0.54	0.50	0.49	0.95	0.34	
H1 8	SMR	%	85.91	167.57	154.17	90.00	-	105.04	103.11	152.67	65.56	106.74	136.74	54.47	56.97	58.32	63.83	166.21	89.40	95.53	91.08	80.03	105.82	104.30	67.73	75.51	68.09	-	80.34	-	109.96	73.44	107.26	102.33	130.19	63.81	
	95% 信頼上限		0.32	3.63	3.34	0.38	-	0.60	0.68	1.26	0.54	0.77	0.90	0.42	0.61	0.78	0.68	1.27	0.39	0.52	0.60	0.36	0.76	0.63	0.33	0.35	0.34	-	0.50	-	1.01	0.56	0.59	0.63	1.38	0.68	
	95% 信頼下限		0.32	2.68	2.46	0.37	-	0.57	0.63	1.12	0.48	0.70	0.83	0.38	0.51	0.63	0.57	1.15	0.38	0.50	0.55	0.35	0.69	0.59	0.32	0.34	0.33	-	0.46	-	0.88	0.51	0.57	0.59	1.17	0.57	
H1 9	SMR	%	97.07	/	392.69	111.27	-	129.66	132.65	190.14	69.04	184.61	144.43	72.34	51.35	64.08	44.81	145.14	90.34	111.84	75.25	113.09	189.39	145.34	90.66	/	67.22	/	/	/	/	115.76	99.08	111.38	79.96	176.58	73.94
	95% 信頼上限		1.07	/	9.37	1.34	-	1.95	2.08	3.42	1.30	2.94	2.34	1.22	1.09	1.53	1.07	2.87	1.14	1.65	1.31	1.43	3.01	2.19	1.24	/	0.94	/	/	/	/	2.29	1.68	1.64	1.35	3.76	1.58
	95% 信頼下限		0.87	/	-1.52	0.89	-	0.64	0.58	0.38	0.09	0.76	0.55	0.22	-0.07	-0.25	-0.17	0.03	0.67	0.59	0.20	0.83	0.77	0.72	0.58	/	0.41	/	/	/	/	0.02	0.30	0.58	0.25	-0.23	-0.10
H2 0	SMR	%	100.81	/	381.45	124.85	-	127.01	162.25	124.73	122.60	245.80	113.52	79.88	102.64	158.91	109.24	69.83	97.96	108.53	125.18	111.45	220.34	151.15	84.31	/	59.54	/	/	/	/	142.45	95.68	93.99	97.67	58.39	74.03
	95% 信頼上限		1.11	/	9.10	1.49	-	1.91	2.44	2.47	2.03	3.70	1.92	1.32	1.85	2.98	2.05	1.67	1.22	1.60	1.96	1.40	3.40	2.25	1.16	/	0.84	/	/	/	/	2.67	1.62	1.42	1.58	1.73	1.58
	95% 信頼下限		0.90	/	-1.47	1.01	-	0.63	0.80	0.02	0.43	1.21	0.35	0.28	0.21	0.20	0.13	-0.27	0.74	0.57	0.54	0.83	1.01	0.77	0.53	/	0.35	/	/	/	/	0.18	0.29	0.46	0.37	-0.56	-0.10

中能登町死亡数（女）（3年移動平均）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺			
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内臓管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故									
H11	278	0	0	80	0	18	5	3	11	6	13	8	3	0	0	6	5	43	14	5	58	2	11	43	26	18	1	8	2	1	4	8	14	5	4		
H12	276	0	0	78	0	14	7	3	6	6	13	9	4	0	0	4	4	47	13	6	54	2	11	39	28	20	1	12	2	2	2	8	17	6	4		
H13	273	0	0	71	1	10	8	3	4	6	10	11	4	1	0	6	6	55	21	6	50	4	6	39	26	20	1	11	1	3	1	8	15	4	1		
H14	277	0	0	71	1	10	8	4	4	10	5	7	6	3	0	9	6	50	20	4	53	6	8	37	31	21	0	11	0	3	3	7	14	1	1		
H15	288	0	0	75	2	12	7	5	4	8	8	8	6	3	0	11	6	54	16	4	52	7	9	34	34	21	0	11	0	4	4	6	10	0	1		
H16	279	0	0	75	1	14	6	3	3	10	9	7	7	3	0	9	6	51	12	6	43	5	11	25	36	21	0	12	0	3	7	7	11	0	2		
H17	280	0	0	70	1	16	4	4	4	5	10	7	4	1	0	6	7	58	14	6	40	3	12	23	35	21	0	12	0	4	6	12	8	2	1		
H18	306	1	1	76	0	14	9	5	5	7	9	6	3	2	0	3	6	58	17	9	48	7	12	27	40	25	0	11	0	4	6	16	11	3	3		
H19	335	/	2	92	0	15	12	6	5	11	10	8	3	2	/	2	4	58	17	7	56	11	15	29	/	25	/	/	/	4	8	17	8	3	3		
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

中能登町期待死亡数（女）（平成12年の全国死亡率を基準）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺			
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内臓管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故									
H11	263.95	0.42	0.48	69.64	0.94	10.71	6.97	2.73	6.43	5.11	5.34	8.94	5.00	2.97	0.00	3.60	2.39	45.97	13.00	7.04	42.72	5.54	8.77	27.01	36.30	24.76	0.48	10.09	1.05	3.02	5.70	9.15	8.42	2.09	4.40		
H12	273.79	0.44	0.50	71.27	0.96	10.99	7.17	2.79	6.57	5.26	5.48	9.16	5.03	3.02	0.00	3.72	2.52	47.97	13.51	7.34	44.55	5.66	9.06	28.37	38.06	26.02	0.51	10.47	1.10	3.08	5.96	9.76	8.67	2.11	4.43		
H13	284.98	0.46	0.52	73.11	0.99	11.32	7.38	2.86	6.73	5.44	5.63	9.42	5.07	3.08	0.00	3.85	2.67	50.25	14.10	7.69	46.63	5.79	9.40	29.91	40.06	27.45	0.54	10.91	1.15	3.16	6.26	10.43	8.95	2.13	4.47		
H14	295.94	0.48	0.54	75.08	1.02	11.65	7.61	2.93	6.90	5.63	5.80	9.70	5.11	3.14	0.00	3.99	2.80	52.45	14.68	8.02	48.65	5.94	9.74	31.36	41.95	28.79	0.56	11.34	1.20	3.25	6.55	11.02	9.24	2.17	4.51		
H15	305.03	0.50	0.56	76.82	1.04	11.95	7.81	3.00	7.06	5.80	5.95	9.95	5.13	3.19	0.00	4.12	2.90	54.28	15.18	8.30	50.32	6.07	10.05	32.54	43.47	29.86	0.58	11.69	1.25	3.32	6.78	11.43	9.49	2.21	4.55		
H16	319.96	0.53	0.59	79.17	1.08	12.37	8.09	3.08	7.24	6.03	6.15	10.28	5.18	3.27	0.00	4.30	3.10	57.34	15.95	8.76	53.12	6.24	10.48	34.64	46.19	31.81	0.62	12.28	1.32	3.42	7.18	12.40	9.87	2.24	4.60		
H17	336.86	0.56	0.62	81.72	1.12	12.83	8.39	3.18	7.43	6.28	6.36	10.64	5.23	3.35	0.00	4.49	3.33	60.84	16.82	9.28	56.30	6.43	10.97	37.05	49.31	34.06	0.67	12.94	1.40	3.53	7.64	13.53	10.29	2.27	4.65		
H18	356.20	0.60	0.65	84.44	1.16	13.33	8.73	3.28	7.63	6.56	6.58	11.02	5.27	3.43	0.00	4.70	3.61	64.87	17.80	9.88	59.98	6.62	11.50	39.86	52.97	36.72	0.72	13.69	1.50	3.64	8.17	14.92	10.75	2.30	4.70		
H19	345.12	/	0.51	82.68	1.10	11.57	9.05	3.16	7.24	5.96	6.92	11.06	5.84	3.12	/	4.46	2.76	64.20	15.20	9.30	49.52	5.81	10.32	31.99	/	37.19	/	/	3.46	8.07	15.26	10.00	1.70	4.06			
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

95%信頼上限値・95%信頼下限値は、観察区域死亡数がポアソン分布に従うものと仮定して95%の信頼区間を表示させました。

信頼上限が1より小さければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が良い。

信頼下限が1より大きければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が悪い。

<< 標準化死亡比(SMR)とその信頼区間について >>

標準化死亡比とは、年齢構成の異なる集団間の死亡傾向を比較する指標であるが、上記の帳表は、2000年の全国を標準集団として標準化死亡比を計算したものである。

人口規模の小さい観察区域においては、観察区域死亡数が小さいため(1000人以下)偶然変動の影響を受けやすく指標値が大きく変動する。そのためデータを3年移動平均(複数年法)し中央年を表示年とした。

また、複数の観察区域間で指数値を比較する際、標準化死亡比は基準となる集団との死亡水準比較の指標であり死亡構造を表す指標ではないことも念頭に置いてください。

4) 標準化死亡率 (SMR) (3年移動平均) ◎ 平成12年全国の性別年齢階級(18)別死因简单分類(130)死亡率(人口10万対)を標準集団死亡率とし観察区域期待死亡数を算出

資料: 衛生統計年報

石川県(総数)

年	死亡総数	結核	悪性新生物	原因別															呼吸器系の疾患				消化器系の疾患				肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺				
				食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	膵のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患							胃潰瘍及び十二指腸潰瘍			
H11	SMR %	100.30	89.54	100.30	99.65	71.49	108.96	100.13	96.68	86.74	113.18	110.87	100.42	104.68	-	-	100.83	110.15	98.04	92.04	88.42	106.62	98.50	84.05	114.96	104.05	109.90	70.52	85.33	90.15	79.77	76.71	99.12	114.35	113.69	93.14
	95% 信頼上限	0.34	0.42	0.42	0.34	0.27	0.38	0.36	0.36	0.31	0.41	0.40	0.35	0.39	-	-	0.37	0.42	0.34	0.32	0.32	0.37	0.36	0.30	0.40	0.36	0.38	0.34	0.30	0.37	0.29	0.28	0.36	0.40	0.42	0.33
	95% 信頼下限	0.34	0.41	0.41	0.34	0.27	0.38	0.36	0.36	0.31	0.41	0.40	0.35	0.39	-	-	0.37	0.42	0.34	0.32	0.32	0.37	0.36	0.30	0.40	0.36	0.38	0.33	0.30	0.36	0.29	0.28	0.36	0.40	0.42	0.33
H12	SMR %	97.20	94.05	90.98	97.79	68.74	106.88	97.92	101.68	87.39	106.20	111.54	96.69	108.62	-	-	98.75	92.92	96.12	90.82	81.73	97.94	89.78	75.89	105.89	99.74	106.23	49.38	84.61	83.71	78.86	77.45	97.35	113.07	111.14	92.05
	95% 信頼上限	0.33	0.44	0.38	0.33	0.26	0.37	0.35	0.38	0.31	0.39	0.40	0.34	0.41	-	-	0.36	0.36	0.33	0.32	0.30	0.34	0.33	0.27	0.37	0.34	0.37	0.25	0.30	0.34	0.29	0.28	0.35	0.40	0.41	0.33
	95% 信頼下限	0.33	0.43	0.38	0.33	0.26	0.37	0.35	0.37	0.31	0.39	0.40	0.34	0.41	-	-	0.36	0.36	0.33	0.32	0.29	0.34	0.33	0.27	0.37	0.34	0.37	0.24	0.30	0.34	0.29	0.28	0.35	0.40	0.41	0.33
H13	SMR %	93.07	97.99	95.12	96.38	66.94	102.46	101.47	103.04	83.83	108.55	103.62	97.49	100.63	-	-	96.53	79.87	92.72	88.43	76.96	90.20	82.67	72.87	97.01	92.90	96.55	40.71	85.43	95.26	76.41	70.03	88.37	106.99	103.67	92.57
	95% 信頼上限	0.31	0.45	0.40	0.33	0.26	0.36	0.36	0.38	0.30	0.39	0.37	0.34	0.38	-	-	0.36	0.31	0.32	0.31	0.28	0.31	0.31	0.26	0.34	0.32	0.33	0.22	0.30	0.38	0.28	0.26	0.32	0.38	0.38	0.33
	95% 信頼下限	0.31	0.44	0.39	0.33	0.26	0.36	0.36	0.38	0.30	0.39	0.37	0.34	0.38	-	-	0.36	0.31	0.32	0.31	0.28	0.31	0.30	0.26	0.34	0.32	0.33	0.21	0.30	0.38	0.28	0.26	0.32	0.38	0.38	0.33
H14	SMR %	92.07	101.46	83.89	95.17	76.80	98.62	102.35	102.79	80.34	108.54	101.01	97.60	98.95	-	-	96.50	80.46	90.40	86.25	71.40	87.96	83.98	76.57	92.32	89.94	90.80	42.94	89.34	90.26	80.46	73.82	88.88	105.86	101.27	99.33
	95% 信頼上限	0.31	0.46	0.35	0.32	0.29	0.35	0.37	0.38	0.29	0.39	0.36	0.34	0.37	-	-	0.36	0.31	0.31	0.30	0.26	0.30	0.31	0.27	0.32	0.31	0.31	0.22	0.32	0.36	0.30	0.27	0.32	0.37	0.37	0.35
	95% 信頼下限	0.31	0.45	0.35	0.32	0.29	0.35	0.37	0.38	0.29	0.39	0.36	0.34	0.37	-	-	0.36	0.31	0.31	0.30	0.26	0.30	0.31	0.27	0.32	0.31	0.31	0.21	0.32	0.36	0.30	0.27	0.32	0.37	0.37	0.35
H15	SMR %	90.86	86.28	67.92	95.06	79.64	94.75	101.25	104.91	77.39	112.78	103.47	98.18	102.90	-	-	92.92	75.84	89.85	83.46	68.38	84.07	84.69	79.49	85.78	89.16	88.17	43.17	88.73	82.77	80.53	69.42	87.39	99.48	87.96	97.99
	95% 信頼上限	0.31	0.40	0.29	0.32	0.30	0.33	0.36	0.39	0.28	0.41	0.37	0.34	0.39	-	-	0.34	0.29	0.31	0.29	0.25	0.29	0.31	0.28	0.30	0.31	0.31	0.22	0.31	0.33	0.30	0.25	0.31	0.35	0.33	0.35
	95% 信頼下限	0.31	0.39	0.29	0.32	0.30	0.33	0.36	0.38	0.28	0.41	0.37	0.34	0.38	-	-	0.34	0.29	0.31	0.29	0.25	0.29	0.31	0.28	0.30	0.31	0.30	0.21	0.31	0.33	0.30	0.25	0.31	0.35	0.33	0.35
H16	SMR %	90.31	89.88	54.97	93.87	85.76	95.62	96.65	92.73	74.61	102.08	104.06	98.34	107.76	-	-	90.41	73.80	92.07	84.14	67.12	79.93	86.56	77.06	80.02	90.87	90.45	43.18	86.71	61.02	81.99	72.70	82.40	95.72	82.88	96.74
	95% 信頼上限	0.30	0.41	0.24	0.32	0.32	0.33	0.35	0.34	0.27	0.37	0.37	0.34	0.40	-	-	0.33	0.29	0.32	0.30	0.24	0.27	0.32	0.28	0.28	0.31	0.31	0.22	0.31	0.25	0.30	0.27	0.30	0.34	0.31	0.35
	95% 信頼下限	0.30	0.40	0.24	0.32	0.32	0.33	0.35	0.34	0.27	0.37	0.37	0.34	0.40	-	-	0.33	0.28	0.32	0.30	0.24	0.27	0.32	0.27	0.28	0.31	0.31	0.21	0.31	0.25	0.30	0.27	0.30	0.34	0.31	0.34
H17	SMR %	87.93	95.01	46.89	92.97	79.19	95.25	92.56	91.08	76.11	95.73	106.71	99.06	108.16	-	-	88.60	69.90	90.89	80.92	67.61	73.94	84.20	70.07	74.09	89.70	90.94	30.43	82.11	51.10	77.96	75.26	80.07	89.80	73.09	91.74
	95% 信頼上限	0.30	0.43	0.21	0.32	0.30	0.33	0.33	0.34	0.27	0.35	0.38	0.35	0.40	-	-	0.33	0.27	0.31	0.28	0.24	0.25	0.31	0.25	0.26	0.31	0.31	0.17	0.29	0.22	0.29	0.27	0.29	0.32	0.27	0.33
	95% 信頼下限	0.30	0.42	0.21	0.32	0.30	0.33	0.33	0.34	0.27	0.35	0.38	0.35	0.40	-	-	0.33	0.27	0.31	0.28	0.24	0.25	0.31	0.25	0.26	0.31	0.31	0.16	0.29	0.21	0.29	0.27	0.29	0.32	0.27	0.33
H18	SMR %	87.00	122.33	44.34	91.75	77.27	89.61	91.78	88.96	75.54	91.78	105.42	100.96	100.56	-	-	89.70	71.22	90.75	79.02	65.83	71.18	85.90	67.05	70.81	88.35	90.03	22.17	82.42	45.16	75.79	76.17	79.37	89.55	69.91	89.79
	95% 信頼上限	0.29	0.53	0.20	0.31	0.29	0.31	0.33	0.33	0.27	0.33	0.38	0.35	0.38	-	-	0.33	0.28	0.31	0.28	0.24	0.25	0.31	0.24	0.25	0.30	0.31	0.13	0.29	0.19	0.28	0.28	0.28	0.32	0.26	0.32
	95% 信頼下限	0.29	0.52	0.20	0.31	0.29	0.31	0.33	0.33	0.27	0.33	0.38	0.35	0.38	-	-	0.33	0.27	0.31	0.28	0.24	0.24	0.31	0.24	0.25	0.30	0.31	0.12	0.29	0.19	0.28	0.28	0.28	0.32	0.26	0.32
H19	SMR %	91.19	/	44.93	95.89	75.90	98.94	91.69	92.37	83.28	103.60	106.95	103.61	93.28	-	/	95.20	85.70	90.65	87.04	66.95	84.39	92.79	73.17	87.04	/	89.22	/	/	/	76.04	81.10	89.96	103.24	89.71	89.85
	95% 信頼上限	0.92	/	0.60	0.98	0.85	1.04	0.98	1.02	0.89	1.12	1.15	1.08	1.04	-	/	1.04	0.98	0.93	0.92	0.72	0.87	1.02	0.78	0.91	/	0.92	/	/	/	0.84	0.88	0.96	1.09	1.01	0.96
	95% 信頼下限	0.90	/	0.30	0.94	0.67	0.94	0.85	0.83	0.78	0.95	0.99	0.99	0.83	-	/	0.86	0.73	0.88	0.82	0.62	0.82	0.84	0.68	0.84	/	0.86	/	/	/	0.68	0.74	0.84	0.98	0.79	0.83
H20	SMR %	91.26	/	52.64	95.96	77.27	94.78	91.38	87.16	80.68	104.69	108.78	104.44	98.77	-	/	93.64	75.90	88.96	82.84	68.77	81.73	94.00	74.01	82.50	/	86.94	/	/	/	78.03	82.16	103.24	101.41	83.51	88.59
	95% 信頼上限	0.92	/	0.69	0.98	0.87	1.00	0.98	0.96	0.86	1.13	1.16	1.09	1.10	-	/	1.03	0.88	0.91	0.87	0.74	0.84	1.03	0.79	0.86	/	0.90	/	/	/	0.86	0.89	1.09	1.07	0.94	0.95
	95% 信頼下限	0.90	/	0.37	0.94	0.68	0.90	0.85	0.78	0.75	0.96	1.01	1.00	0.88	-	/	0.85	0.64	0.87	0.78	0.64	0.79	0.85	0.69	0.79	/	0.84	/	/	/	0.70	0.76	0.97	0.96	0.73	0.82

石川県死亡数（総数）（3年移動平均）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	原因別													糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	脳血管疾患			呼吸器系の疾患	肺炎		急性気管支炎	消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	脾	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺	くも膜下出血	脳内出血				脳梗塞	肺炎	急性気管支炎		胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患											
H11	28,676	33	79	8,588	210	1,614	695	344	847	509	618	1,582	274	139	204	366	205	4,327	1,261	644	4,267	423	771	2,911	4,276	2,932	30	962	104	366	403	658	1,317	417	783		
H12	28,698	36	74	8,641	206	1,625	699	370	871	493	638	1,565	288	134	195	369	181	4,401	1,287	617	4,071	394	717	2,803	4,276	2,962	22	982	100	368	424	683	1,330	410	778		
H13	28,415	39	80	8,744	205	1,601	746	384	854	521	609	1,623	270	127	197	372	163	4,410	1,298	603	3,899	371	710	2,686	4,160	2,817	19	1,022	118	363	400	655	1,287	385	786		
H14	29,092	42	73	8,877	241	1,586	776	393	838	539	611	1,673	269	149	188	384	172	4,469	1,312	581	3,955	386	770	2,673	4,207	2,772	21	1,103	116	390	440	696	1,305	380	850		
H15	29,628	37	61	9,098	256	1,565	790	411	825	578	643	1,729	283	158	198	381	169	4,601	1,312	576	3,919	398	823	2,586	4,338	2,804	22	1,128	110	398	430	718	1,254	333	844		
H16	30,420	40	51	9,215	282	1,622	776	372	812	540	664	1,778	300	162	204	382	172	4,891	1,368	586	3,869	416	822	2,518	4,609	3,004	23	1,136	84	413	469	714	1,234	316	838		
H17	30,646	44	45	9,363	266	1,660	765	374	845	523	699	1,839	305	132	207	386	171	5,020	1,363	613	3,725	414	771	2,440	4,756	3,164	17	1,110	73	400	507	735	1,186	281	800		
H18	31,387	59	44	9,484	265	1,605	781	374	857	518	709	1,925	287	132	225	403	183	5,213	1,379	620	3,733	432	761	2,441	4,898	3,282	13	1,150	67	396	536	773	1,212	271	787		
H19	32,023	/	34	9,672	254	1,551	785	386	862	552	756	1,999	294	136	/	411	174	5,208	1,334	638	3,734	422	774	2,430	/	3,318	/	/	/	371	567	876	1,277	259	761		
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

石川県期待死亡数（総数）（平成12年全国死亡率を基準）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	原因別													糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	脳血管疾患			呼吸器系の疾患	肺炎		急性気管支炎	消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	脾	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺	くも膜下出血	脳内出血				脳梗塞	肺炎	急性気管支炎		胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患											
H11	28,591.22	36.85	78.76	8,617.87	293.75	1,481.32	694.08	355.81	976.52	449.71	557.40	1,575.40	261.75	0.00	0.00	363.00	186.11	4,413.56	1,370.13	728.34	4,002.19	429.43	917.36	2,534.44	4,109.54	2,668.00	42.54	1,127.45	115.37	458.83	525.39	663.87	1,151.76	366.79	840.69		
H12	29,525.10	38.28	81.33	8,836.67	299.68	1,520.34	713.87	363.90	996.73	464.20	571.98	1,618.55	265.15	0.00	0.00	373.69	194.80	4,578.72	1,417.08	754.91	4,156.46	438.83	944.81	2,647.15	4,286.97	2,788.26	44.55	1,160.62	119.46	466.67	547.46	701.62	1,176.28	368.90	845.16		
H13	30,529.54	39.80	84.10	9,072.49	306.24	1,562.57	735.22	372.66	1,018.76	479.95	587.75	1,664.82	268.32	0.00	0.00	385.39	204.08	4,756.47	1,467.78	783.54	4,322.61	448.78	974.34	2,768.75	4,478.10	2,917.71	46.68	1,196.32	123.87	475.10	571.22	741.21	1,202.95	371.38	849.08		
H14	31,597.39	41.39	87.02	9,327.48	313.79	1,608.16	758.18	382.33	1,043.07	496.60	604.88	1,714.17	271.84	0.00	0.00	397.93	213.78	4,943.78	1,521.20	813.72	4,496.59	459.62	1,005.58	2,895.30	4,677.55	3,052.79	48.90	1,234.63	128.52	484.74	596.03	783.12	1,232.77	375.23	855.69		
H15	32,606.70	42.88	89.81	9,570.97	321.43	1,651.79	780.21	391.75	1,066.06	512.52	621.42	1,760.99	275.04	0.00	0.00	410.03	222.84	5,120.74	1,571.98	842.33	4,661.35	469.96	1,035.40	3,014.84	4,865.60	3,180.10	50.96	1,271.22	132.90	494.24	619.42	821.57	1,260.58	378.56	861.34		
H16	33,682.88	44.51	92.77	9,817.28	328.83	1,696.35	802.86	401.18	1,088.34	528.98	638.06	1,807.98	278.40	0.00	0.00	422.53	233.08	5,312.53	1,625.94	873.11	4,840.52	480.57	1,066.75	3,146.52	5,072.28	3,321.28	53.27	1,310.12	137.66	503.71	645.11	866.48	1,289.18	381.28	866.20		
H17	34,852.81	46.31	95.98	10,071.48	335.89	1,742.70	826.49	410.64	1,110.21	546.34	655.03	1,856.41	281.98	0.00	0.00	435.66	244.63	5,523.15	1,684.30	906.66	5,037.99	491.67	1,100.31	3,293.21	5,302.22	3,479.13	55.86	1,351.90	142.87	513.05	673.64	917.99	1,320.71	384.45	872.01		
H18	36,077.93	48.23	99.24	10,336.42	342.97	1,791.02	850.99	420.40	1,134.51	564.42	672.52	1,906.67	285.40	0.00	0.00	449.29	256.96	5,744.35	1,745.17	941.81	5,244.46	502.91	1,134.95	3,447.34	5,544.04	3,645.48	58.64	1,395.36	148.37	522.49	703.70	973.88	1,353.40	387.65	876.48		
H19	35,118.56	/	75.68	10,087.00	334.63	1,567.57	856.16	417.87	1,035.03	532.82	706.86	1,929.26	315.19	0.00	/	431.71	203.03	5,745.41	1,532.59	952.91	4,424.65	454.77	1,057.85	2,791.68	/	3,718.96	/	/	/	487.93	699.17	973.76	1,236.91	288.70	846.94		
H20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

95%信頼上限値・95%信頼下限値は、観察区域死亡数がポアソン分布に従うものと仮定して95%の信頼区間を表示させました。

信頼上限が1より小さければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が良い。
信頼下限が1より大きければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が悪い。

<< 標準化死亡比(SMR)とその信頼区間について >>

標準化死亡比とは、年齢構成の異なる集団間の死亡傾向を比較する指標であるが、上記の帳表は、2000年の全国を標準集団として標準化死亡比を計算したものである。
人口規模の小さい観察区域においては、観察区域死亡数が小さいため(1000人以下)偶然変動の影響を受けやすく指標値が大きく変動する。そのためデータを3年移動平均(複数年法)し中央年を表示年とした。
また、複数の観察区域間で指数値を比較する際、標準化死亡比は基準となる集団との死亡水準比較の指標であり死亡構造を表す指標ではないことも念頭に置いてください。

石川県（男）

年	死亡総数	癌感症	結核	悪性 新生物	悪性新生物											前立腺	糖尿病	高血圧 性疾患	心疾患(高 血圧性を 除く)	脳血管 疾患		呼吸器系 の疾患				消化器系 の疾患			肝疾患	腎不全	老衰	不慮の 事故	交通事故	自殺	
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝 内胆管	胆のう等	肺	気管、気 管支及び 肺	乳房	子宮	急性心筋 梗塞					その他の 虚血性 心疾患	くも膜 下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管 支炎	胃癌	膵臓及び 十二指腸 潰瘍								
H 1 1	SMR %	100.93	90.29	88.58	99.49	68.67	111.21	102.62	91.18	83.37	111.59	112.00	104.12	88.64	92.18	102.74	120.69	101.01	95.50	83.26	109.19	105.49	85.49	118.14	107.55	113.48	55.94	81.43	82.16	77.55	71.98	89.50	113.35	107.55	93.48
	95% 信頼上限	0.34	0.52	0.39	0.34	0.27	0.39	0.38	0.35	0.30	0.43	0.42	0.37	1.19	0.35	0.40	0.51	0.35	0.34	0.31	0.38	0.41	0.31	0.42	0.37	0.40	0.36	0.30	0.36	0.29	0.28	0.35	0.41	0.40	0.34
	95% 信頼下限	0.34	0.49	0.39	0.34	0.27	0.39	0.38	0.35	0.30	0.42	0.42	0.37	0.96	0.35	0.39	0.50	0.35	0.34	0.31	0.38	0.41	0.31	0.42	0.37	0.40	0.33	0.30	0.36	0.29	0.28	0.35	0.40	0.40	0.34
H 1 2	SMR %	99.00	125.13	71.61	99.27	64.02	110.65	103.57	95.04	85.60	103.89	114.95	102.67	171.60	84.95	103.44	104.20	99.72	94.95	80.79	101.77	93.73	77.07	111.59	103.78	111.07	53.77	78.68	73.61	72.94	72.26	96.51	113.69	104.76	95.13
	95% 信頼上限	0.34	0.66	0.33	0.34	0.25	0.39	0.38	0.36	0.31	0.40	0.43	0.36	1.57	0.33	0.40	0.44	0.35	0.34	0.30	0.35	0.37	0.28	0.39	0.36	0.39	0.34	0.29	0.33	0.28	0.28	0.37	0.41	0.39	0.34
	95% 信頼下限	0.34	0.63	0.32	0.34	0.25	0.39	0.38	0.36	0.31	0.40	0.43	0.36	1.37	0.33	0.40	0.44	0.35	0.34	0.30	0.35	0.37	0.28	0.39	0.36	0.39	0.32	0.29	0.32	0.28	0.28	0.37	0.41	0.39	0.34
H 1 3	SMR %	94.58	121.06	79.76	97.04	64.14	104.47	105.82	102.02	81.30	109.08	103.57	102.41	207.39	82.55	103.29	88.54	96.07	92.20	71.91	92.81	86.01	73.85	99.65	96.81	100.60	46.38	76.04	82.05	69.96	65.57	82.74	110.82	102.28	98.67
	95% 信頼上限	0.32	0.64	0.36	0.33	0.25	0.37	0.39	0.39	0.29	0.41	0.39	0.36	1.71	0.32	0.40	0.38	0.33	0.33	0.27	0.32	0.34	0.27	0.35	0.34	0.35	0.31	0.28	0.36	0.27	0.26	0.32	0.40	0.39	0.36
	95% 信頼下限	0.32	0.61	0.35	0.33	0.25	0.37	0.39	0.39	0.29	0.41	0.38	0.36	1.52	0.32	0.39	0.38	0.33	0.33	0.27	0.32	0.34	0.27	0.35	0.34	0.35	0.28	0.28	0.35	0.27	0.25	0.32	0.40	0.38	0.36
H 1 4	SMR %	93.43	105.27	73.76	95.41	73.98	100.52	104.71	110.51	78.39	101.33	101.32	102.83	200.69	75.69	102.34	84.94	93.85	89.25	68.27	89.31	82.64	77.38	93.05	93.92	95.82	39.43	79.50	89.78	70.93	67.86	87.93	108.11	99.09	105.00
	95% 信頼上限	0.32	0.57	0.33	0.33	0.28	0.36	0.39	0.42	0.28	0.39	0.38	0.36	1.66	0.29	0.39	0.37	0.33	0.32	0.26	0.31	0.33	0.28	0.33	0.33	0.34	0.27	0.29	0.39	0.27	0.26	0.34	0.39	0.37	0.38
	95% 信頼下限	0.32	0.54	0.33	0.33	0.28	0.36	0.38	0.42	0.28	0.38	0.38	0.36	1.47	0.29	0.39	0.36	0.33	0.32	0.26	0.31	0.33	0.28	0.33	0.33	0.34	0.25	0.29	0.38	0.27	0.26	0.34	0.39	0.37	0.38
H 1 5	SMR %	91.93	85.04	63.36	94.18	76.96	97.39	98.63	115.72	74.45	106.58	106.02	101.10	77.88	76.87	101.54	71.11	91.56	83.79	66.85	85.82	80.07	82.68	86.72	93.69	92.80	33.17	79.61	87.21	70.32	64.67	78.89	103.75	87.33	102.72
	95% 信頼上限	0.31	0.48	0.29	0.32	0.29	0.35	0.36	0.43	0.27	0.40	0.39	0.36	1.05	0.30	0.39	0.31	0.32	0.30	0.25	0.30	0.32	0.30	0.31	0.32	0.33	0.24	0.29	0.38	0.27	0.25	0.31	0.37	0.33	0.37
	95% 信頼下限	0.31	0.46	0.29	0.32	0.29	0.35	0.36	0.43	0.27	0.40	0.39	0.36	0.84	0.29	0.39	0.31	0.32	0.30	0.25	0.30	0.32	0.30	0.31	0.32	0.33	0.22	0.29	0.37	0.27	0.25	0.30	0.37	0.33	0.37
H 1 6	SMR %	91.64	98.72	55.04	93.03	83.85	97.34	91.58	98.65	71.52	97.29	108.99	101.73	75.45	76.25	93.62	70.88	94.02	83.06	69.28	81.07	74.60	83.96	80.43	95.28	95.98	36.34	79.64	66.58	72.47	72.68	79.14	98.86	80.01	101.38
	95% 信頼上限	0.31	0.53	0.26	0.32	0.32	0.34	0.34	0.37	0.26	0.37	0.40	0.36	1.01	0.29	0.36	0.31	0.33	0.30	0.26	0.28	0.30	0.31	0.28	0.33	0.34	0.25	0.29	0.30	0.27	0.28	0.31	0.35	0.31	0.37
	95% 信頼下限	0.31	0.51	0.25	0.32	0.32	0.34	0.34	0.37	0.26	0.37	0.40	0.36	0.82	0.29	0.36	0.31	0.33	0.30	0.26	0.28	0.30	0.31	0.28	0.33	0.34	0.23	0.29	0.29	0.27	0.28	0.30	0.35	0.30	0.37
H 1 7	SMR %	89.17	105.76	47.09	91.73	78.42	96.91	83.86	93.12	69.54	101.30	110.04	100.34	36.45	74.27	91.12	70.25	92.60	81.60	68.71	75.91	75.71	78.99	74.66	92.93	94.88	34.69	78.58	51.03	72.83	78.69	70.52	93.92	67.34	96.15
	95% 信頼上限	0.30	0.56	0.23	0.31	0.30	0.34	0.31	0.35	0.25	0.38	0.41	0.35	0.79	0.28	0.35	0.31	0.32	0.29	0.26	0.27	0.30	0.29	0.26	0.32	0.33	0.24	0.28	0.24	0.28	0.30	0.27	0.34	0.26	0.35
	95% 信頼下限	0.30	0.53	0.22	0.31	0.30	0.34	0.31	0.35	0.25	0.38	0.41	0.35	0.58	0.28	0.35	0.30	0.32	0.29	0.26	0.27	0.30	0.29	0.26	0.32	0.33	0.22	0.28	0.23	0.27	0.30	0.27	0.34	0.26	0.35
H 1 8	SMR %	87.57	127.29	41.11	90.37	77.71	89.39	83.29	90.05	67.83	101.27	105.23	102.94	35.18	77.46	83.66	82.50	92.28	81.34	64.45	73.04	89.47	76.10	69.70	90.78	93.06	28.97	78.05	42.88	68.49	80.87	66.10	90.08	63.07	95.07
	95% 信頼上限	0.30	0.64	0.20	0.31	0.30	0.32	0.31	0.34	0.25	0.38	0.39	0.36	0.76	0.29	0.32	0.35	0.32	0.29	0.24	0.26	0.35	0.28	0.25	0.31	0.33	0.21	0.28	0.20	0.26	0.31	0.26	0.32	0.25	0.34
	95% 信頼下限	0.30	0.62	0.20	0.31	0.29	0.32	0.31	0.34	0.25	0.38	0.39	0.36	0.56	0.29	0.32	0.35	0.32	0.29	0.24	0.26	0.35	0.28	0.25	0.31	0.32	0.19	0.28	0.20	0.26	0.30	0.26	0.32	0.24	0.34
H 1 9	SMR %	91.62	/	31.53	95.28	75.30	99.84	89.88	94.31	77.11	103.14	109.55	105.26	0.00	/	86.06	93.61	91.98	89.47	62.41	86.91	98.74	78.41	87.75	/	91.94	/	/	68.37	83.89	69.15	103.70	77.65	92.10	
	95% 信頼上限	0.93	/	0.47	0.98	0.86	1.06	0.99	1.06	0.84	1.16	1.20	1.11	-	/	0.98	1.16	0.96	0.96	0.69	0.91	1.14	0.86	0.93	/	0.96	/	/	0.78	0.94	0.80	1.11	0.90	1.00	
	95% 信頼下限	0.90	/	0.16	0.93	0.65	0.94	0.81	0.82	0.71	0.90	0.99	1.00	-	/	0.74	0.71	0.88	0.83	0.56	0.83	0.84	0.71	0.83	/	0.88	/	/	0.59	0.74	0.59	0.96	0.65	0.84	
H 2 0	SMR %	91.47	/	36.34	94.76	77.46	94.44	90.59	86.54	77.53	99.74	112.61	106.01	38.48	/	89.00	76.73	89.74	83.31	64.76	84.24	97.89	79.43	83.44	/	91.23	/	/	68.63	82.59	77.11	102.96	80.14	89.71	
	95% 信頼上限	0.93	/	0.53	0.97	0.88	1.00	1.00	0.98	0.84	1.12	1.23	1.11	1.14	/	1.01	0.97	0.93	0.90	0.72	0.88	1.13	0.87	0.88	/	0.95	/	/	0.78	0.93	0.88	1.10	0.93	0.97	
	95% 信頼下限	0.90	/	0.20	0.92	0.67	0.88	0.82	0.75	0.71	0.87	1.02	1.01	-0.37	/	0.77	0.57	0.86	0.77	0.58	0.80	0.83	0.72	0.78	/	0.87	/	/	0.60	0.73	0.66	0.96	0.68	0.82	

石川県死亡数（男）（3年移動平均）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	原因別											糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	呼吸器系の疾患	肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺																						
H 1 1	15,266	14	48	5,066	167	1,038	355	198	548	222	329	1,166	2	0	204	189	77	2,107	686	310	2,011	163	409	1,369	2,410	1,577	10	501	51	237	170	162	809	274	551		
H 1 2	15,402	20	40	5,186	159	1,060	368	211	574	213	346	1,183	4	0	195	195	69	2,144	702	310	1,937	147	378	1,344	2,417	1,606	10	495	47	226	177	183	825	268	563		
H 1 3	15,166	20	46	5,210	163	1,029	387	232	557	231	320	1,216	5	0	197	200	61	2,134	703	285	1,830	137	372	1,251	2,350	1,518	9	490	54	220	167	165	819	263	586		
H 1 4	15,473	18	44	5,275	193	1,020	395	258	550	222	322	1,260	5	0	188	204	61	2,158	703	280	1,827	134	401	1,219	2,379	1,511	8	526	61	227	180	185	816	257	628		
H 1 5	15,681	15	39	5,351	206	1,016	383	277	534	241	346	1,275	2	0	198	208	53	2,173	680	283	1,816	132	440	1,181	2,467	1,523	7	540	61	229	178	174	798	228	618		
H 1 6	16,114	18	35	5,430	230	1,044	366	242	524	227	365	1,320	2	0	204	197	55	2,306	695	303	1,777	125	459	1,141	2,614	1,644	8	554	48	240	208	184	775	210	613		
H 1 7	16,194	20	31	5,501	220	1,069	345	234	520	244	378	1,340	1	0	207	197	57	2,352	705	311	1,728	129	444	1,107	2,666	1,703	8	561	38	245	235	174	752	178	585		
H 1 8	16,431	25	28	5,574	223	1,015	353	232	519	252	371	1,416	1	0	225	186	70	2,428	726	302	1,727	155	440	1,080	2,723	1,750	7	572	33	234	252	173	737	168	581		
H 1 9	16,689		16	5,669	209	989	369	244	524	251	401	1,451	0	0		185	66	2,433	714	314	1,764	162	434	1,105		1,777				215	261	168	763	154	558		
H 2 0																																					

石川県期待死亡数（男）（平成12年全国死亡率の基準）

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	原因別											糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	呼吸器系の疾患	肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺																					
H 1 1	15,125.00	15.50	54.19	5,092.14	243.20	933.38	345.93	217.16	657.34	198.95	293.76	1,119.90	2.26	0.00	221.32	183.96	63.80	2,085.87	718.30	372.31	1,841.70	154.51	478.42	1,158.75	2,240.88	1,389.67	17.88	615.24	62.08	305.62	236.19	181.01	713.74	254.76	589.42	
H 1 2	15,556.96	15.98	55.86	5,224.04	248.37	957.93	355.33	222.02	670.54	205.02	301.01	1,152.26	2.33	0.00	229.54	188.52	66.22	2,150.12	739.33	383.69	1,903.38	156.84	490.47	1,204.46	2,329.03	1,445.90	18.60	629.10	63.85	309.83	244.95	189.62	725.68	255.82	591.84	
H 1 3	16,034.82	16.52	57.67	5,368.96	254.14	984.95	365.73	227.40	685.14	211.76	308.96	1,187.34	2.41	0.00	238.65	193.63	68.90	2,221.39	762.44	396.32	1,971.77	159.29	503.70	1,255.40	2,427.36	1,508.91	19.40	644.42	65.81	314.45	254.70	199.43	739.05	257.14	593.89	
H 1 4	16,560.31	17.10	59.65	5,528.89	260.89	1,014.76	377.24	233.46	701.64	219.09	317.82	1,225.29	2.49	0.00	248.37	199.34	71.81	2,299.45	787.65	410.15	2,045.69	162.15	518.25	1,309.98	2,533.10	1,576.89	20.29	661.65	67.94	320.04	265.26	210.40	754.79	259.37	598.10	
H 1 5	17,057.86	17.64	61.55	5,681.42	267.68	1,043.26	388.31	239.38	717.30	226.11	326.36	1,261.07	2.57	0.00	257.56	204.84	74.54	2,373.37	811.54	423.36	2,115.94	164.85	532.15	1,361.80	2,633.09	1,641.25	21.10	678.31	69.95	325.65	275.23	220.56	769.18	261.07	601.66	
H 1 6	17,584.39	18.23	63.59	5,836.57	274.28	1,072.50	399.64	245.32	732.70	233.32	334.91	1,297.49	2.65	0.00	267.53	210.43	77.60	2,452.56	836.75	437.39	2,191.94	167.57	546.67	1,418.57	2,743.37	1,712.88	22.02	695.65	72.10	331.16	286.20	232.50	783.94	262.46	604.66	
H 1 7	18,159.85	18.91	65.83	5,997.05	280.55	1,103.03	411.42	251.30	747.77	240.88	343.51	1,335.43	2.74	0.00	278.69	216.20	81.14	2,539.84	864.01	452.65	2,276.52	170.38	562.11	1,482.69	2,868.85	1,794.98	23.06	713.95	74.46	336.38	298.62	246.75	800.64	264.31	608.42	
H 1 8	18,762.88	19.64	68.10	6,167.99	286.95	1,135.44	423.83	257.62	765.11	248.85	352.56	1,375.58	2.84	0.00	290.46	222.33	84.85	2,631.15	892.59	468.55	2,364.60	173.24	578.21	1,549.49	2,999.70	1,880.47	24.16	732.88	76.95	341.64	311.60	261.71	818.15	266.35	611.10	
H 1 9	18,215.02		50.75	5,949.70	277.56	990.59	410.55	258.72	679.51	243.36	366.04	1,378.43	2.52	0.00		214.95	70.50	2,645.25	798.01	503.11	2,029.79	164.07	553.51	1,259.19		1,932.87			314.46	311.13	242.94	735.74	198.32	605.87		
H 2 0																																				

95%信頼上限値・95%信頼下限値は、観察区域死亡数がポアソン分布に従うものと仮定して95%の信頼区間を表示させました。

信頼上限が1より小さければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が良い。

信頼下限が1より大きければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が悪い。

<< 標準化死亡比(SMR)とその信頼区間について >>

標準化死亡比とは、年齢構成の異なる集団間の死亡傾向を比較する指標であるが、上記の帳表は、2000年の全国を標準集団として標準化死亡比を計算したものである。
人口規模の小さい観察区域においては、観察区域死亡数が小さいため(1000人以下)偶然変動の影響を受けやすく指標値が大きく変動する。そのためデータを3年移動平均(複数年法)し中央年を表示年とした。
また、複数の観察区域間で指数値を比較する際、標準化死亡比は基準となる集団との死亡水準比較の指標であり死亡構造を表す指標ではないことも念頭に置いてください。

石川県 (女)

年	死亡総数	脳脊髄感染症	結核	悪性新生物	内科										前立腺	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	呼吸器系の疾患				消化器系の疾患			肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺					
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び膵内臓管	胆のう等	脾	気管、気管支及び肺	乳房	子宮								くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍												
H11	SMR	%	100.62	89.29	130.41	101.52	92.82	107.50	98.40	107.41	96.62	114.75	110.52	94.56	103.23	91.14		99.91	104.30	96.04	89.17	94.69	105.01	94.33	83.29	112.79	101.33	107.48	80.65	91.04	100.10	86.42	81.16	102.43	117.68	129.49	94.34		
	95% 信頼上限		0.34	0.47	0.63	0.35	0.42	0.39	0.37	0.42	0.36	0.43	0.41	0.35	0.39	0.36		0.39	0.41	0.33	0.32	0.35	0.36	0.36	0.31	0.40	0.35	0.38	0.42	0.33	0.44	0.34	0.31	0.37	0.43	0.51	0.36		
	95% 信頼下限		0.34	0.46	0.61	0.35	0.41	0.39	0.36	0.42	0.36	0.43	0.41	0.35	0.39	0.36		0.38	0.41	0.33	0.32	0.35	0.36	0.35	0.31	0.40	0.35	0.38	0.41	0.33	0.43	0.34	0.31	0.37	0.43	0.51	0.36		
H12	SMR	%	96.05	71.96	137.55	96.97	98.61	102.45	92.92	114.04	93.53	108.23	108.48	84.33	106.54	86.14		94.85	86.75	93.48	87.12	83.36	95.16	87.41	75.26	101.65	96.30	102.42	46.04	92.51	95.73	92.67	82.22	97.31	113.53	127.05	86.60		
	95% 信頼上限		0.33	0.40	0.65	0.33	0.44	0.37	0.35	0.45	0.35	0.41	0.41	0.31	0.40	0.34		0.37	0.35	0.32	0.32	0.31	0.33	0.33	0.28	0.36	0.34	0.36	0.28	0.34	0.42	0.37	0.31	0.35	0.41	0.50	0.33		
	95% 信頼下限		0.33	0.38	0.63	0.33	0.43	0.37	0.34	0.44	0.35	0.40	0.40	0.31	0.40	0.34		0.37	0.35	0.32	0.31	0.31	0.33	0.33	0.28	0.36	0.34	0.36	0.26	0.34	0.41	0.36	0.31	0.35	0.41	0.50	0.33		
H13	SMR	%	92.10	81.78	132.09	96.51	85.49	100.65	97.68	106.20	91.04	108.25	104.19	87.18	98.39	80.00		90.40	75.12	90.21	85.01	82.66	88.34	80.70	72.33	95.20	89.42	93.43	36.53	97.14	110.50	90.84	74.09	90.10	102.00	107.73	79.82		
	95% 信頼上限		0.31	0.43	0.62	0.33	0.39	0.36	0.36	0.42	0.34	0.41	0.39	0.32	0.37	0.32		0.35	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.27	0.33	0.31	0.33	0.23	0.35	0.47	0.36	0.28	0.33	0.37	0.43	0.31		
	95% 信頼下限		0.31	0.42	0.61	0.33	0.38	0.36	0.36	0.41	0.34	0.40	0.39	0.32	0.37	0.32		0.35	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.27	0.33	0.31	0.33	0.22	0.35	0.47	0.36	0.28	0.33	0.37	0.43	0.30		
H14	SMR	%	91.11	98.92	108.30	95.64	94.71	96.60	100.42	91.77	85.85	114.27	101.03	85.82	96.92	91.81		91.21	77.82	87.71	83.52	74.95	87.06	84.63	76.15	91.97	86.22	86.45	45.27	101.29	90.83	100.69	79.04	88.88	103.24	106.85	87.59		
	95% 信頼上限		0.31	0.50	0.53	0.33	0.42	0.35	0.37	0.36	0.32	0.43	0.38	0.32	0.37	0.36		0.35	0.31	0.30	0.30	0.28	0.30	0.32	0.28	0.32	0.30	0.30	0.27	0.37	0.40	0.39	0.30	0.32	0.38	0.43	0.33		
	95% 信頼下限		0.31	0.48	0.51	0.33	0.41	0.35	0.37	0.36	0.32	0.42	0.38	0.31	0.36	0.36		0.35	0.31	0.30	0.30	0.28	0.30	0.32	0.28	0.32	0.30	0.30	0.25	0.37	0.39	0.39	0.30	0.32	0.38	0.42	0.33		
H15	SMR	%	90.10	87.19	79.26	96.92	95.77	91.08	104.16	88.77	84.56	117.63	100.87	91.71	102.11	95.33		84.74	77.84	88.61	83.49	70.18	82.77	87.13	76.44	85.15	84.65	84.14	50.06	99.60	77.74	101.72	73.57	90.16	93.50	89.80	88.29		
	95% 信頼上限		0.31	0.45	0.41	0.33	0.42	0.33	0.38	0.35	0.32	0.44	0.38	0.34	0.38	0.37		0.33	0.31	0.31	0.30	0.26	0.29	0.33	0.28	0.30	0.30	0.30	0.28	0.36	0.35	0.40	0.28	0.33	0.34	0.36	0.34		
	95% 信頼下限		0.31	0.43	0.39	0.33	0.42	0.33	0.38	0.35	0.32	0.44	0.38	0.33	0.38	0.37		0.33	0.31	0.31	0.30	0.26	0.29	0.33	0.28	0.30	0.30	0.30	0.27	0.36	0.34	0.39	0.28	0.33	0.34	0.36	0.33		
H16	SMR	%	89.11	83.68	55.56	95.38	96.67	93.18	101.85	83.95	81.67	105.76	98.69	89.95	107.16	95.71		87.55	74.88	90.53	85.53	65.08	79.05	92.99	70.00	79.73	86.35	85.32	47.82	94.96	54.74	101.47	73.01	83.26	91.35	89.42	87.13		
	95% 信頼上限		0.30	0.43	0.31	0.33	0.43	0.34	0.37	0.33	0.31	0.39	0.37	0.33	0.40	0.37		0.34	0.30	0.31	0.31	0.24	0.28	0.35	0.26	0.28	0.30	0.30	0.27	0.34	0.26	0.39	0.28	0.30	0.33	0.36	0.33		
	95% 信頼下限		0.30	0.41	0.29	0.33	0.42	0.34	0.37	0.33	0.31	0.39	0.37	0.33	0.40	0.37		0.34	0.30	0.31	0.31	0.24	0.27	0.35	0.26	0.28	0.30	0.30	0.26	0.34	0.25	0.39	0.27	0.30	0.33	0.36	0.33		
H17	SMR	%	86.64	87.43	46.78	94.76	82.97	92.50	101.21	88.12	89.96	91.17	102.95	95.22	108.12	76.33		86.33	69.38	89.46	80.31	66.54	72.28	88.80	60.84	73.54	86.32	87.31	27.32	86.14	50.89	88.57	72.73	83.24	83.70	85.68	82.45		
	95% 信頼上限		0.29	0.44	0.27	0.33	0.37	0.33	0.37	0.35	0.33	0.34	0.38	0.35	0.40	0.30		0.33	0.28	0.31	0.29	0.25	0.25	0.33	0.23	0.26	0.30	0.31	0.18	0.31	0.24	0.35	0.27	0.30	0.31	0.35	0.31		
	95% 信頼下限		0.29	0.43	0.25	0.33	0.37	0.33	0.37	0.35	0.33	0.34	0.38	0.35	0.40	0.30		0.33	0.28	0.31	0.29	0.25	0.25	0.33	0.23	0.26	0.30	0.31	0.17	0.31	0.23	0.34	0.27	0.30	0.31	0.34	0.31		
H18	SMR	%	86.25	118.58	51.43	93.41	73.52	89.65	100.06	87.15	91.25	84.06	105.34	94.40	100.70	74.79		95.71	65.32	89.37	76.53	67.09	69.53	84.20	57.64	71.50	85.65	87.15	17.32	87.16	47.24	90.17	72.55	83.90	88.76	84.55	78.31		
	95% 信頼上限		0.29	0.56	0.29	0.32	0.33	0.32	0.37	0.34	0.34	0.32	0.39	0.34	0.38	0.30		0.37	0.26	0.31	0.28	0.25	0.24	0.32	0.21	0.25	0.30	0.31	0.13	0.32	0.22	0.35	0.27	0.30	0.32	0.34	0.30		
	95% 信頼下限		0.29	0.55	0.27	0.32	0.33	0.32	0.37	0.34	0.34	0.32	0.39	0.34	0.38	0.29		0.36	0.26	0.31	0.28	0.25	0.24	0.32	0.21	0.25	0.30	0.31	0.12	0.31	0.22	0.35	0.27	0.30	0.32	0.34	0.30		
H19	SMR	%	91.08		73.76	97.41	82.30	98.34	93.57	90.11	96.46	104.38	104.59	101.07	93.36	83.38		104.68	81.83	89.78	84.78	72.39	82.48	89.71	67.78	86.64		86.48					90.86	78.99	96.82	103.05	116.35	85.52	
	95% 信頼上限		0.93		1.08	1.00	1.06	1.06	1.03	1.05	1.07	1.16	1.15	1.10	1.04	0.97		1.18	0.97	0.93	0.91	0.80	0.86	1.01	0.75	0.91		0.91						1.05	0.88	1.04	1.12	1.39	0.97
	95% 信頼下限		0.90		0.40	0.94	0.58	0.90	0.85	0.75	0.86	0.93	0.94	0.93	0.83	0.69		0.91	0.66	0.86	0.78	0.65	0.79	0.79	0.61	0.82		0.82					0.77	0.70	0.90	0.94	0.94	0.74	
H20	SMR	%	91.22		87.27	98.05	78.47	95.87	92.21	88.77	87.61	109.16	104.94	101.32	98.71	91.28		98.47	75.74	88.44	82.55	73.47	79.72	92.17	68.34	81.77		82.31						95.71	81.85	111.87	99.40	90.78	86.92
	95% 信頼上限		0.93		1.24	1.01	1.02	1.04	1.01	1.03	0.97	1.21	1.16	1.10	1.10	1.06		1.12	0.90	0.92	0.89	0.81	0.83	1.03	0.75	0.86		0.86						1.10	0.91	1.19	1.08	1.10	0.99
	95% 信頼下限		0.90		0.51	0.95	0.55	0.88	0.83	0.74	0.78	0.97	0.94	0.93	0.88	0.77		0.85	0.61	0.85	0.76	0.66	0.76	0.81	0.61	0.77		0.78					0.81	0.73	1.04	0.91	0.71	0.75	

石川県死亡数(女) (3年移動平均)

年	死亡総数	脳管感染症	結核	悪性新生物	原因別										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	呼吸器系の疾患	肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺			
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮																					前立腺		
H11	13,410	19	31	3,522	43	576	340	146	299	287	289	416	272	139	0	177	128	2,220	575	334	2,256	260	362	1,542	1,866	1,355	20	461	53	129	233	496	508	143	232		
H12	13,296	16	34	3,455	47	565	331	159	297	280	292	382	284	134	0	174	112	2,257	585	307	2,134	247	339	1,459	1,859	1,356	12	487	53	142	247	500	505	142	215		
H13	13,249	19	34	3,534	42	572	359	152	297	290	289	407	265	127	0	172	102	2,276	595	318	2,069	234	338	1,435	1,810	1,299	10	532	64	143	233	490	468	122	200		
H14	13,619	24	29	3,602	48	566	381	135	288	317	289	413	264	149	0	180	111	2,311	609	301	2,128	252	369	1,454	1,828	1,261	13	577	55	163	260	511	489	123	222		
H15	13,947	22	22	3,747	50	549	407	134	291	337	297	454	281	158	0	173	116	2,428	632	293	2,103	266	383	1,405	1,871	1,281	15	588	49	169	252	544	456	105	226		
H16	14,306	22	16	3,785	52	578	410	130	288	313	299	458	298	162	0	185	117	2,585	673	283	2,092	291	363	1,377	1,995	1,360	15	582	36	173	261	530	459	106	225		
H17	14,452	24	14	3,862	46	591	420	140	325	279	321	499	304	132	0	189	114	2,668	658	302	1,997	285	327	1,333	2,090	1,461	9	549	35	155	272	561	434	103	215		
H18	14,956	34	16	3,910	42	590	428	142	338	266	338	509	286	132	0	217	113	2,785	653	318	2,006	277	321	1,361	2,175	1,532	6	578	34	162	284	600	475	103	206		
H19	15,334	24	18	4,003	45	562	416	142	338	301	355	548	294	136	226	108	2,775	620	324	1,970	260	340	1,325	1,541	1,541	6	578	34	162	284	600	475	103	206			
H20																																					

石川県期待死亡数(女) (平成12年全国死亡率を基準)

年	死亡総数	脳管感染症	結核	悪性新生物	原因別										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	呼吸器系の疾患	肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺			
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮																					前立腺		
H11	13,327.89	21.28	23.77	3,469.40	46.33	535.80	345.54	135.92	309.46	250.11	261.48	439.94	263.49	152.52	0.00	177.16	122.72	2,311.63	644.87	352.74	2,148.27	275.64	434.63	1,367.13	1,841.58	1,260.67	24.80	506.39	52.95	149.28	287.08	484.25	431.69	110.43	245.92		
H12	13,842.78	22.23	24.72	3,562.90	47.66	551.50	356.23	139.42	317.54	258.71	269.16	452.98	266.57	155.56	0.00	183.45	129.10	2,414.40	671.46	368.29	2,242.48	282.59	450.45	1,435.36	1,930.49	1,323.94	26.07	526.45	55.36	153.22	300.41	513.82	444.82	111.77	248.28		
H13	14,385.91	23.23	25.74	3,661.92	49.13	568.29	367.54	143.13	326.24	267.90	277.38	466.83	269.32	158.76	0.00	190.26	135.78	2,523.05	699.90	384.73	2,342.06	289.95	467.28	1,507.36	2,024.04	1,390.39	27.37	547.67	57.92	157.42	314.50	543.87	458.82	113.25	250.56		
H14	14,948.64	24.26	26.78	3,766.40	50.68	585.92	379.41	147.10	335.46	277.42	286.06	481.26	272.40	162.29	0.00	197.34	142.63	2,634.75	729.13	401.60	2,444.25	297.77	484.59	1,580.94	2,120.09	1,458.56	28.72	569.63	60.55	161.89	328.93	574.96	473.65	115.12	253.47		
H15	15,478.87	25.23	27.76	3,866.00	52.21	602.75	390.74	150.95	344.13	286.50	294.43	495.05	275.19	165.74	0.00	204.16	149.01	2,740.05	756.94	417.47	2,540.69	305.29		1,650.11	2,210.24	1,522.47	29.96	590.37	63.03	166.15	342.51	603.39	487.70	116.93	255.99		
H16	16,053.50	26.29	28.80	3,968.34	53.79	620.31	402.54	154.86	352.62	295.96	302.96	509.20	278.10	169.26	0.00	211.30	156.24	2,855.47	786.84	434.83	2,646.52	312.95	518.56	1,727.18	2,310.43	1,593.96	31.37	612.86	65.77	170.49	357.49	636.54	502.46	118.54	258.24		
H17	16,680.42	27.45	29.93	4,075.75	55.44	638.92	414.98	158.87	361.25	306.03	311.81	524.03	281.17	172.94	0.00	218.93	164.30	2,982.21	819.33	453.86	2,762.84	320.94	537.44	1,812.64	2,421.32	1,673.32	32.94	637.36	68.78	175.01	373.99	673.94	518.51	120.21	260.75		
H18	17,340.27	28.67	31.11	4,185.79	57.13	658.09	427.76	162.94	370.40	316.43	320.87	539.21	284.01	176.49	0.00	226.73	172.99	3,116.13	853.23	473.97	2,885.29	328.97	556.87	1,903.41	2,539.29	1,757.97	34.64	663.14	71.98	179.66	391.48	715.13	535.12	121.83	263.07		
H19	16,835.71	24.40	4,109.54	54.68	571.49	444.59	157.59	350.40	288.37	339.42	542.19	314.92	163.12	215.89	131.98	3,091.06	731.27	447.60	2,388.46	289.83	501.65	1,529.38	1,781.93	1,781.93	34.64	663.14	71.98	179.66	391.48	715.13	535.12	121.83	263.07				
H20																																					

95%信頼上限値・95%信頼下限値は、観察区域死亡数がポアソン分布に従うものと仮定して95%の信頼区間を表示させました。

信頼上限が1より小さければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が良い。

信頼下限が1より大きければ、死亡状況は相対的(2000年の全国を標準集団と比較)に観察集団の方が悪い。

<< 標準化死亡比(SMR)とその信頼区間について >>

標準化死亡比とは、年齢構成の異なる集団間の死亡傾向を比較する指標であるが、上記の帳表は、2000年の全国を標準集団として標準化死亡比を計算したものである。

人口規模の小さい観察区域においては、観察区域死亡数が小さいため(1000人以下)偶然変動の影響を受けやすく指標値が大きく変動する。そのためデータを3年移動平均(複数年法)し中央年を表示年とした。

また、複数の観察区域間で指数値を比較する際、標準化死亡比は基準となる集団との死亡水準比較の指標であり死亡構造を表す指標ではないことも念頭に置いてください。