

家庭菜園でさつまいもを作られる方へ

もとぐされびょう

サツマイモ基腐病に注意！



サツマイモ基腐病とは

全国的に発生が拡大！
発生後の防除は困難！



- ・カビ(糸状菌)による病害で、感染した種イモや苗から発生します。
- ・発病した株から周囲の株に伝染するため、早期発見が重要です。
- ・症状は、葉やツルが黄色や赤色に変色して次第にしおれ、
① 株元が黒や茶色に変色し、その後、株全体が枯死します。
② ③



発生初期(葉の変色)



株元の黒変




激発ほ場(枯死)

「生研支援センターイノベーション創出強化研究推進事業(01020C)
令和2年度版マニュアル「サツマイモ基腐病の発生生態と防除対策」より

サツマイモ基腐病を防ぐために

- ・消毒された健全な苗を購入しましょう。
- ・消毒されていない苗を購入した場合は、植え付け前に登録のある農薬で必ず消毒しましょう。☞予防が大切です！
- ・植付後は病徴が発生していないか、こまめに見回りましょう。
- ・発病が疑われる株を確認したら、すぐに周囲の株ごと抜き取り、適切に処分しましょう(燃えるゴミに出す、畑以外の場所に埋める)。



ご相談・連絡先

石川県農林総合研究センター 病害虫防除室
TEL: 076-257-6972



石川県農林水産部農業政策課 (令和4年1月)
TEL:076-225-1663 / FAX:076-225-1618

