

# コテングコウモリ

*Murina ussuriensis* Ognev

## コウモリ目ヒナコウモリ科

石川県カテゴリー 絶滅危惧Ⅱ類

国カテゴリー なし

### 選定理由

全国的にも分布している県が少なく、本県においても生息の確認場所が少ない。

### 国内分布

北海道、本州、四国、九州、対馬、奄岐から知られるが、生息確認は20道県から満たない。

### 県内分布

白山周辺で2例確認されている。

### 生態

昼間の隠れ家は基本的には樹洞のようなものであるが、木の茂み、樹皮の間隙、落ち葉の下、洞穴内、家屋内でも見つかっている。夜間に樹間、葉間を飛翔する昆虫類を捕食するが、葉上に静止する昆虫類も捕食するらしい。1~2仔を初夏に出産する。

### 生息地の条件


原生林内に生息する。

### 生存の危機

分布などがよく分からないうちに、生息環境が開発されてしまっている。(A)

### 参考文献

- 佐野明・上馬康生 1981. 白山地域に生息する翼手類について. 石川県白山自然保護センター研究報告. 7: 23-29.  
山本輝正 1990. 石川県のコウモリ. 石川の生物, 石川の生物編集会(編). 137-142. 石川県高等学校研究会生物部会.  
山本輝正・野崎英吉 2002. 白山地域におけるコウモリ目相. 石川県白山自然保護センター研究報告. 29: 73-76.  
山本輝正・上馬康生・野崎英吉 2005. 石川県白山地域のコウモリ相調査—1998年~2005年の調査結果より—. 石川県白山自然保護センター研究報告. 32: 25-30



県内の分布